

Express-PRA zu *Aspidiotus hedericola*

– Auftreten –

Erstellt von: Julius Kühn-Institut, Institut für nationale und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit am: 21.08.2014. Zuständige Mitarbeiter: Dr. Gritta Schrader, Dr. Petra Müller

Anlass: Auftreten in Baden-Württemberg

Aspidiotus hedericola ist im mediterranen Raum beheimatet und befällt offenbar ausschließlich Efeu (*Hedera helix*) – ein Hinweis wurde jedoch gefunden, dass auch *Laurus nobilis* befallen wird (Ülgentürk und Çanakçioğlu, 2004). Die Deckelschildlaus kommt vor in Kroatien, Zypern, Griechenland, Italien, Malta, Spanien, Israel, im Libanon und in der Türkei. Das Auftreten in Baden-Württemberg und Bochum scheint das bisher nördlichste zu sein. Es ist zu vermuten, dass *A. hedericola* sich mit zunehmender Erwärmung auch in nördlicheren Gebieten Europas ausbreitet und sich somit möglicherweise auch in wärmeren Gegenden Deutschland etablieren könnte.

Aufgrund der Beheimatung der Deckelschildlaus in Europa und der damit verbundenen möglichen weiteren natürlichen Ausbreitung wurde auf die Erstellung einer vollständigen formellen Express-Risikoanalyse verzichtet. § 4a der PBVO ist demnach nicht anzuwenden.