



Gobierno de Reconciliación  
y Unidad Nacional  
*El Pueblo, Presidente!*



INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y SANIDAD AGROPECUARIA  
DIRECCIÓN SANIDAD VEGETAL Y SEMILLAS  
DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA FITOSANITARIA Y CAMPAÑAS

LISTA DE PLAGAS REGLAMENTADAS, NICARAGUA 2024

Rige a partir de 19 de febrero 2024

Versión 05

El IPSA (Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria), pone a disposición la Versión V del listado de plagas reglamentadas en Nicaragua, en cumplimiento a la Ley 1020 "Ley de Protección Fitosanitaria de Nicaragua", bajo el principio de transparencia establecido en el numeral 3 del artículo 5, numerales 8 y 9 del artículo 9, y, el artículo 50; así como lo estipulado en el Nuevo Texto Revisado de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) en el párrafo 2 (i) del Artículo VII. Para la elaboración se consideraron las fichas técnicas, Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) realizados para plagas específicas y diagnóstico de muestras realizadas por el Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario y Control de Semillas (LDPCS) del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria de Nicaragua; así como las NIMF No. 8 "Determinación de la situación de una plaga en una área" y la NIMF No. 19 "Directrices sobre las listas de plagas reglamentadas", FAO, Roma.

| No. | Nombre Científico                                       | Grupo    | Situación                             | Artículos reglamentados  |
|-----|---|----------|---------------------------------------|--|
| 1   | <i>Acarus siro</i> Linnaeus                             | Acari    | Ausente: no hay registros de la plaga | Grano cebada ( <i>Hordeum vulgare</i> ), cereal soya y maíz azucarado, grano linaza ( <i>Linum usitatissimum</i> ), harina soya ( <i>Glycine max</i> ), harina maíz ( <i>Zea mays</i> ), harina mani ( <i>Arachis hypogaea</i> )   |
| 2   | <i>Aceria guerreronis</i> Keifer                        | Acari    | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla pregerminada coco ( <i>Cocos nucifera</i> )  |
| 3   | <i>Aceria tulipae</i> (Keifer, 1938)                    | Acari    | Ausente: no hay registros de la plaga | Ajo fresco ( <i>Allium sativum</i> ), cebolla fresca ( <i>Allium cepa</i> )  |
| 4   | <i>Acalitus essigi</i> Hassan                           | Acari    | Ausente: no hay registros de la plaga | Mora fresca ( <i>Rubus ulmifolius</i> )  |
| 5   | <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer, 1972                    | Acari    | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes sin enraizar ( <i>Fuchsia hybrids</i> )   |
| 6   | <i>Amphitetranychus viennensis</i> (Zacher)             | Acari    | Ausente: no hay registros de la plaga | Melocotón fresco ( <i>Prunus persica</i> ), pera fresca ( <i>Pyrus communis</i> ), manzana fresca ( <i>Malus domestica</i> )   |
| 7   | <i>Brevipalpus chilensis</i> Baker, 1949                | Acari    | Ausente: no hay registros de la plaga | Uva fresca ( <i>Vitis vinifera</i> ), naranja fresca ( <i>Citrus sinensis</i> ), clementina fresca ( <i>Citrus clementina</i> ), aguacate fresco ( <i>Persea americana</i> ), mandarina fresca ( <i>Citrus reticulata</i> )  |
| 8   | <i>Brevipalpus phoenicis</i> (Geijskes, 1936)           | Acari    | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta enraizada con sustrato ( <i>Citrus sinensis</i> )   |
| 9   | <i>Brevipalpus lewisi</i> McGregor, 1949                | Acari    | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes ( <i>Punica granatum</i> ), ( <i>Vitis vinifera</i> ), uva fresca ( <i>Vitis vinifera</i> ), granada fresca ( <i>Punica granatum</i> ), naranja fresca ( <i>Citrus sinensis</i> ), toronja fresca ( <i>Citrus paradise</i> ), mandarina fresca ( <i>Citrus reticulata</i> ) |
| 10  | <i>Oligonychus coffeae</i> (Nietner)                    | Acari    | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta raíz desnuda ( <i>Coffea arabica</i> ), ( <i>Coffea canephora</i> ), planta enraizada con sustrato ( <i>Coffea arabica</i> )  |
| 11  | <i>Oligonychus perseae</i> Tuttle, Baker and Abbatiello | Acari    | Ausente: no hay registros de la plaga | Varetas aguacate ( <i>Persea americana</i> )   |
| 12  | <i>Phytonemus pallidus</i> (Banks)                      | Acari    | Ausente: no hay registros de la plaga | Flores corte ( <i>Protea cynaroides</i> ), ( <i>Gerbera jamesonii</i> ), ( <i>Dianthus caryophyllus</i> ), ( <i>Hedera helix</i> ), ( <i>Antirrhinum majus</i> ), esquejes enraizados ( <i>Portulaca oleracea</i> ), planta raíz desnuda ( <i>Fragaria ananassa</i> )                |
| 13  | <i>Rhizoglyphus echinopus</i> Fumouze & Robin           | Acari    | Ausente: no hay registros de la plaga | Cebolla fresca ( <i>Allium cepa</i> ), ajo fresco ( <i>Allium sativum</i> )  |
| 14  | <i>Tetranychus cinnabarinus</i> (Boisduval)             | Acari    | Ausente: no hay registros de la plaga | Espinaca fresca ( <i>Spinacia oleracea</i> ), planta enraizada con sustrato ( <i>Chrysanthemum indicum</i> )   |
| 15  | <i>Tetranychus kanzawai</i> Kishida                     | Acari    | Ausente: no hay registros de la plaga | Fresa fresca ( <i>Fragaria ananassa</i> )  |
| 16  | <i>Tetranychus pacificus</i> McGregor                   | Acari    | Ausente: no hay registros de la plaga | Melón fresco ( <i>Cucumis melo</i> ), sandía fresca ( <i>Citrullus lanatus</i> )   |
| 17  | <i>Tyrophagus putrescentiae</i> (Schrank)               | Acari    | Ausente: no hay registros de la plaga | Grano arroz ( <i>Oryza sativa</i> ), grano avena ( <i>Avena sativa</i> ), grano mani ( <i>Arachis hypogaea</i> ), harina soya ( <i>Glycine max</i> ), grano girasol ( <i>Helianthus annuus</i> )   |
| 18  | <i>Acidovorax avenae</i> Schaad et al. 2008             | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes ( <i>Saccharum officinarum</i> )  |

| No. | Nombre Científico   | Grupo    | Situación                             | Artículos reglamentados  |
|-----|---|----------|---------------------------------------|--|
| 19  | <i>Acidovorax citrulli</i> (Schaad et al.)<br>Schaad et al.                                       | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla melón ( <i>Cucumis melo</i> ), semilla sandía ( <i>Citrullus lanatus</i> ), sandía fresca ( <i>Citrullus lanatus</i> ), melón fresco ( <i>Cucumis melo</i> ), semilla ayote, zapallo, calabaza ( <i>Cucurbita moschata</i> ), semilla zucchini ( <i>Cucurbita pepo</i> ), semilla pepino ( <i>Cucumis sativus</i> )  |
| 20  | <i>Balansia oryzae-sativae</i> Hashioka, 1971   | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla sorgo ( <i>Sorghum vulgare</i> ), semilla arroz ( <i>Oryza sativa</i> )  |
| 21  | <i>Burkholderia caryophylli</i> (Burkholder)<br>Yabuuchi et al.                                   | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes ( <i>Gypsophila paniculata</i> )  |
| 22  | <i>Burkholderia gladioli</i> pv. <i>gladioli</i><br>(Severini) Yabuuchi et al. 1993               | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Bulbos gladiolos ( <i>Gladiolus hybrids</i> )  |
| 23  | <i>Candidatus Phytoplasma asteris</i>   | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes ( <i>Hydrangea macrophylla</i> ), ( <i>Celosia argentea</i> ), ( <i>Erysimum linifolium</i> ), ( <i>Euphorbia pulcherrima</i> ), ( <i>Celosia spicata</i> ) esquejes, planta in vitro ( <i>Phlox drummondii</i> ), planta in vitro ( <i>Petunia hybrida</i> ), ( <i>Catharanthus roseus</i> ), ( <i>Brachyscome multifida</i> ), ( <i>Celosia spicata</i> ), ( <i>Celosia argentea</i> ), follaje ( <i>Myrtus communis</i> ), planta enraizada con sustrato ( <i>Cyrtostachys renda</i> ), planta raiz desnuda ( <i>Fragaria ananassa</i> ), flores corte ( <i>Chrysanthemum morifolium</i> ), ( <i>Gerbera jamesonii</i> ), ( <i>Limonium sinuatum</i> ), ( <i>Celosia argentea</i> ), ( <i>Hydrangea macrophylla</i> ), ( <i>Alstroemeria aurea</i> ), ( <i>Lilium hybrids</i> ), ( <i>Gladiolus hybrids</i> ), ( <i>Celosia spicata</i> ), ( <i>Scabiosa atropurpurea</i> ), planta raiz desnuda, planta enraizada con sustrato ( <i>Olea europaea</i> ), esquejes con raiz ( <i>Euphorbia pulcherrima</i> ) |
| 24  | <i>Candidatus Phytoplasma palmae</i>  | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Palmáceas  |
| 25  | <i>Candidatus Phytoplasma trifolii</i> Hiruki and Wang  | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta raiz desnuda ( <i>Fragaria ananassa</i> ), esquejes ( <i>Celosia argentea</i> ), ( <i>Celosia spicata</i> )   |
| 26  | cassava witches' broom  | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Varetas ( <i>Manihot esculenta</i> )   |
| 27  | <i>Clavibacter michiganensis</i> (Smith 1910; Davis et al. 1984) Li et al. 2018                   | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Tomate fresco ( <i>Solanum lycopersicum</i> ), semilla tomate ( <i>Solanum lycopersicum</i> ), semilla papa ( <i>Solanum tuberosum</i> ), semilla de pimiento ( <i>Capsicum annuum</i> )   |
| 28  | <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges 1922) Collins & Jones 1983 | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla lablab ( <i>Lablab purpureus</i> ), semilla frijol caupi ( <i>Vigna unguiculata</i> ), semilla soya ( <i>Glycine max</i> ), semilla frijol ( <i>Phaseolus vulgaris</i> )   |
| 29  | <i>Dickeya dadantii</i> Samson et al., 2005   | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes ( <i>Petunia hybrida</i> )  |
| 30  | <i>Dickeya dianthicola</i> Samson et al. 2005   | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla papa ( <i>Solanum tuberosum</i> )  |
| 31  | <i>Dickeya paradisiaca</i> (Fernandez-Borrero & Lopez-Duque 1970) Samson et al. 2005              | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes ( <i>Pennisetum</i> sp.)  |
| 32  | <i>Dickeya solani</i> van der Wolf et al.   | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla papa ( <i>Solanum tuberosum</i> )  |
| 33  | <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill 1882) Winslow et al. 1920                                       | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Fresa fresca ( <i>Fragaria ananassa</i> )  |
| 34  | <i>Erwinia rhapontici</i> (Millard 1924) Burkholder 1948  | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla trigo ( <i>Triticum aestivum</i> )   |
| 35  | <i>Grapevine yellows phytoplasmas</i> Seemüller et al., 1998                                      | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes ( <i>Vitis vinifera</i> )   |
| 36  | <i>Grapevine flavescence doree phytoplasma</i>  | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes ( <i>Vitis vinifera</i> )   |
| 37  | <i>Pantoea ananatis</i> (Serrano, 1928) Mergaert et al. 1993                                      | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta eucalipto ( <i>Eucalyptus</i> spp.)   |
| 38  | <i>Pantoea stewartii</i> (Smith 1898) Mergaert et al. 1993  | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla maíz ( <i>Zea mays</i> )   |
| 39  | <i>Pectobacterium brasiliense</i> (Portier et al. 2019)   | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla papa ( <i>Solanum tuberosum</i> )  |
| 40  | <i>Pectobacterium cypripedii</i> (Hori) Brenner et al.  | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta enraizada ( <i>Phalaenopsis amabilis</i> )  |
| 41  | <i>Pseudomonas corrugata</i> Roberts & Scarlett (1981), emend. Sutra et al. 1997                  | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla tomate ( <i>Solanum lycopersicum</i> )   |

| No. | Nombre Científico  | Grupo    | Situación                             | Artículos reglamentados   |
|-----|--|----------|---------------------------------------|---|
| 42  | <i>Pseudomonas marginalis</i> pv. <i>marginalis</i> (Brown 1918) Stevens 1925                          | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes ( <i>Dianthus caryophyllus</i> ), planta in vitro ( <i>Zingiber officinale</i> ), semilla papa ( <i>Solanum tuberosum</i> ), semilla coliflor ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> ), jengibre fresco ( <i>Zingiber officinale</i> ), planta raiz desnuda ( <i>Zingiber officinale</i> )  |
| 43  | <i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>glycinea</i> (Coerper 1919) Gardan et al. 1992                    | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla soya ( <i>Glycine max</i> )   |
| 44  | <i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>savastanoi</i> (ex Smith 1908) Gardan et al. 1992                 | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Esqueje, planta in vitro ( <i>Mandevilla hybrida</i> ), Esqueje enraizados ( <i>Mandevilla sanderi</i> )  |
| 45  | <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>maculicola</i> (McCulloch 1911) Young et al. 1978                   | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla brócoli ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i> )  |
| 46  | <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> (Smith & Bryan) Young Dye & Wilkie 1978              | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla melón ( <i>Cucumis melo</i> ), semilla zuchini ( <i>Cucurbita pepo</i> ), semilla sandia ( <i>Citrullus lanatus</i> )   |
| 47  | <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i> (Okabe) Young, Dye & Wilkie                              | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla tomate ( <i>Solanum lycopersicum</i> ), semilla pimienta ( <i>Capsicum annuum</i> )   |
| 48  | <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>pisi</i> (Sackett 1916) Young et al. 1978                           | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla arveja ( <i>Pisum sativum</i> )   |
| 49  | <i>Pseudomonas viridiflava</i> (Burkholder 1930) Dowson 1939   | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla pimienta ( <i>Capsicum annuum</i> ), semilla cebolla ( <i>Allium cepa</i> ), semilla pepino ( <i>Cucumis sativus</i> ), semilla ayote, zapallo ( <i>Cucurbita maxima</i> ), semilla caupi ( <i>Vigna sinensis</i> ), semilla apio ( <i>Apium graveolens</i> ), semilla eneldo ( <i>Anethum graveolens</i> ), semilla judía ( <i>Labiab purpurea</i> ), semilla capuchina ( <i>Tropaeolum majus</i> ), semilla haba ( <i>Vicia faba</i> ), semilla ajo ( <i>Allium sativum</i> ), semilla col china ( <i>Brassica rapa</i> subsp. <i>pekinensis</i> ), planta in vitro ( <i>Calendula officinalis</i> ), semilla tomate ( <i>Solanum lycopersicum</i> ), semilla melón ( <i>Cucumis melo</i> ) |
| 50  | <i>Ralstonia solanacearum</i> race I (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996                                 | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Rizoma jengibre ( <i>Zingiber officinale</i> )  |
| 51  | <i>Rhizobium radiobacter</i> (Beijerinck & van Delden 1902) Young et al. 2001                          | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Banano in vitro ( <i>Musa</i> spp.), esquejes ( <i>Manihot esculenta</i> ), ( <i>Gypsophila paniculata</i> ), ( <i>Punica granatum</i> ), ( <i>Petunia hybrida</i> ), ( <i>Vinca maculata</i> ), yemas ( <i>Diospyros kaki</i> ), planta in vitro ( <i>Manihot esculenta</i> ), esquejes , planta raiz desnuda ( <i>Kalanchoe millotii</i> ),   |
| 52  | <i>Rhizobium rhizogenes</i> (Riker et al. 1930) Young et al. 2001                                      | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes enraizados ( <i>Phlox drummondii</i> ), ( <i>Sedum bouvardia</i> ), esquejes ( <i>Vinca maculata</i> )   |
| 53  | <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al., 1973   | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta naranja con sustrato ( <i>Citrus sinensis</i> ), esquejes sin raiz ( <i>Citrus sinensis</i> )  |
| 54  | <i>Streptomyces ipomoeae</i> (Person & Martin 1940) Waksman & Henrici 1948                             | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta enraizada ( <i>Ipomoea batatas</i> )   |
| 55  | <i>Xanthomonas albilineans</i> (Ashby 1929) Dowson 1943  | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes ( <i>Saccharum officinarum</i> )   |
| 56  | <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>allii</i> Roumagnac et al.  | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla cebolla ( <i>Allium cepa</i> ), semilla cebollin ( <i>Allium schoenoprasum</i> ), ( <i>Allium fistulosum</i> )  |
| 57  | <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>begoniae</i> (Takimoto 1934) Vauterin et al. 1995                 | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes ( <i>Begonia x tuberhybrida</i> ), ( <i>Begonia boliviensis</i> ), ( <i>Begonia hybrida</i> ), ( <i>Begonia tuberosa</i> ), ( <i>Begonia multiflora</i> )  |
| 58  | <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>cyamopsidis</i> (Patel et al. 1953) Vauterin et al. 1995          | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla goma ( <i>Cyamopsis tetragonoloba</i> )   |
| 59  | <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>dieffenbachiae</i> (McCulloch & Pirone 1939) Vauterin et al. 1995 | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes enraizados ( <i>Anthurium andreanum</i> ), esquejes sin raiz ( <i>Epipremnum pinnatum</i> )  |
| 60  | <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>glycines</i> (Nakano) Vauterin et al., 1995                       | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla Soya ( <i>Glycine max</i> )   |
| 61  | <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>vasculorum</i> (Cobb 1894) Vauterin et al. 1995                   | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes ( <i>Saccharum officinarum</i> )   |
| 62  | <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>vitians</i> (Brown 1918) Vauterin et al. 1995                     | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla lechuga ( <i>Lactuca sativa</i> )   |
| 63  | <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantinet et al.                                  | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Naranja fresca ( <i>Citrus sinensis</i> ), Limón dulce fresco ( <i>Citrus aurantiifolia</i> ), Mandarina fresca ( <i>Citrus reticulata</i> ), esquejes sin raiz ( <i>Citrus sinensis</i> ), planta enraizada con sustrato ( <i>Mangifera indica</i> )   |
| 64  | <i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>carotae</i> (Kendrick) Vauterin et al.                              | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla zanahoria ( <i>Daucus carota</i> )  |

| No. | Nombre Científico  | Grupo    | Situación                             | Artículos reglamentados  |
|-----|--|----------|---------------------------------------|--|
| 65  | <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy & King, 1962  | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta raiz desnuda ( <i>Fragaria ananassa</i> )   |
| 66  | <i>Xanthomonas translucens</i> pv. <i>translucens</i> (Jones et al. 1917) Vauterin et al. 1995 | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla cebada ( <i>Hordeum vulgare</i> )  |
| 67  | <i>Xanthomonas vasicola</i> pv. <i>vascolorum</i> (Cobb 1894)                                  | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes sin raiz ( <i>Saccharum officinarum</i> )   |
| 68  | <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells et al., 1987)   | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Follaje limón persa( <i>Citrus latifolia</i> ), follaje palmera( <i>Phoenix roebellini</i> ), esquejes sin enraizar ( <i>Catharanthus roseus</i> ), esquejes enraizados( <i>Felicia amelloides</i> ), ( <i>Pentas hybrida</i> ), ( <i>Torenia hybrida</i> ), ( <i>Sedum bouvardia num</i> ), ( <i>Gaillardia grandiflora</i> ), ( <i>Fuchsia hybrida</i> ), ( <i>Euphorbia pulcherrima</i> ), ( <i>Ipomoea batatas</i> ), ( <i>Salvia viridis</i> ), ( <i>Salvia greggii</i> ), ( <i>Ageratum hybrida</i> ), ( <i>Euphorbia pulcherrima</i> ), ( <i>Ipomoea batatas</i> ), ( <i>Lobularia maritima</i> ), ( <i>Salvia longispicata x Salvia farinacea</i> ), ( <i>Helianthus petiolaris</i> ), ( <i>Helianthus argophyllus</i> ), ( <i>Fuchsia hybrida</i> ), ( <i>Vinca major</i> ), ( <i>Salvia darcyi</i> ), ( <i>Salvia splendens</i> ), ( <i>Salvia farinacea</i> ), planta enraizada con sustrato café( <i>Coffea arabica</i> ), planta in vitro( <i>Catharanthus roseus</i> ), ( <i>Lantana camara</i> ), planta con sustrato de naranja( <i>Citrus sinensis</i> ), esquejes sin raiz ( <i>Citrus sinensis</i> ), planta in vitro ( <i>Coffea canephora</i> ), ( <i>Coffea arabica</i> ), planta raiz desnuda ( <i>Olea europaea</i> ), semilla, varetas aguacate ( <i>Persea americana</i> ), planta raiz desnuda ( <i>Coffea arabica</i> ), planta enraizada con sustrato ( <i>Lantana camara</i> ), ( <i>Euphorbia pulcherrima</i> ), ( <i>Ipomoea batatas</i> ), ( <i>Portulaca oleracea</i> ), ( <i>Salvia guarinitica</i> ), planta in vitro( <i>Salvia splendens</i> ), ( <i>Alternanthera ficoidea</i> ), ( <i>Bidens pilosa</i> ), ( <i>Euphorbia hypericifolia</i> ), ( <i>Helichrysum petiolare</i> ), ( <i>Ipomoea batatas</i> ), ( <i>Lobularia maritima</i> ), ( <i>Portulaca oleracea</i> ), ( <i>Salvia guarinitica</i> ), ( <i>Salvia longispicata</i> ), ( <i>Salvia longispicata x Salvia farinacea</i> ), ( <i>Verbena peruviana</i> ), ( <i>Salvia greggii</i> ), ( <i>Salvia horminum</i> ), ( <i>Salvia splendens</i> ), ( <i>Salvia farinacea</i> ), ( <i>Heliotropium arborescens</i> ), ( <i>Helianthus petiolaris</i> ), ( <i>Helianthus argophyllus</i> ), ( <i>Salvia viridis</i> ), ( <i>Fuchsia hybrida</i> ), semilla ( <i>Helianthus petiolaris</i> ). |
| 69  | <i>Albugo candida</i> (Pers.) Kuntze   | Fungi    | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla cilantro ( <i>Coriandrum sativum</i> ), semilla repollo ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> ), semilla sandia ( <i>Citrullus lanatus</i> ), semilla rábano ( <i>Raphanus sativum</i> ), semilla repollo chino ( <i>Brassica rapa</i> subsp. <i>pekinensis</i> ), semilla nabo ( <i>Brassica rapa</i> subsp. <i>rapa</i> ), semilla col forrajera ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>viridis</i> ), semilla coliflor ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> )  |
| 70  | <i>Sarocladium strictum</i> (W. Gams) Summerb.   | Fungi    | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla sorgo ( <i>Sorghum bicolor</i> )   |
| 71  | <i>Amylostereum areolatum</i> (Chaillet ex Fr.) Boidin 1958                                    | Fungi    | Ausente: no hay registros de la plaga | Madera con corteza ( <i>Pinus pinaster</i> )   |
| 72  | <i>Alternaria brassicicola</i> (Schwein.) Wiltshire  | Fungi    | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla pepino ( <i>Cucumis sativus</i> ), semilla vainica ( <i>Phaseolus</i> ), semilla frijol ( <i>Phaseolus vulgaris</i> ), semilla melón ( <i>Cucumis melo</i> ), semilla tomillo ( <i>Thymus vulgaris</i> ), semilla tomate ( <i>Solanum lycopersicum</i> ), semilla nabo ( <i>Brassica rapa</i> subsp. <i>rapa</i> ), semilla haba ( <i>Vicia faba</i> ), semilla col china ( <i>Brassica rapa</i> subsp. <i>pekinensis</i> ), semilla coliflor ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> ), semilla col forrajera ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>viridis</i> ), semilla rábano ( <i>Raphanus sativus</i> ), flores corte ( <i>Matthiola incana</i> ), semilla zanahoria ( <i>Daucus carota</i> ), semilla repollo chino ( <i>Brassica rapa</i> subsp. <i>chinensis</i> ), semilla repollo ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> )   |
| 73  | <i>Alternaria dianthicola</i> Neerg.   | Fungi    | Ausente: no hay registros de la plaga | Flores corte ( <i>Dianthus caryophyllus</i> )  |
| 74  | <i>Alternariaster helianthi</i> (Hansf.) E.G. Simmons  | Fungi    | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla girasol ( <i>Helianthus annus</i> )  |
| 75  | <i>Alternaria japonica</i> Yoshii 1941   | Fungi    | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla Col China ( <i>Brassica rapa</i> subsp. <i>pekinensis</i> ), semilla nabo ( <i>Brassica rapa</i> subsp. <i>rapa</i> ), semilla col forrajera ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>viridis</i> )  |
| 76  | <i>Alternaria longipes</i> (Ellis & Everh.) E.W. Mason   | Fungi    | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla zanahoria ( <i>Daucus carota</i> )   |
| 77  | <i>Alternaria triticina</i> Prasada & Prabhu 1963  | Fungi    | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla trigo ( <i>Triticum aestivum</i> )   |
| 78  | <i>Alternaria radicina</i> Meier, Drechsler & E.D. Eddy  | Fungi    | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla zanahoria ( <i>Daucus carota</i> )   |
| 79  | <i>Ascochyta pisi</i> Lib.   | Fungi    | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla Arveja ( <i>Pisum sativum</i> )  |
| 80  | <i>Austropuccinia psidii</i> (G. Winter) Beenken   | Fungi    | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta raiz desnuda ( <i>Psidium guajava</i> ), planta enraizada con sustrato ( <i>Psidium guajava</i> ), ( <i>Eucalyptus globulus</i> ), ( <i>Eucalyptus camaldulensis</i> ), ( <i>Eucalyptus urophylla</i> ), Follaje ( <i>Eucalyptus globulus</i> )   |
| 81  | <i>Balansia oryzae-sativae</i> Hashioka, 1971  | Fungi    | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla sorgo ( <i>Sorghum bicolor</i> )   |

| No. | Nombre Científico  | Grupo | Situación                             | Artículos reglamentados   |
|-----|--|-------|---------------------------------------|---|
| 82  | <i>Berkeleyomyces basicola</i> (Berk. Broome) Nel et al.                       | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla sandía ( <i>Citrullus lanatus</i> ), Bulbos begonia ( <i>Begonia</i> sp.), semilla pepino ( <i>Cucumis sativus</i> ), semilla melón ( <i>Cucumis melo</i> ), semilla soya ( <i>Glycine max</i> ), semilla alfalfa ( <i>Medicago sativa</i> ), semilla zanahoria ( <i>Daucus carota</i> ), planta raíz desnuda ( <i>Gerbera jamesonii</i> ), planta enraizada con sustrato ( <i>Euphorbia pulcherrima</i> ), ( <i>Citrus sinensis</i> ), ( <i>Zantedeschia aethiopica</i> ), ( <i>Petunia hybrida</i> ), semilla ayote ( <i>Cucurbita maxima</i> ), semilla zapallo, calabaza ( <i>Cucurbita moschata</i> ), esquejes enraizados ( <i>Euphorbia pulcherrima</i> ), ( <i>Ipomoea batata</i> ) |
| 83  | <i>Botryosphaeria stevensii</i> Shoemaker                                      | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes sin raíz ( <i>Vitis vinifera</i> )   |
| 84  | <i>Botryotinia squamosa</i> Vienn.-Bourg                                       | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Cebolla fresca ( <i>Allium cepa</i> )   |
| 85  | <i>Botryosphaeria ribis</i> Grossenb. & Duggar                                 | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Vareta ( <i>Mangifera indica</i> ), mango fresco ( <i>Mangifera indica</i> )  |
| 86  | <i>Botryosphaeria dothidea</i> (Moug.) Ces. & de Not.                          | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes pitahaya ( <i>Hylocereus undatus</i> ), planta raíz desnuda, planta enraizada con sustrato ( <i>Olea europaea</i> )  |
| 87  | <i>Botryotinia porri</i> (H.J.F. Beyma) Whetzel                                | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Cebolla fresca ( <i>Allium cepa</i> )   |
| 88  | <i>Botrytis aclada</i> Fresen  | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla, cebolla fresca ( <i>Allium cepa</i> ), semilla puerro ( <i>Allium porrum</i> ), semilla, ajo fresco ( <i>Allium sativum</i> )  |
| 89  | <i>Botrytis tulipae</i> Lind   | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Flores corte ( <i>Dianthus barbatus</i> ), ( <i>Tulipa</i> sp.)   |
| 90  | <i>Boeremia foveata</i> (Foister) Aveskamp, Gruyter & Verkley (anamorph)       | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla papa ( <i>Solanum tuberosum</i> )   |
| 91  | <i>Ceratocystis virescens</i> (R.W. Davidson) C. Moreau 1952                   | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Paletas madera Arce ( <i>Acer saccharum</i> )   |
| 92  | <i>Ciborinia allii</i> (Sawada) L.M. Kohn 1979                                 | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Ajo fresco ( <i>Allium sativum</i> ), cebolla fresca ( <i>Allium cepa</i> ), semilla cebollín ( <i>Allium fistulosum</i> )  |
| 93  | <i>Claviceps africana</i> Frederickson, Mantle & De Milliano 1991              | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla sorgo ( <i>Sorghum vulgare</i> )  |
| 94  | <i>Claviceps gigantea</i> SF Fuentes, Isla, Ullstrup & AE Rodr 1964 (anamorph) | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla maíz ( <i>Zea mays</i> )  |
| 95  | <i>Claviceps purpurea</i> (Fr.) Tul., 1853 (teleomorph)                        | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla sorgo ( <i>Sorghum vulgare</i> ), semilla trigo ( <i>Triticum aestivum</i> )  |
| 96  | <i>Choanephora cucurbitarum</i> (Berk. & Ravenel) Thaxt.                       | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla espinaca ( <i>Spinacia oleracea</i> ), semilla maíz amarillo ( <i>Zea mays</i> ), semilla papaya ( <i>Carica papaya</i> ), semilla zucchini ( <i>Cucurbita pepo</i> ), esquejes sin raíz ( <i>Vinca maculata</i> ), semilla ajonjolí ( <i>Sesamum indicum</i> ), semilla, pepino fresco ( <i>Cucumis sativus</i> ), semilla calabaza ( <i>Cucurbita maxima</i> ), semilla crotolaria ( <i>Crotalaria juncea</i> ), semilla ricino ( <i>Ricinus communis</i> ), semilla pimienta ( <i>Capsicum annum</i> ), semilla okra ( <i>Abelmoschus esculentus</i> )   |
| 97  | <i>Colletotrichum boninense</i> Moriwaki, Toy. Sato & Tsukiboshi               | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes sin raíz ( <i>Dracaena massangeana</i> )   |
| 98  | <i>Colletotrichum circinans</i> (Berk.) Voglino                                | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla cebollino ( <i>Allium schoenoprasum</i> ), cebolla fresca ( <i>Allium cepa</i> ).   |
| 99  | <i>Colletotrichum linicola</i> Pethybr. & Lafferty                             | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Grano linaza ( <i>Linum usitatissimum</i> )   |
| 100 | <i>Colletotrichum acutatum</i> Simmonds ex Simmonds                            | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Arándano fresco ( <i>Vaccinium corymbosum</i> ), planta raíz desnuda ( <i>Fragaria ananassa</i> ), ( <i>Olea europaea</i> ), planta enraizada con sustrato ( <i>Olea europaea</i> )   |
| 101 | <i>Colletotrichum kahawae</i> J.M. Waller & Bridge                             | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla café ( <i>Coffea eugenioides</i> ), ( <i>Coffea anthonyi</i> )  |
| 102 | <i>Cochliobolus carbonum</i> Nelson  | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla maíz ( <i>Zea mays</i> )  |
| 103 | <i>Colletotrichum sansevieriae</i> Miho Nakamura & Ohzono                      | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes sin raíz ( <i>Sansevieria trifasciata</i> )  |
| 104 | <i>Diaporthe gulyae</i> R.G. Shivas, S.M. Thoms. & A.J. Young                  | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla girasol ( <i>Helianthus annuus</i> )  |

| No. | Nombre Científico   | Grupo | Situación                             | Artículos reglamentados   |
|-----|---|-------|---------------------------------------|---|
| 105 | <i>Diaporthe helianthi</i> Munt.-Cvetk., Mihaljc. & M. Petrov                             | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla girasol ( <i>Helianthus annuus</i> )  |
| 106 | <i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>caulivora</i> Athow & Caldwell                       | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla soya ( <i>Glycine max</i> )   |
| 107 | <i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>meridionalis</i> F.A. Fern.                          | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla soya ( <i>Glycine max</i> )   |
| 108 | <i>Didymella bryoniae</i> (Auersw.) Rehm  | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla pepino ( <i>Cucumis sativus</i> )   |
| 109 | <i>Didymella fabae</i> G.J. Jellis & Punithalingam 1991                                   | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla haba ( <i>Vicia faba</i> )  |
| 110 | <i>Didymella lycopersici</i> Kleb.  | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla tomate ( <i>Solanum lycopersicum</i> )  |
| 111 | <i>Didymella pinodes</i> (Berk. & Bloxam) Petrak  | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla arveja ( <i>Pisum sativum</i> )   |
| 112 | <i>Diplodia seriata</i> De Not. (1845)  | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Manaza fresca ( <i>Malus domestica</i> )  |
| 113 | <i>Elsinoë ampelina</i> Shear   | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Uva fresca ( <i>Vitis vinifera</i> ), esquejes sin raíz ( <i>Vitis vinifera</i> )                                     |
| 114 | <i>Elsinoë batatas</i> Viégas & Jenkins   | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes sin raíz ( <i>Ipomoea batatas</i> )  |
| 115 | <i>Elsinoë mangiferae</i> Bitanc. & Jenkins   | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta enraizada con sustrato ( <i>Mangifera indica</i> )   |
| 116 | <i>Erysiphe biocellata</i> Ehrenb.  | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta enraizada ( <i>Plectranthus scutellarioides</i> )  |
| 117 | <i>Erysiphe necator</i> Schwein   | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Uva fresca ( <i>Vitis vinifera</i> ), esquejes ( <i>Vitis vinifera</i> )  |
| 118 | <i>Eutypa lata</i> (Pers.) Tul. & C.Tul.  | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes ( <i>Vitis vinifera</i> )  |
| 119 | <i>Fomitiporia mediterranea</i> M. Fisch.   | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes ( <i>Vitis vinifera</i> )  |
| 120 | <i>Fusarium culmorum</i> (W.G. Sm.) Sacc.   | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla eneldo ( <i>Anethum graveolens</i> ), forraje seco ( <i>Avena sativa</i> ), semilla ( <i>Lolium perenne</i> ) |
| 121 | <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>cepae</i> (Hanz.) Snyder & Hansen                      | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla cebolla ( <i>Allium cepa</i> )  |
| 122 | <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>cubense</i> tropical race 4 (E.F. Sm.) Snyder & Hansen | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Plantas banano y plátano ( <i>Musa spp</i> ), planta heliconia ( <i>Heliconia spp.</i> )                              |
| 123 | <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>elaëidis</i> Toovey                                    | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla pre-germinada ( <i>Elaeis guineensis</i> )  |
| 124 | <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>batatas</i> (Wollenw.) Snyder & Hansen                 | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes sin raíz, esquejes enraizados ( <i>Ipomoea batatas</i> )   |
| 125 | <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>cucumerinum</i> J.H. Owen                              | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla pepino ( <i>Cucumis sativus</i> )   |
| 126 | <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>lini</i> (Bolley) Snyder & H.N. Hansen                 | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Grano de linaza ( <i>Linum usitatissimum</i> ), semilla ( <i>Cyamopsis tetragonoloba</i> )                            |
| 127 | <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>niveum</i> (E.F. Sm.) Snyder & H.N. Hansen (anamorph)  | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla sandía ( <i>Citrullus lanatus</i> )   |
| 128 | <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>phaseoli</i> J.B. Kendr. & W.C. Snyder                 | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla frijol ( <i>Phaseolus vulgaris</i> )  |
| 129 | <i>Fusarium sporotrichioides</i> Sherb.   | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla maíz ( <i>Zea mays</i> ), grano maíz ( <i>Zea mays</i> )  |
| 130 | <i>Fusarium solani</i> f.sp. <i>cucurbitae</i> Snyder & Hansen                            | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla ayote ( <i>Cucurbita maxima</i> ), semilla zapallo, calabaza ( <i>Cucurbita moschata</i> )                    |

| No. | Nombre Científico  | Grupo | Situación                             | Artículos reglamentados  |
|-----|--|-------|---------------------------------------|--|
| 131 | <i>Gibberella avenacea</i> R.J. Cook   | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Zanahoria fresca ( <i>Daucus carota</i> ), semilla rábano ( <i>Raphanus sativus</i> ), semilla coliflor ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> ), semilla maíz ( <i>Zea mays</i> ), semilla frijol ( <i>Phaseolus vulgaris</i> ), semilla pepino ( <i>Cucumis sativus</i> ), semilla zanahoria ( <i>Daucus carota</i> ), semilla calabaza ( <i>Cucurbita pepo</i> ), semilla alfalfa ( <i>Medicago sativa</i> ), semilla repollo ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> ), semilla arveja ( <i>Pisum sativum</i> ), semilla arroz ( <i>Oryza sativa</i> ), semilla haba ( <i>Vicia faba</i> ), semilla remolacha ( <i>Beta vulgaris</i> ), semilla frijol ( <i>Phaseolus vulgaris</i> ), semilla zucchini ( <i>Cucurbita pepo</i> ), semilla soya ( <i>Glycine max</i> ), semilla ajo ( <i>Allium sativum</i> ), semilla alfalfa ( <i>Medicago sativa</i> ), semilla lechuga ( <i>Lactuca sativa</i> ), semilla brócoli ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i> ), semilla hinojo ( <i>Foeniculum vulgare</i> ) |
| 132 | <i>Gibberella circinata</i> Nirenberg & O'Donnell 1998   | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Madera aserrada pino ( <i>Pinus echinata</i> )   |
| 133 | <i>Gibberella pulicaris</i> (Fr.) Sacc. (teleomorph)   | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes ( <i>Gypsophila paniculata</i> )  |
| 134 | <i>Golovinomyces orontii</i> (Castagne) V.P. Heluta  | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes ( <i>Begonia hybrida</i> )  |
| 135 | <i>Guignardia bidwellii</i> (Ellis) Viala & Ravaz  | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes ( <i>Vitis vinifera</i> )   |
| 136 | <i>Heterobasidium annosum</i> (Fr.) Bref. sensu stricto  | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Arbol abeto ( <i>Pseudotsuga menziesii</i> ), madera pino ( <i>Pinus</i> sp.), ( <i>Pinus pinaster</i> )   |
| 137 | <i>Hyaloperonospora parasitica</i> (Pers.) Constant.   | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla brócoli ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i> ), esquejes ( <i>Lobularia maritima</i> ), semilla nabo ( <i>Brassica rapa</i> subsp. <i>rapa</i> ), semilla col china ( <i>Brassica rapa</i> subsp. <i>pekinensis</i> ), semilla col forrajera ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>viridis</i> ), semilla rábano ( <i>Raphanus sativus</i> ), semilla repollo ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> ), brócoli fresco ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i> ), coliflor fresco ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> ), repollo chino ( <i>Brassica rapa</i> subsp. <i>chinensis</i> )   |
| 138 | <i>Hymenula cerealis</i> Ellis & Everh.  | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla trigo ( <i>Triticum aestivum</i> )   |
| 139 | <i>Magnaporthe salvinii</i> (Catt.) R.A. Krause & R.K. Webster (1972) (teleomorph)                               | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla arroz ( <i>Oryza sativa</i> )  |
| 140 | <i>Marasmius palmivorus</i> Sharples   | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla pre-germinada ( <i>Elaeis guineensis</i> )   |
| 141 | <i>Microdochium panattonianum</i> (Berl.) B.Sutton, Galea & T.V. Price   | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla escarola ( <i>Cichorium endivia</i> )  |
| 142 | <i>Monilinia fructigena</i> Honey ex Whetzel 1945  | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Manzana fresca ( <i>Malus domestica</i> ), pera fresca ( <i>Pyrus communis</i> )   |
| 143 | <i>Monilinia fructicola</i> (G. Winter) Honey  | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Melocotón fresco ( <i>Prunus persica</i> ), ciruela fresca ( <i>Prunus domestica</i> ), cereza fresca ( <i>Prunus avium</i> )  |
| 144 | <i>Monilinia laxa</i> (Aderh. & Ruhland) Honey (teleomorph)  | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Melocotón fresco ( <i>Prunus persica</i> ), ciruela fresca ( <i>Prunus domestica</i> ), albaricoque fresco ( <i>Prunus americana</i> )   |
| 145 | <i>Moniliophthora perniciosa</i> (Stahel) Aime   | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Varetas ( <i>Theobroma cacao</i> )   |
| 146 | <i>Leptographium procerum</i> W.B. (Kendr.) M.J. Wingf. 1985   | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Madera aserrada pino ( <i>Pinus echinata</i> )   |
| 147 | <i>Leptosphaeria coniothyrium</i> (Fuckel) Sacc.   | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta raíz desnuda ( <i>Rosa floribunda</i> ), ( <i>Rosa hybrid tea</i> )   |
| 148 | <i>Leptosphaeria maculans</i> (Desm.) Ces. & de Not.   | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla repollo ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> ), semilla brócoli ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i> ), semilla repollo chino ( <i>Brassica rapa pekinensis</i> ), semilla coliflor ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> ), semilla nabo ( <i>Brassica rapa</i> subsp. <i>rapa</i> ), semilla col forrajera ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>viridis</i> )   |
| 149 | <i>Ligniera vasculorum</i> (Matz) Cook   | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes sin raíz ( <i>Saccharum officinarum</i> )   |
| 150 | <i>Neonectria ditissima</i> (Tul. & C. Tul.) Samuels & Rossman (teleomorph)                                      | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Pera fresca ( <i>Pyrus communis</i> )  |
| 151 | <i>Neonectria neomacrospora</i> (C. Booth & Samuels) Mantiri & Samuels (teleomorph)                              | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Arbol abeto ( <i>Abies fraseri</i> )   |
| 152 | <i>Neocosmospora euwallaceae</i> (S. Freeman, Z. Mendel, T. Aoki & O'Donnell) Sandoval-Denis, L. Lombard & Crous | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Yemas aguacate ( <i>Persea americana</i> )   |

| No. | Nombre Científico   | Grupo | Situación                             | Artículos reglamentados   |
|-----|---|-------|---------------------------------------|---|
| 153 | <i>Neoscytalidium dimidiatum</i> Crous and Slippers                                     | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes ( <i>Hylocereus undatus</i> )  |
| 154 | <i>Olivea tectonae</i> (T.S. Ramakr. & K. Ramakr.) J.L. Mulder 1973                     | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta enraizada con sustrato ( <i>Tectona grandis</i> )  |
| 155 | <i>Ophiostoma wageneri</i> (Goheen & F.W. Cobb) T.C. Harr.                              | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Arbol abeto ( <i>Pseudotsuga menziesii</i> )  |
| 156 | <i>Penicillium italicum</i> Stoll   | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Limón dulce fresco ( <i>Citrus aurantiifolia</i> ), mandarina fresca ( <i>Citrus reticulata</i> ), toronja fresca ( <i>Citrus x paradisi</i> ), naranja fresca ( <i>Citrus sinensis</i> ), limón ácido fresco ( <i>Citrus limon</i> )   |
| 157 | <i>Peronospora belbahrii</i> Thines   | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta enraizada ( <i>Plectranthus scutellarioides</i> )  |
| 158 | <i>Peronospora farinosa</i> f.sp. <i>betae</i> Byford (1967)                            | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla remolacha ( <i>Beta vulgaris</i> )  |
| 159 | <i>Peronospora manshurica</i> (Naumov) Syd. Ex Gäum.                                    | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla soya ( <i>Glycine max</i> )   |
| 160 | <i>Podosphaera aphanis</i> (Wallr.) U. Braun & S. Takam.                                | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Fresa fresca ( <i>Fragaria vesca</i> )  |
| 161 | <i>Podosphaera pannosa</i> (Wallr.) de Bary   | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Yemas rosa ( <i>Rosa</i> sp.), planta raíz desnuda ( <i>Rosa floribunda</i> ), ( <i>Rosa hybrid tea</i> ), planta enraizada con sustrato ( <i>Rosasp.</i> ), flores corte ( <i>Rosa moschata</i> ), ( <i>Rosa damascena</i> ), ( <i>Rosa</i> sp.), ( <i>Rosa multiflora</i> ) |
| 162 | <i>Podosphaera xanthii</i> (Castagne) U. Braun & Shishkoff                              | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes ( <i>Calibrachoa hybrida</i> ), ( <i>Lantana montevidensis</i> ), ( <i>Perilla hybrida</i> ), ( <i>Verbena peruviana</i> ), ( <i>Impatiens hawkeri</i> )   |
| 163 | <i>Polyscytalum pustulans</i> (M.N. Owen & Wakef.) M.B. Ellis                           | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Papa fresca ( <i>Solanum tuberosum</i> ), semilla papa ( <i>Solanum tuberosum</i> )   |
| 164 | <i>Plasmopara halstedii</i> (Farl.) Berl. & De Toni                                     | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla girasol ( <i>Helianthus annus</i> )   |
| 165 | <i>Podosphaera leucotricha</i> (Ellis & Everh.) E.S. Salmon                             | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Membrillo fresco ( <i>Cydonia oblonga</i> ), pera fresca ( <i>Pyrus communis</i> )  |
| 166 | <i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. de Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun 2003   | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta enraizada con sustrato ( <i>Citrus sinensis</i> )  |
| 167 | <i>Puccinia asparagi</i> DC. 1805   | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Espárrago fresco ( <i>Asparagus officinalis</i> ), semilla cebolla ( <i>Allium cepa</i> )   |
| 168 | <i>Puccinia horiana</i> Henn.   | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Flores corte ( <i>Chrysanthemum morifolium</i> )  |
| 169 | <i>Puccinia pittieriana</i> Henn. 1904  | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Tomate fresco ( <i>Solanum lycopersicum</i> )   |
| 170 | <i>Phaeoacremonium aleophilum</i> W. Gams, Crous, M.J. Wingf. & Mugnai                  | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes sin raíz ( <i>Vitis vinifera</i> ), uva fresca ( <i>Vitis vinifera</i> )   |
| 171 | <i>Phaeosphaeria nodorum</i> (E. Müll.) Hedjar.   | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla trigo ( <i>Triticum aestivum</i> )  |
| 172 | <i>Phaeoniella chlamydospora</i> (W. Gams, Crous, M.J. Wingf. & Mugnai) Crous & W. Gams | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Uva fresca ( <i>Vitis vinifera</i> ), Esquejes sin raíz ( <i>Vitis vinifera</i> )   |
| 173 | <i>Phakopsora pachyrhizi</i> Syd. & P. Syd.   | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla soya ( <i>Glycine max</i> )   |
| 174 | <i>Phoma pinodella</i> (L.K. Jones) Q. Chen & L. Cai (anamorph)                         | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla alfalfa ( <i>Medicago sativa</i> ), semilla arveja ( <i>Pisum sativum</i> )   |
| 175 | <i>Phomopsis longicolla</i> Hobbs   | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla mani ( <i>Arachis hypogaea</i> ), semilla soya ( <i>Glycine max</i> )   |
| 176 | <i>Phomopsis vexans</i> (Sacc. & P. Syd.) Harter 1914 (teleomorph)                      | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla berenjena ( <i>Solanum melongena</i> )  |
| 177 | <i>Phomopsis viticola</i> (Sacc.) Sacc. (anamorph)                                      | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes sin raíz ( <i>Vitis vinifera</i> )   |



| No. | Nombre Científico  | Grupo | Situación                             | Artículos reglamentados  |
|-----|--|-------|---------------------------------------|--|
| 178 | <i>Phymatotrichopsis omnivora</i> (Duggar) Hennebert (anamorph)                  | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes sin raíz ( <i>Diascia barberae</i> ), ( <i>Lamium maculatum</i> ), ( <i>Helichrysum petiolare</i> ), ( <i>Euphorbia pulcherrima</i> ), ( <i>Hermannia hybrida</i> ), ( <i>Vitis vinifera</i> )  |
| 179 | <i>Pyrenopeziza brassicae</i> B. Sutton & Rawl.                                  | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla repollo ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> )  |
| 180 | <i>Pyrenophora graminea</i> S. Ito & Kurib., 1930                                | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla cebada ( <i>Hordeum vulgare</i> )  |
| 181 | <i>Pyrenophora tritici-repentis</i> (Died.) Drechsler                            | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla trigo ( <i>Triticum aestivum</i> )   |
| 182 | <i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert & Cohn) J. Schrot                           | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla cacao ( <i>Theobroma cacao</i> ), semilla tomate ( <i>Solanum lycopersicum</i> ), semilla sandía ( <i>Citrullus lanatus</i> ), plantas raíz desnuda, varetas ( <i>Theobroma cacao</i> ), esquejes ( <i>Pelargonium sp</i> ), esquejes enraizados ( <i>Cereus forbesii</i> ), planta raíz desnuda ( <i>Fragaria vesca</i> )   |
| 183 | <i>Phytophthora capsici</i> Leonian  | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Pimiento fresco ( <i>Capsicum annuum</i> ), sandía fresca ( <i>Citrullus lanatus</i> ), pepino fresco ( <i>Cucumis sativus</i> ),  |
| 184 | <i>Phytophthora cryptogea</i> Pethybr. & Laff.                                   | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Cebolla fresca ( <i>Allium cepa</i> ), esquejes velo de novia ( <i>Gypsophila paniculata</i> ), esquejes ( <i>Euphorbia pulcherrima</i> ), ( <i>Lantana camara</i> ), ( <i>Celosia argentea</i> ), ( <i>Petunia hybrida</i> ), ( <i>Celosia spicata</i> ), ( <i>Gypsophila paniculata</i> ), ( <i>Vitis vinifera</i> ), planta raíz desnuda ( <i>Chrysanthemum pacifium</i> ), semilla papa ( <i>Solanum tuberosum</i> ), manzana fresca ( <i>Malus domestica</i> ), bulbos gladiolos ( <i>Gladiolus hybrids</i> ), planta raíz desnuda ( <i>Gerbera jamesonii</i> ), esquejes enraizados ( <i>Gerbera jamesonii</i> ), ( <i>Euphorbia pulcherrima</i> ), remolacha fresca ( <i>Beta vulgaris</i> ), planta enraizada con sustrato ( <i>Lantana camara</i> ) |
| 185 | <i>Phytophthora erythroseptica</i> var. <i>erythroseptica</i> (Waterhouse, 1963) | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes ( <i>Saccharum officinarum</i> ), semilla papa ( <i>Solanum tuberosum</i> )   |
| 186 | <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman (1940)                                     | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta raíz desnuda ( <i>Fragaria ananassa</i> )   |
| 187 | <i>Phytophthora katsurae</i> W.H. Ko & H.S. Chang                                | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes ( <i>Theobroma cacao</i> )  |
| 188 | <i>Phytophthora heveae</i> A. W. Thomps  | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes, plántulas, varetas ( <i>Theobroma cacao</i> ), planta enraizada con sustrato ( <i>Persea americana</i> )   |
| 189 | <i>Phytophthora megasperma</i> Drechsler   | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Manzana fresca ( <i>Malus domestica</i> )  |
| 190 | <i>Pythium graminicola</i> Subram.   | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes ( <i>Saccharum officinarum</i> )  |
| 191 | <i>Pythium vexans</i> de Bary  | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Rizoma jengibre ( <i>Zingiber officinale</i> ), tubérculo malanga ( <i>Colocasia esculenta</i> ), semilla papa ( <i>Solanum tuberosum</i> ), planta raíz desnuda ( <i>Theobroma cacao</i> ), planta enraizada con sustrato ( <i>Persea americana</i> ), ( <i>Eucalyptus urophylla</i> )  |
| 192 | <i>Puccinia allii</i> (DC.) Rudolphi (anamorph)                                  | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Ajo fresco ( <i>Allium sativum</i> ), semilla, cebolla fresca ( <i>Allium cepa</i> )   |
| 193 | <i>Ehrhagmidium mucronatum</i> (Pers.) Schldl.                                   | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta raíz desnuda ( <i>Rosa floribunda</i> ), ( <i>Rosa hybrid tea</i> ), planta enraizada con sustrato ( <i>Rosasp.</i> )   |
| 194 | <i>Rosellinia necatrix</i> Prill. (teleomorph)                                   | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes ( <i>Vitis vinifera</i> ), esquejes enraizados ( <i>Fragaria vesca</i> )  |
| 195 | <i>Rigidoporus microporus</i> (Fr.) Overeem                                      | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes, plantas raíz desnuda ( <i>Theobroma cacao</i> )  |
| 196 | <i>Rhodococcus fascians</i> (Tilford 1936) Goodfellow 1984                       | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta raíz desnuda ( <i>Kalanchoe millotii</i> )  |
| 197 | <i>Septoria apicola</i> Speg   | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla perejil ( <i>Petroselinum crispum</i> ), semilla apio ( <i>Apium graveolens</i> )  |
| 198 | <i>Septoria passiflorae</i>  | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Maracuya fresca ( <i>Passiflora edulis</i> )   |
| 199 | <i>Septoria glycines</i> Hemmi   | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla soya ( <i>Glycine max</i> )  |
| 200 | <i>Sirococcus conigenus</i> (DC.) P.F. Cannon & Minter                           | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Arbol abeto ( <i>Pseudotsuga menziesii</i> )   |

| No. | Nombre Científico  | Grupo     | Situación                             | Artículos reglamentados   |
|-----|--|-----------|---------------------------------------|---|
| 201 | <i>Sphaecelia sorghi</i>   | Fungi     | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla sorgo ( <i>Sorghum vulgare</i> )  |
| 202 | <i>Stromatinia cepivora</i> (Berk.) Whetzel (anamorph)                 | Fungi     | Ausente: no hay registros de la plaga | Ajo fresco ( <i>Allium sativum</i> ), semilla, cebolla fresca ( <i>Allium cepa</i> ), semilla cebollín ( <i>Allium fistulosum</i> ) |
| 203 | <i>Sphaeropsis sapinea</i> (Fr.) Dyko & B. Sutton 1980                 | Fungi     | Ausente: no hay registros de la plaga | Madera aserrada ( <i>Pinus echinata</i> ), ( <i>Pinus radiata</i> )   |
| 204 | <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival                     | Fungi     | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla papa ( <i>Solanum tuberosum</i> ), papa fresca ( <i>Solanum tuberosum</i> )   |
| 205 | <i>Thecaphora solani</i> (Thirum & M.J. O'Brien) Mordue 1988           | Fungi     | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla papa ( <i>Solanum tuberosum</i> ), papa fresca ( <i>Solanum tuberosum</i> )   |
| 206 | <i>Tilletia laevis</i> J.G. Kühn                                       | Fungi     | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla, grano trigo ( <i>Triticum aestivum</i> )   |
| 207 | <i>Urocystis agropyri</i> (Preuss) A.A. Fisch. Waldh. 1867             | Fungi     | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla trigo ( <i>Triticum aestivum</i> )  |
| 208 | <i>Urocystis cepulae</i> Frost   | Fungi     | Ausente: no hay registros de la plaga | Ajo fresco ( <i>Allium sativum</i> ), cebolla fresca ( <i>Allium cepa</i> ), semilla ajo ( <i>Allium fistulosum</i> )               |
| 209 | <i>Uromyces beticola</i> (Belly nck) Boerema et al                     | Fungi     | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla remolacha ( <i>Beta vulgaris</i> )  |
| 210 | <i>Uromyces viciae-fabae</i> (Pers.) J. Schröt. (1875)                 | Fungi     | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla haba ( <i>Vicia faba</i> )  |
| 211 | <i>Venturia inaequalis</i> (Cooke) G.Winter                            | Fungi     | Ausente: no hay registros de la plaga | Manzana fresca ( <i>Malus domestica</i> )   |
| 212 | <i>Bremia lactucae</i> Regel (1843)                                    | Chromista | Ausente: no hay registros de la plaga | Lechuga fresca ( <i>Lactuca sativa</i> )  |
| 213 | <i>Globisporangium splendens</i> (Hans Braun) Uzuhashi, Tojo & Kakish. | Chromista | Ausente: no hay registros de la plaga | Tubérculos malanga ( <i>Colocasia esculenta</i> ), planta enraizada con sustrato ( <i>Mangifera indica</i> )                        |
| 214 | <i>Phytophthora cambivora</i> (Petri) Buisman                          | Chromista | Ausente: no hay registros de la plaga | Madera aserrada haya ( <i>Fagus sylvatica</i> )   |
| 215 | <i>Phytophthora sojae</i> Kaufm. & Gerd. (teleomorph)                  | Chromista | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla soya ( <i>Glycine max</i> )   |
| 216 | <i>Peronophythora litchii</i> Chen ex Ko, Chang, Su, Chen & Leu        | Chromista | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla lichi ( <i>Litchi chinensis</i> )   |
| 217 | <i>Peronosclerospora sacchari</i> (T. Miyake) Shirai & Hara            | Chromista | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla maiz ( <i>Zea mays</i> )  |
| 218 | <i>Peronosclerospora philippinensis</i> (W. Weston) C.G. Shaw, 1978    | Chromista | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla maiz ( <i>Zea mays</i> )  |
| 219 | <i>Peronospora farinosa</i> f.sp. <i>chenopodii</i> Byford             | Chromista | Ausente: no hay registros de la plaga | Grano quinoa ( <i>Chenopodium quinoa</i> )  |
| 220 | <i>Peronospora farinosa</i> f.sp. <i>spinaciae</i> Byford              | Chromista | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla espinaca ( <i>Spinacia oleracea</i> )   |
| 221 | <i>Peronospora sparsa</i> Berk.  | Chromista | Ausente: no hay registros de la plaga | Flores corte ( <i>Rosa</i> sp.), planta raíz desnuda ( <i>Rosa floribunda</i> ), ( <i>Rosa hybrid tea</i> ), ( <i>Rosa</i> sp.)     |
| 222 | <i>Plasmopara viticola</i> (Berk. & M.A. Curtis) Berl. & de Toni       | Chromista | Ausente: no hay registros de la plaga | Uva fresca ( <i>Vitis vinifera</i> )  |
| 223 | <i>Eythium myriotylum</i> Drechsler                                    | Chromista | Ausente: no hay registros de la plaga | Jengibre fresco ( <i>Zingiber officinale</i> )  |
| 224 | <i>Globisporangium debaryanum</i> (R. Hesse) Uzuhashi, Tojo & Kakish.  | Chromista | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes enraizados ( <i>Fragaria vesca</i> )   |
| 225 | <i>Sclerophthora rayssiae</i> var. <i>zeae</i> Payak & Renfro          | Chromista | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla maiz ( <i>Zea mays</i> )  |
| 226 | <i>Spongopora subterranea</i> f.sp. <i>subterranea</i> J.A. Toml.      | Protozoo  | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla papa ( <i>Solanum tuberosum</i> )   |

| No. | Nombre Científico                               | Grupo   | Situación                             | Artículos reglamentados   |
|-----|---|---------|---------------------------------------|---|
| 227 | <i>Acrolepiopsis assectella</i> Zeller          | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Cebolla fresca ( <i>Allium cepa</i> )   |
| 228 | <i>Acyrtosiphon pisum</i> Harris, 1776          | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla alfalfa ( <i>Medicago sativa</i> )  |
| 229 | <i>Adoretus sinicus</i> Burmeister, 1855        | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta raíz desnuda ( <i>Rosa floribunda</i> ), ( <i>Rosa hybrid tea</i> )  |
| 230 | <i>Adoxophyes orana</i> Fischer von Röslerstamm | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Ciruela fresca ( <i>Prunus domestica</i> ), manzana fresca ( <i>Malus domestica</i> ), nectarina fresca ( <i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i> ), melocotón fresco ( <i>Prunus persica</i> ), pera fresca ( <i>Pyrus communis</i> )  |
| 231 | <i>Aonidiella aurantii</i> (Maskell)            | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Mandarina fresca ( <i>Citrus reticulata</i> ), naranja fresca ( <i>Citrus sinensis</i> ), limón dulce fresco ( <i>Citrus aurantiifolia</i> ), esquejes ( <i>Manilkara zapota</i> ), ( <i>Mangifera indica</i> ), ( <i>Achras zapota</i> ), ( <i>Psidium guajava</i> ), limón persa fresco ( <i>Citrus latifolia</i> ), planta raíz desnuda, planta enraizada con sustrato olivo ( <i>Olea europaea</i> )  |
| 232 | <i>Agrilus bilineatus</i> (Weber, 1801)         | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Madera aserrada roble blanco ( <i>Quercus alba</i> )  |
| 233 | <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire            | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Madera ulmus ( <i>Ulmus</i> sp.)  |
| 234 | <i>Agrotis segetum</i> Denis & Schiffermüller   | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta café ( <i>Coffea</i> sp.)  |
| 235 | <i>Alphitobius laevigatus</i> (Fabricius)       | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Grano arroz ( <i>Oryza sativa</i> )   |
| 236 | <i>Anastrepha grandis</i> (Macquart)            | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Zapallo fresco ( <i>Cucurbita</i> sp.), sandía fresca ( <i>Citrullus lanatus</i> ), melón fresco ( <i>Cucumis melo</i> ), zucchini fresco ( <i>Cucurbita pepo</i> )   |
| 237 | <i>Anastrepha suspensa</i> (Loew)               | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Guayaba fresca ( <i>Psidium guajava</i> ), mango fresco ( <i>Mangifera indica</i> )   |
| 238 | <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky)   | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Madera sin aserrar Acer ( <i>Acer saccharum</i> ), plywood arce ( <i>Acer saccharum</i> )   |
| 239 | <i>Anthonomus signatus</i> Say                  | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Fresa fresca ( <i>Fragaria ananassa</i> )   |
| 240 | <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say, 1831        | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Manzana fresca ( <i>Malus domestica</i> )   |
| 241 | <i>Aleurodicus destructor</i> Mackie, 1912      | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla nuez de coco ( <i>Cocos nucifera</i> )  |
| 242 | <i>Aonidiella orientalis</i> (Newstead, 1894)   | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Varetas naranja ( <i>Citrus sinensis</i> ), ( <i>Citrus reticulata</i> ), ( <i>Citrus paradisi</i> ), ( <i>Citrus limon</i> ), ( <i>Mangifera indica</i> ), esquejes sin raíz ( <i>Ficus elastica</i> var. <i>tineke</i> ), ( <i>Ficus elastica</i> var. <i>burgundy</i> ), planta raíz desnuda, planta enraizada con sustrato olivo ( <i>Olea europaea</i> )   |
| 243 | <i>Aonidomytilus albus</i> (Cockerell, 1893)    | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Varetas yuca ( <i>Manihot esculenta</i> )   |
| 244 | <i>Atherigona orientalis</i> Schiner            | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Melón fresco ( <i>Cucumis melo</i> ), tomate fresco ( <i>Solanum lycopersicum</i> ), repollo fresco ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> ), brócoli fresco ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i> ), pimiento fresco ( <i>Capsicum annuum</i> ), pepino fresco ( <i>Cucumis sativus</i> ), coliflor fresco ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> ), mango fresco ( <i>Mangifera indica</i> )   |
| 245 | <i>Archips podanus</i>                          | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Manzanas fresca ( <i>Malus domestica</i> )  |
| 246 | <i>Aspidiella sacchari</i> (Cockerell)          | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes ( <i>Saccharum officinarum</i> )   |
| 247 | <i>Aspidiotus nerii</i> Bouché, 1833            | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Orquídeas raíz desnuda ( <i>Acacallis cyanea</i> ), ( <i>Anguloa cliftonii</i> ), ( <i>Cochleanthes timbiensis</i> ), ( <i>Dracula bella</i> ), ( <i>Dracula chimaera</i> ) ( <i>Embreea rodigasiana</i> ), kiwi fresco ( <i>Actinidia deliciosa</i> , <i>Actinidia chinensis</i> ), flores corte cimbidium ( <i>Cymbidium hybrida</i> ), planta enraizada ( <i>Rosas</i> sp.), mango fresco ( <i>Mangifera indica</i> ), planta raíz desnuda, planta enraizada con sustrato olivo ( <i>Olea europaea</i> ) |
| 248 | <i>Asproparthenis punctiventris</i> (Germar)    | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla papa ( <i>Solanum tuberosum</i> )   |

| No. | Nombre Científico                                | Grupo   | Situación                             | Artículos reglamentados  |
|-----|--|---------|---------------------------------------|--|
| 249 | <i>Aulacaspis tubercularis</i> Newstead          | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Varetas mango ( <i>Mangifera indica</i> ), aguacate fresco ( <i>Persea americana</i> ), mango fresco ( <i>Mangifera indica</i> )   |
| 250 | <i>Aulacaspis yasumatsui</i> Tagaki              | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta raiz desnuda ( <i>Cycas revoluta</i> ), Follaje ( <i>Cycas rumphii</i> )  |
| 251 | <i>Bactrocera carambolae</i> Drew & Hancock      | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Mango fresco ( <i>Mangifera indica</i> )   |
| 252 | <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel, 1912)        | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Naranjas fresca ( <i>Citrus sinensis</i> ), limón dulce fresco ( <i>Citrus aurantiifolia</i> ), cereza fresca ( <i>Prunus avium</i> ), melón fresco ( <i>Cucumis melo</i> ), sandía fresca ( <i>Citrullus lanatus</i> )  |
| 253 | <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel)             | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Sandía fresca ( <i>Citrullus lanatus</i> )   |
| 254 | <i>Bactrocera tsuneonis</i> (Miyake)             | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Mandarina fresca ( <i>Citrus reticulata</i> )  |
| 255 | <i>Brevicoryne brassicae</i> Linnaeus, 1758      | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Coliflor fresco ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> ), mostaza china fresca ( <i>Brassica juncea</i> ), repollo fresco ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> )   |
| 256 | <i>Bruchus pisorum</i> Linnaeus, 1758            | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Arvejas secas ( <i>Pisum sativum</i> ), semilla arveja ( <i>Pisum sativum</i> )  |
| 257 | <i>Cacoecimorpha pronubana</i> Hübner            | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Flores corte ( <i>Dianthus caryophyllus</i> )  |
| 258 | <i>Callosobruchus analis</i> Fabricius           | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Grano ajonjolí ( <i>Sesamum indicum</i> ), ajonjolí descortezado ( <i>Sesamum indicum</i> )  |
| 259 | <i>Callosobruchus chinensis</i> (Linnaeus, 1758) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Grano arroz ( <i>Oryza sativa</i> ), grano soya ( <i>Glycine max</i> )   |
| 260 | <i>Cacyreus marshalli</i> Butler, 1898           | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes ( <i>Pelargonium</i> sp.)   |
| 261 | <i>Caryedon serratus</i> (Olivier)               | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Maní con cascara ( <i>Arachis hypogaea</i> )   |
| 262 | <i>Carposina sasakii</i> Matsumura               | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Manzana fresca ( <i>Malus domestica</i> ), pera fresca ( <i>Pyrus communis</i> )   |
| 263 | <i>Cassida bivittata</i> Say                     | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta enraizada ( <i>Ipomoea batatas</i> )  |
| 264 | <i>Caulophilus oryzae</i> (Gyllenhal, 1838)      | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Garbanzo fresco ( <i>Cicer arietinum</i> ), grano maiz ( <i>Zea mays</i> ), semilla maiz ( <i>Zea mays</i> ), grano mijo ( <i>Panicum miliaceum</i> )  |
| 265 | <i>Ceratitidis rosa</i>                          | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Papaya ( <i>Carica papaya</i> ), mandarina ( <i>Citrus reticulata</i> ), mandarina ( <i>Citrus aurantium</i> var. <i>sinensis</i> ), limón ( <i>Citrus limon</i> ), café ( <i>Coffea arabica</i> ), nispero ( <i>Eriobotrya japonica</i> ), higo ( <i>Ficus carica</i> ), lichi ( <i>Litchi chinensis</i> ), manzana ( <i>Malus domestica</i> ), mango ( <i>Mangifera indica</i> ), aguacate ( <i>Persea americana</i> ), albaricoque ( <i>Prunus armeniaca</i> ), ciruela ( <i>Prunus domestica</i> ), durazno ( <i>Prunus persica</i> ), guayaba ( <i>Psidium guajava</i> ), pera ( <i>Pyrus communis</i> ), tomate ( <i>Solanum lycopersicum</i> ), uva ( <i>Vitis vinifera</i> ) |
| 266 | <i>Ceroplastes ceriferus</i> (Fabricius, 1798)   | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes, planta enraizada ( <i>Mangifera indica</i> ), yemas ( <i>Persea americana</i> )  |
| 267 | <i>Ceroplastes floridensis</i> Comstock, 1881    | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta con sustrato ( <i>Citrus sinensis</i> )   |
| 268 | <i>Ceroplastes rusci</i> (Linnaeus, 1758)        | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Toronja fresca ( <i>Citrus x paradisi</i> ), kiwi fresco ( <i>Actinidia chinensis</i> )  |
| 269 | <i>Ceroplastes rubens</i> Maskell, 1893          | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta raiz desnuda ( <i>Areca lalitoba</i> ), ( <i>Areca macrocalyx</i> ), ( <i>Bentinckia nicobarica</i> ), ( <i>Burretiockentia hapala</i> ), ( <i>Butia yatay</i> ), ( <i>Caryota zebrina</i> ), ( <i>Carpoxylom macrospermum</i> ), ( <i>Clinostigma savoryanum</i> ), ( <i>Copernicia alba</i> ), ( <i>Copernicia prunifera</i> ), ( <i>Cyrtostachys elegans</i> ), ( <i>Dictyosperma album</i> ), planta enraizada con sustrato ( <i>Mangifera indica</i> ), flores corte ( <i>Chrysanthemum morifolium</i> ), varetas ( <i>Mangifera indica</i> )  |
| 270 | <i>Ceutorhynchus assimilis</i> (Paykull, 1792)   | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla repollo ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> )  |
| 271 | <i>Conogethes punctiferalis</i> (Guenée, 1854)   | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Rizomas jengibre ( <i>Zingiber officinale</i> )  |

| No. | Nombre Científico                              | Grupo   | Situación                             | Artículos reglamentados  |
|-----|--|---------|---------------------------------------|--|
| 272 | <i>Conotrachelus nenuphar</i> (Herbst)         | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Fresa fresca ( <i>Fragaria ananassa</i> )  |
| 273 | <i>Conotrachelus perseae</i> Barber            | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Aguacate fresco, semilla ( <i>Persea americana</i> )   |
| 274 | <i>Conotrachelus serpentinus</i>               | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Aguacate fresco ( <i>Persea americana</i> )  |
| 275 | <i>Contarinia pseudotsugae</i> Condrashoff     | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Arbol abeto ( <i>Pseudotsuga menziesii</i> )   |
| 276 | <i>Coptotermes sjostedti</i> Holmgren          | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Madera sapelli ( <i>Entandrophragma cylindricum</i> )  |
| 277 | <i>Copitarsia decolora</i> (Guenée, 1852)      | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Flores corte ( <i>Asitromeria hybrida</i> )  |
| 278 | <i>Crociosema plebejana</i> Zeller, 1847       | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Okra fresca ( <i>Obelmoschus esculentus</i> )  |
| 279 | <i>Chaetanaphothrips orchidii</i> (Moulton)    | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Flores corte ( <i>Anthurium andraeanum</i> )   |
| 280 | <i>Chaetanaphothrips signipennis</i> (Bagnall) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Flores corte ( <i>Strelitzia reginae</i> ), follaje ( <i>Dracaena marginata</i> ), ( <i>Cordyline fruticosa</i> )  |
| 281 | <i>Choristoneura freemani</i> Razowski, 2008   | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Arbol abeto ( <i>Pseudotsuga menziesii</i> ), ( <i>Abies fraseri</i> )   |
| 282 | <i>Choristoneura fumiferana</i> (Clemens)      | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Arbol abeto ( <i>Pseudotsuga menziesii</i> ), ( <i>Abies fraseri</i> )   |
| 283 | <i>Chromatomyia horticola</i> Goureau, 1851    | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta verbena ( <i>Verbena canadensis</i> ), esquejes enraizados ( <i>Calibrachoa hybrida</i> ), esquejes ( <i>Althernanthera ficoidea</i> ), ( <i>Erysimum linifolium</i> ), ( <i>Osteospermum ecklonis</i> ), ( <i>Sanvitalia procumbens</i> )  |
| 284 | <i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper)          | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Tabaco en rama ( <i>Nicotiana tabacum</i> )  |
| 285 | <i>Ctenarytaina eucalypti</i> (Maskell, 1890)  | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Follaje eucalipto ( <i>Eucalyptus globulus</i> ), ( <i>Eucalyptus pulverulenta</i> )   |
| 286 | <i>Cryptoblabes gnidiella</i> (Millière, 1867) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Granada fresca ( <i>Punica granatum</i> )  |
| 287 | <i>Cydia pomonella</i> Linnaeus                | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Melocotón fresco ( <i>Prunus persica</i> ), ciruela fresca ( <i>Prunus domestica</i> ), albaricoque fresco ( <i>Prunus americana</i> ), cereza fresca ( <i>Prunus avium</i> ), nectarina fresca ( <i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i> ), uva fresca ( <i>Vitis vinifera</i> ), manzana fresca ( <i>Malus domestica</i> ) |
| 288 | <i>Cydia latiferreana</i> (Walsingham, 1879)   | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Granada fresca ( <i>Punica granatum</i> )  |
| 289 | <i>Dasineura brassicae</i> (Winnertz), 1853    | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla repollo ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> )  |
| 290 | <i>Dacus ciliatus</i> Loew                     | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Melón fresco ( <i>Cucumis melo</i> ), sandía fresca ( <i>Citrullus lanatus</i> )   |
| 291 | <i>Dendrolimus pini</i> (Linnaeus, 1758)       | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Laminas de madera pino y alamo   |
| 292 | <i>Dendrolimus tabulaeformis</i> Tsai & Liu    | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Laminas de madera pino y alamo   |
| 293 | <i>Delia antiqua</i> Meigen                    | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Cebolla fresca ( <i>Allium cepa</i> )  |
| 294 | <i>Delia platura</i> (Meigen)                  | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla coliflor ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>botryti</i> )  |
| 295 | <i>Diplocarpon rosae</i> F.A. Wolf             | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Yemas rosa ( <i>Rosa</i> sp.), planta enraizada con sustrato ( <i>Rosa</i> sp.)  |
| 296 | <i>Diaprepes abbreviatus</i> (Linnaeus, 1758)  | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta enraizada con sustrato ( <i>Psidium guajava</i> )   |

| No. | Nombre Científico                             | Grupo   | Situación                             | Artículos reglamentados  |
|-----|---|---------|---------------------------------------|--|
| 297 | <i>Diaxenes phalaenopsidis</i> Fisher         | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta raiz desnuda ( <i>Dendrobium</i> sp.), planta enraizada con sustrato ( <i>Phalaenopsis</i> sp.)   |
| 298 | <i>Diaphorina citri</i> Kuwayama              | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta enraizada con sustrato( <i>Citrus sinensis</i> )  |
| 299 | <i>Dysmicoccus neobrevipes</i> Beardsley      | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta enraizada con sustrato( <i>Psidium guajava</i> ), rambután fresco ( <i>Nephelium lappaceum</i> ), varetas cacao ( <i>Theobroma cacao</i> )  |
| 300 | <i>Dyspessa ulula</i> (Borkhausen, 1790)      | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Cebolla fresca ( <i>Allium cepa</i> )  |
| 301 | <i>Drosophila melanogaster</i> Meigen         | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Uvas fresca ( <i>Vitis vinifera</i> )  |
| 302 | <i>Drosophila sukuzii</i> Matsumura           | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Arándano fresco ( <i>Vaccinium myrtillus</i> ), higo fresco ( <i>Ficus carica</i> ), fresa fresca ( <i>Fragaria ananassa</i> ), uva fresca ( <i>Vitis vinifera</i> ), melocotón fresco ( <i>Prunus persica</i> )   |
| 303 | <i>Duponchelia fovealis</i> Zeller            | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes( <i>Euphorbia pulcherrima</i> ), esquejes enraizados( <i>Gerbera connata</i> )  |
| 304 | <i>Epicaerus cognatus</i> Sharp               | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Papa fresca ( <i>Solanum tuberosum</i> )   |
| 305 | <i>Epidiaspis leperii</i> (Signoret)          | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Melocotón fresco ( <i>Prunus persica</i> ), manzana fresca ( <i>Malus domestica</i> ), nectarina fresca ( <i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i> ), uva fresca ( <i>Vitis vinifera</i> ), ciruela fresca ( <i>Prunus domestica</i> ), planta raiz desnuda, planta enraizada con sustrato olivo ( <i>Olea europaea</i> ) |
| 306 | <i>Epichoristodes acerbella</i> (Walker)      | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes( <i>Dianthus caryophyllus</i> ), ( <i>Pelargonium</i> sp.)  |
| 307 | <i>Epiphyas postvittana</i> Walker            | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta aguacate ( <i>Persea americana</i> ), kiwi fresco ( <i>Actinidia chinensis</i> )  |
| 308 | <i>Ephestia kuehniella</i> Zeller             | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Grano trigo ( <i>Triticum aestivum</i> ), grano cebada ( <i>Hordeum vulgare</i> ), cereal soya y maíz azucarado, harina maíz ( <i>Zea mays</i> ), harina mani ( <i>Arachis hypogaea</i> )  |
| 309 | <i>Eupoecilia ambiguella</i> Hübner (1796)    | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Uva fresca ( <i>Vitis vinifera</i> )   |
| 310 | <i>Epitrix tuberis</i> Gentner, 1944          | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla malva real ( <i>Alcea rosea</i> )  |
| 311 | <i>Eriococcus ironsidei</i> Williams          | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta enraizada con compost de corteza de pino y perlita macadamia ( <i>Macadamia integrifolia</i> )  |
| 312 | <i>Eriosoma lanigerum</i> (Hausmann, 1802)    | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Manzana fresca ( <i>Malus domestica</i> )  |
| 313 | <i>Erosomyia mangiferae</i> Felt              | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Mango fresco ( <i>Mangifera indica</i> )   |
| 314 | <i>Eumerus strigatus</i> (Fallén)             | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Cebolla fresca ( <i>Allium cepa</i> )  |
| 315 | <i>Euwallacea destruens</i> (Blandford)       | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes( <i>Tectona grandis</i> )   |
| 316 | <i>Euwallacea fornicatus</i> (Eichhoff, 1868) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Varetas aguacate ( <i>Persea americana</i> )   |
| 317 | <i>Frankliniella auripes</i> Hood, 1915       | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Flores corte ( <i>Delphinium alpinum</i> )   |
| 318 | <i>Frankliniella fusca</i> (Hinds, 1902)      | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Pimiento fresco ( <i>Capsicum annuum</i> )   |
| 319 | <i>Frankliniella schultzei</i> (Trybom, 1910) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Flores corte( <i>Protea cynaroides</i> ), follaje( <i>Eustoma grandiflorum</i> )   |
| 320 | <i>Glycaspis brimblecombei</i> Moore          | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Follaje( <i>Eucalyptus globulus</i> )  |
| 321 | <i>Gonipterus gibberus</i> Boisduval, 1835    | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes( <i>Eucalyptus</i> sp.)   |

| No. | Nombre Científico                                     | Grupo   | Situación                             | Artículos reglamentados   |
|-----|---|---------|---------------------------------------|---|
| 322 | <i>Gnathotrichus sulcatus</i> (LeConte, 1868)         | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Madera pino ( <i>Pinus</i> sp.)   |
| 323 | <i>Grapholita inopinata</i> Heinrich                  | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Manzana fresca ( <i>Malus domestica</i> )   |
| 324 | <i>Grapholita molesta</i> (Busck)                     | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Manzana fresca ( <i>Malus domestica</i> ), nectarina fresca ( <i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i> ), melocotón fresco ( <i>Prunus persica</i> ), ciruela fresca ( <i>Prunus domestica</i> ), albaricoque fresco ( <i>Prunus americana</i> ), pera fresca ( <i>Pyrus communis</i> )  |
| 325 | <i>Haplaxius crudus</i> (Van Duzee 1907)              | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Follaje ( <i>Phoenix canariensis</i> )  |
| 326 | <i>Haplothrips tritici</i> (Kurdjumov, 1912)          | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Espigas trigo ( <i>Triticum aestivum</i> )  |
| 327 | <i>Harmonia axyridis</i> Pallas                       | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Uva fresca ( <i>Vitis vinifera</i> )  |
| 328 | <i>Hemiberlesia rapax</i> (Comstock) 1881             | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Kiwi fresco ( <i>Actinidia deliciosa</i> , <i>Actinidia chinensis</i> ), flores corte ( <i>Rosa</i> sp.), planta raíz desnuda, planta enraizada con sustrato olivo ( <i>Olea europaea</i> )   |
| 329 | <i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché             | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Aguacate fresco ( <i>Persea americana</i> ), flores corte ( <i>Cymbidium hybrid</i> )   |
| 330 | <i>Hercinothrips bicinctus</i> (Bagnall)              | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Banano fresco ( <i>Musa</i> spp.)   |
| 331 | <i>Hercinothrips femoralis</i> (Reuter)               | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes enraizados ( <i>Sedum bouvardia num</i> ), planta enraizada con sustrato ( <i>Phalaenopsis</i> sp.), esquejes sin raíz ( <i>Sansevieria trifasciata</i> )  |
| 332 | <i>Hemiberlesia lataniae</i> (Signoret)               | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Varetas aguacate ( <i>Persea americana</i> ), kiwi fresco ( <i>Actinidia chinensis</i> )  |
| 333 | <i>Homalodisca vitripennis</i> (Germar)               | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Uvas fresca ( <i>Vitis vinifera</i> ), yemas aguacate ( <i>Persea americana</i> )   |
| 334 | <i>Hyblaea pueria</i> (Cramer, 1777)                  | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Plántulas teca ( <i>Tectona grandis</i> )   |
| 335 | <i>Hypogeococcus pungens</i> Granara de Willink, 1981 | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta raíz desnuda ( <i>Cereus forbesii</i> ), esquejes ( <i>Gomphrena globosa</i> ), esquejes enraizados ( <i>Cereus forbesii</i> )   |
| 336 | <i>Insignorthezia insignis</i> (Browne)               | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta raíz desnuda, planta enraizada con sustrato olivo ( <i>Olea europaea</i> )   |
| 337 | <i>Leucoptera malifoliella</i> Costa (1836)           | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Pera fresca ( <i>Pyrus communis</i> )   |
| 338 | <i>Lymantria dispar</i> Linnaeus                      | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Madera aserrada roble blanco ( <i>Quercus alba</i> )  |
| 339 | <i>Liposcelis bostrychophila</i> (Badonnel)           | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Grano avena ( <i>Avena sativa</i> ), harina arroz ( <i>Oryza sativa</i> ), salvado avena ( <i>Avena sativa</i> ), grano arroz ( <i>Oryza sativa</i> ), grano cacao ( <i>Theobroma cacao</i> ), avena hojuelas ( <i>Avena sativa</i> ), semolina arroz ( <i>Oryza sativa</i> ), harina de maíz ( <i>Zea mays</i> ), grano maíz ( <i>Zea mays</i> ) |
| 340 | <i>Liposcelis entomophila</i> (Enderlein)             | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Grano arroz ( <i>Oryza sativa</i> ), grano maíz ( <i>Zea mays</i> )   |
| 341 | <i>Liposcelis paeta</i> (Pearman)                     | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Grano arroz ( <i>Oryza sativa</i> )   |
| 342 | <i>Macrosiphum euphorbiae</i> Thomas, 1878.           | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Tomate fresco ( <i>Solanum lycopersicum</i> ), apio fresco ( <i>Apium graveolens</i> )  |
| 343 | <i>Macrosiphum rosae</i> Linnaeus, 1758               | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta raíz desnuda ( <i>Epilobium hybrida</i> ), flores corte ( <i>Rosa</i> sp.)   |
| 344 | <i>Megastes grandalis</i> Guenée                      | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta in vitro ( <i>Ipomoea batatas</i> )  |
| 345 | <i>Megacopta cribraria</i> (Fabricius)                | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Contenedores  |
| 346 | <i>Melanagromyza dolichostigma</i> De Meijere, 1922   | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Vainas soya fresca ( <i>Glycine max</i> )   |

| No. | Nombre Científico  | Grupo   | Situación                             | Artículos reglamentados  |
|-----|--|---------|---------------------------------------|--|
| 347 | <i>Moneilema semipunctatum</i> LeConte                             | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes enraizados ( <i>Echinocereus rigidissimus</i> , <i>Myrtillocactus geometrizans</i> , <i>Astrophytum capricorne</i> , <i>Astrophytum myriostigma</i> )   |
| 348 | <i>Monochamus alternatus</i> Hope, 1843                            | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Laminas de madera pino y alamo   |
| 349 | <i>Monochamus carolinensis</i> Olivier                             | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Madera aserrada pino ( <i>Pinus echinata</i> )   |
| 350 | <i>Monochamus galloprovincialis</i> (Olivier)                      | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Madera aserrada ( <i>Pinus pinaster</i> )  |
| 351 | <i>Naupactus xanthographus</i> (Germar, 1824)                      | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Manzana fresca ( <i>Malus domestica</i> )  |
| 352 | <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch, 1913)                         | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Flores corte ( <i>Aster ericoides</i> )  |
| 353 | <i>Lampides boeticus</i> Linnaeus (1767)                           | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla kudzu ( <i>Pueraria phaseoloides</i> )   |
| 354 | <i>Latheticus oryzae</i> Waterhouse                                | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Grano arroz ( <i>Oryza sativa</i> )  |
| 355 | <i>Lecanoideus floccissimus</i> Martin, Hernandez-Suarez & Carnero | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Mango fresco ( <i>Mangifera indica</i> )   |
| 356 | <i>Lema pectoralis</i> Baly  | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta raíz desnuda ( <i>Dendrobium</i> sp.)   |
| 357 | <i>Lepidosaphes ulmi</i> (Linnaeus, 1758)                          | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Arándanos frescos ( <i>Vaccinium macrocarpon</i> )   |
| 358 | <i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say, 1824                         | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla papa ( <i>Solanum tuberosum</i> ), papa fresca ( <i>Solanum tuberosum</i> )  |
| 359 | <i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann                         | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Arbol abeto ( <i>Pseudotsuga menziesii</i> ), ( <i>Abies fraseri</i> )   |
| 360 | <i>Liriomyza trifolii</i> Burgess in Comstock, 1880                | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Bulbo fresco trenzas ( <i>Allium sativum</i> ), lechuga fresca ( <i>Lactuca sativa</i> ), planta raíz desnuda ( <i>Gerbera jamesonii</i> ), apio fresco ( <i>Apium graveolens</i> ), repollo fresco ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> ), ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> f. <i>rubra</i> ), kale fresco ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>sabellica</i> ), espinaca fresca ( <i>Spinacia oleracea</i> ), planta enraizada con sustrato ( <i>Chrysanthemum indicum</i> ), flores corte ( <i>Dianthus caryophyllus</i> ), ( <i>Chrysanthemum morifolium</i> ), ( <i>Gypsophila paniculata</i> ), ( <i>Gerbera jamesonii</i> ), ( <i>Helianthus annuus</i> ), ( <i>Dianthus plumarius</i> ), ( <i>Chrysanthemum anastasia</i> ), ( <i>Aster</i> sp.), ( <i>Dianthus barbatus</i> ), esquejes enraizados ( <i>Gerbera jamesonii</i> ) |
| 361 | <i>Lobesia botrana</i> Denis & Schiffermüller, 1776                | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Uvas fresca ( <i>Vitis vinifera</i> )  |
| 362 | <i>Lophobaris piperis</i> Marshall                                 | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Grano pimienta ( <i>Piper nigrum</i> )   |
| 363 | <i>Lygus lineolaris</i> Palisot de Beauvois, 1818.                 | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Acelga fresca ( <i>Beta vulgaris</i> var. <i>cicla</i> ), apio fresco ( <i>Apium graveolens</i> ), eneldo fresco ( <i>Anethum graveolens</i> ), pepino fresco ( <i>Cucumis sativus</i> ), coliflor fresco ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> ), repollo fresco ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> )  |
| 364 | <i>Opogona sacchari</i> Bojer                                      | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Plantas banano ( <i>Musa</i> sp.), esquejes ( <i>Saccharum officinarum</i> ), ( <i>Yucca elephantipes</i> ), ( <i>Euphorbia pulcherrima</i> ), ( <i>Sansevieria masoniana</i> ), ( <i>Ficus elastica</i> var. <i>tineke</i> ), ( <i>Ficus elastica</i> var. <i>burgundy</i> ), ( <i>Sansevieria trifasciata</i> ), rizomas ( <i>Heliconias</i> sp.), ( <i>Bambusa vulgaris</i> var. <i>vittata</i> ), ( <i>Bambusa oldhamii</i> ), ( <i>Bambusa lako</i> ), planta raíz desnuda ( <i>Sansevieria laurentii</i> ), ( <i>Sansevieria zeylanica</i> )   |
| 365 | <i>Orygia pseudotsugata</i> (McDunnough, 1921)                     | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Arbol abeto ( <i>Pseudotsuga menziesii</i> )   |
| 366 | <i>Otiorynchus sulcatus</i> (Fabricius, 1775)                      | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta rosas ( <i>Rosas</i> sp.), Esquejes enraizados ( <i>Fuchsia hybrida</i> ) ( <i>Sedum bouvardianum</i> )   |
| 367 | <i>Orthotomicus erosus</i> (Wollaston, 1857)                       | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Madera ( <i>Pinus pinaster</i> )   |
| 368 | <i>Falorus ratzeburgi</i> (Wissmann)                               | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Grano arroz ( <i>Oryza sativa</i> )  |



| No. | Nombre Científico  | Grupo   | Situación                             | Artículos reglamentados   |
|-----|--|---------|---------------------------------------|---|
| 369 | <i>Pandemis heparana</i> Denis & Schiffermüller                | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Manzana fresca ( <i>Malus domestica</i> )   |
| 370 | <i>Pantomorus cervinus</i> (Boheman)                           | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Lima fresca ( <i>Citrus aurantifolia</i> ), fresa fresca ( <i>Fragaria ananassa</i> )   |
| 371 | <i>Parlatoria oleae</i> (Colvée)                               | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Manzana fresca ( <i>Malus domestica</i> ), planta raiz desnuda, planta enraizada con sustrato ( <i>Olea europaea</i> )  |
| 372 | <i>Parlatoria ziziphi</i> (Lucas, 1853)                        | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Toronja fresca ( <i>Citrus x paradisi</i> ), planta naranja ( <i>Citrus sinensis</i> )  |
| 373 | <i>Paracoccus marginatus</i> Willians Granara de Willink, 1992 | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Aguacate fresco ( <i>Persea americana</i> ), papaya fresca ( <i>Carica papaya</i> ), plántulas tomate ( <i>Solanum lycopersicum</i> ), flor fresca ( <i>Hibiscus sabdariffa</i> ), planta enraizada con sustrato ( <i>Psidium guajava</i> ) |
| 374 | <i>Parabemisia myricae</i> (Kuwana, 1927)                      | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Varetas aguacate ( <i>Persea americana</i> )  |
| 375 | <i>Parthenolecanium persicae</i> (Fabricius)                   | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes uvas ( <i>Vitis vinifera</i> )   |
| 376 | <i>Planococcus lilacinus</i> Cock                              | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Toronja fresca ( <i>Citrus x paradisi</i> ), semillas, plántulas in vitro de café ( <i>Coffea arabica</i> ), Anona fresca ( <i>Annona squamosa</i> ), grano ( <i>Coffea arabica</i> ), semilla café ( <i>Coffea arabica</i> )               |
| 377 | <i>Platynota stultana</i> Walsingham                           | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Pimiento fresco ( <i>Capsicum annum</i> ), limón persa fresco ( <i>Citrus latifolia</i> ), apio fresco ( <i>Apium graveolens</i> ), tomate fresco ( <i>Solanum lycopersicum</i> )   |
| 378 | <i>Pectinophora gossypiella</i> Saunders, 1843                 | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Algodón ( <i>Gossypium hirsutum</i> )   |
| 379 | <i>Pezothrips kellyanus</i> Bagnall                            | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Clementina fresco ( <i>Citrus x clementina</i> )  |
| 380 | <i>Piezodorus guildinii</i> (Westwood, 1837)                   | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla chiltoma ( <i>Capsicum annum</i> )  |
| 381 | <i>Finaspis strachani</i> (Cooley) 1899                        | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Varetas naranja ( <i>Citrus sinensis</i> ), ( <i>Citrus reticulata</i> ), ( <i>Citrus paradisi</i> ), ( <i>Citrus limon</i> ), ( <i>Mangifera indica</i> ), semilla nuez coco ( <i>Cocos nucifera</i> )                                     |
| 382 | <i>Pissodes castaneus</i> (DeGeer, 1775)                       | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Madera aserrada ( <i>Pinus pinaster</i> )   |
| 383 | <i>Pissodes nemorensis</i> Germar, 1824                        | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Madera aserrada ( <i>Pinus echinata</i> )   |
| 384 | <i>Popillia japonica</i> Newman                                | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta rosas ( <i>Rosas</i> sp.)  |
| 385 | <i>Phenacoccus manihoti</i> Matile Ferrero, 1977               | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Estacas yuca ( <i>Manihot esculenta</i> )   |
| 386 | <i>Phenacoccus madeirensis</i> Green, 1923                     | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta raiz desnuda ( <i>Lantana camara</i> )   |
| 387 | <i>Phthorimaea absoluta</i> Meyrick, 1917                      | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Tomate fresco ( <i>Solanum lycopersicum</i> ), pimiento fresco ( <i>Capsicum annum</i> )  |
| 388 | <i>Planococcus ficus</i> Signoret                              | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Uvas fresca ( <i>Vitis vinifera</i> )   |
| 389 | <i>Pseudaulacaspis cockerelli</i> (Cooley)                     | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Varetas mango ( <i>Mangifera indica</i> )   |
| 390 | <i>Pseudococcus comstocki</i> (Kuwana)                         | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes ( <i>Punica granatum</i> )   |
| 391 | <i>Pseudococcus viburni</i> Signoret                           | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Clementina fresco ( <i>Citrus clementina</i> ), limón persa fresco ( <i>Citrus latifolia</i> ), Planta enraizada con sustrato ( <i>Phalaenopsis</i> sp.)  |
| 392 | <i>Pseudacysta perseae</i> (Heidemann, 1908)                   | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Varetas aguacate ( <i>Persea americana</i> )  |
| 393 | <i>Premnotrypes latithorax</i> (Fierce)                        | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla papa ( <i>Solanum tuberosum</i> )   |
| 394 | <i>Premnotrypes vorax</i> (Hustache)                           | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla papa ( <i>Solanum tuberosum</i> )   |

| No. | Nombre Científico                                  | Grupo   | Situación                             | Artículos reglamentados  |
|-----|--|---------|---------------------------------------|--|
| 395 | <i>Proeulia chrysopteris</i> (Butler, 1883)        | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Albaricoque fresco ( <i>Prunus americana</i> )   |
| 396 | <i>Phoracantha recurva</i> Newman, 1840            | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes ( <i>Eucaliptus</i> sp.)  |
| 397 | <i>Phoracantha semipunctata</i> (Fabricius) 1775   | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes ( <i>Eucaliptus</i> sp.)  |
| 398 | <i>Fissodes castaneus</i> (DeGeer, 1775)           | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Madera con corteza ( <i>Pinus</i> sp.)   |
| 399 | <i>Pulvinaria psidii</i> Maskell, 1893             | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes ( <i>Manilkara zapota</i> ), ( <i>Mangifera indica</i> ), ( <i>Achras zapota</i> ), ( <i>Psidium guajava</i> ), planta enraizada con sustrato ( <i>Mangifera indica</i> ), planta enraizada sustrato ( <i>Psidium guajava</i> )   |
| 400 | <i>Pseudococcus calceolariae</i> (Maskell)         | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Manzana fresca ( <i>Malus domestica</i> ), nectarina fresca ( <i>Prunus persica</i> var. <i>Nucipersica</i> ), naranja fresca ( <i>Citrus sinensis</i> ), coliflor fresca ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> ), repollo fresco ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> )  |
| 401 | <i>Pseudotheraptus wayi</i> Brown                  | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Nuez macadamia ( <i>Macadamia integrifolia</i> )   |
| 402 | <i>Retithrips syriacus</i> (Mayet)                 | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla tempate ( <i>Jatropha curcas</i> )   |
| 403 | <i>Rhagoletis cingulata</i> (Loew)                 | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Cereza fresca ( <i>Prunus avium</i> )  |
| 404 | <i>Rhagoletis pomonella</i> Walsh                  | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Manzana fresca ( <i>Malus domestica</i> )  |
| 405 | <i>Saccharipulvinaria iceryi</i> (Signoret)        | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes ( <i>Saccharum officinarum</i> )  |
| 406 | <i>Sesamia inferens</i> (Walker)                   | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla pasto ( <i>Megathyrus maximus</i> )  |
| 407 | <i>Selenothrips rubrocinctus</i> (Giard)           | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Aguate fresco ( <i>Persea americana</i> )  |
| 408 | <i>Stenchaetothrips bififormis</i> (Bagnall, 1913) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Estolones maralfalfa ( <i>Pennisetum violaceum</i> )   |
| 409 | <i>Sternochetus mangiferae</i> (Fabricius, 1775)   | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Mango fresco ( <i>Mangifera indica</i> )   |
| 410 | <i>Sitobion avenae</i> (Fabricius, 1775)           | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Grano cebada ( <i>Hordeum vulgare</i> )  |
| 411 | <i>Sirex noctilio</i> Fabricius, 1793              | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Madera aserrada ( <i>Pinus radiata</i> ), ( <i>Pinus echinata</i> )  |
| 412 | <i>Scirtothrips aurantii</i> Faure                 | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta enraizada con compost de corteza de pino y perlita macadamia ( <i>Macadamia integrifolia</i> )  |
| 413 | <i>Scirtothrips perseae</i> Nakahara, 1997         | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Aguate fresco, varetas, planta enraizada con sustrato ( <i>Persea americana</i> )  |
| 414 | <i>Sophonia orientalis</i> (Matsumura)             | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta enraizada con sustrato ( <i>Mangifera indica</i> )  |
| 415 | <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius)               | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla tempate ( <i>Jatropha curcas</i> )   |
| 416 | <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisduval)           | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla tempate ( <i>Jatropha curcas</i> )   |
| 417 | <i>Stegobium paniceum</i> (Linnaeus)               | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Garbanzo fresco ( <i>Cicer arietinum</i> ), grano maiz para palomitas ( <i>Zea mays</i> ), grano cebada ( <i>Hordeum vulgare</i> ), grano trigo ( <i>Triticum aestivum</i> ), grano arroz ( <i>Oryza sativa</i> ), grano maiz amarillo ( <i>Zea mays</i> ), grano mani ( <i>Arachis hypogaea</i> ), grano cacao ( <i>Theobroma cacao</i> ), semolina arroz ( <i>Oryza sativa</i> ), malta cebada grano ( <i>Hordeum vulgare</i> ), grano avena ( <i>Avena sativa</i> ), avena hojuelas ( <i>Avena sativa</i> ), cebada hojuelas ( <i>Hordeum vulgare</i> ), harina maiz ( <i>Zea mays</i> ), harina mani ( <i>Arachis hypogaea</i> ) |
| 418 | <i>Steirastoma breve</i> (Sulzer, 1776)            | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Plántulas cacao ( <i>Theobroma cacao</i> )   |

| No. | Nombre Científico                               | Grupo   | Situación                             | Artículos reglamentados  |
|-----|---|---------|---------------------------------------|--|
| 419 | <i>Thaumatotibia leucotreta</i> Meyrick         | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Nuez sin cascara ( <i>Macadamia integrifolia</i> )   |
| 420 | <i>Tetraleurodes perseae</i> Nakahara           | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Varetas aguacate ( <i>Persea americana</i> )   |
| 421 | <i>Trypodendron domesticum</i> (Linnaeus, 1758) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Madera aserrada roble blanco ( <i>Quercus alba</i> )   |
| 422 | <i>Tomicus piniperda</i> (Linnaeus, 1758)       | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Madera ( <i>Pinus</i> sp.)   |
| 423 | <i>Tomicus minor</i> (Hartig, 1834)             | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Madera aserrada ( <i>Pinus pinaster</i> )  |
| 424 | <i>Aphis odinae</i> (van der Goot, 1917)        | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta enraizada con sustrato ( <i>Mangifera indica</i> )  |
| 425 | <i>Therioaphis trifolii</i> (Monell, 1882)      | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta lotus enraizada ( <i>Lotus maculatus</i> )  |
| 426 | <i>Thrips simplex</i> (Morison, 1930)           | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Bulbos gladiolos ( <i>Gladiolus</i> sp.)   |
| 427 | <i>Trogoderma granarium</i> Everts              | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Grano cebada ( <i>Hordeum vulgare</i> ), grano arroz ( <i>Oryza sativa</i> ), grano comino ( <i>Cuminum cyminum</i> ), canela fresca ( <i>Cinnamomum verum</i> ), albahaca fresca ( <i>Ocimum basilicum</i> ), mango fresco ( <i>Mangifera indica</i> ), soya cereal ( <i>Glycine max</i> ), maíz cereal ( <i>Zea mays</i> ), salvado trigo ( <i>Triticum aestivum</i> ), nuez moscada seco ( <i>Myristica fragrans</i> ), grano pimienta ( <i>Piper nigrum</i> ), flor de jamaica ( <i>Hibiscus sabdariffa</i> ), grano café ( <i>Coffea arabica</i> ), fenogreco seco ( <i>Trigonella foenum-graecum</i> ), dátiles fresco ( <i>Phoenix dactylifera</i> ), orégano seco ( <i>Origanum vulgare</i> ), mejorana ( <i>Origanum majorana</i> ), romero seco ( <i>Rosmarinus officinalis</i> ), grano anís ( <i>Pimpinella anisum</i> ), hojas sen ( <i>Cassia acutifolia</i> ), mani con cascara y sin cascara ( <i>Arachis hypogaea</i> ), cereal soya y maíz azucarado, hoja seca laurel ( <i>Laurus nobilis</i> ), semilla soya ( <i>Glycine max</i> ), fibra algodón ( <i>Gossypium</i> spp.), semolina trigo ( <i>Triticum aestivum</i> ), semilla haba ( <i>Vicia faba</i> ), hojas oregano ( <i>Origanum vulgare</i> ), semilla cebollino ( <i>Allium schoenoprasum</i> ), grano linaza ( <i>Linum usitatissimum</i> ), tela yute ( <i>Corchorus capsularis</i> ), tabaco rama ( <i>Nicotiana tabacum</i> ), almidón maíz ( <i>Zea mays</i> ), malta cebada grano ( <i>Hordeum vulgare</i> ), semilla crotolaria ( <i>Crotalaria juncea</i> ), semilla sandía ( <i>Citrullus lanatus</i> ), grano seco chile, pimienta ( <i>Capsicum annuum</i> ) |
| 428 | <i>Trogoderma variabile</i> Ballion             | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Grano cebada ( <i>Hordeum vulgare</i> ), grano arroz oro ( <i>Oryza sativa</i> ), grano maíz dulce para palomitas ( <i>Zea mays</i> ), garbanzo fresco ( <i>Cicer arietinum</i> ), grano trigo ( <i>Triticum aestivum</i> ), grano frijol ( <i>Phaseolus vulgaris</i> ), grano soya ( <i>Glycine max</i> ), grano café ( <i>Coffea arabica</i> ), dátiles fresco, secos ( <i>Phoenix dactylifera</i> ), grano cacao ( <i>Theobroma cacao</i> ), grano maíz quebrado, molido ( <i>Zea mays</i> ), ajo molido ( <i>Allium sativum</i> ), grano cilantro ( <i>Coriandrum sativum</i> ), grano alpiste ( <i>Phalaris canariensis</i> ), grano girasol ( <i>Helianthus annuus</i> ), grano mijo ( <i>Panicum miliaceum</i> ), grano chia ( <i>Salvia hispanica</i> ), semolina arroz ( <i>Oryza sativa</i> ), avena hojuelas ( <i>Avena sativa</i> ), grano avena ( <i>Avena sativa</i> ), harina maíz ( <i>Zea mays</i> ), cereal soya y maíz.   |
| 429 | <i>Unaspis yanonensis</i> (Kuwana, 1923)        | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta con sustrato ( <i>Citrus sinensis</i> )   |
| 430 | <i>Xyleborus dispar</i> (Fabricius, 1792)       | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes ( <i>Vitis vinifera</i> )   |
| 431 | <i>Xyleborus similis</i> Ferrari                | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes ( <i>Tectona grandis</i> )  |
| 432 | <i>Xylosandrus compactus</i> (Eichhoff, 1875)   | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes ( <i>Coffea canefora</i> ), canela en rama ( <i>Cinnamomum verum</i> ), planta in vitro ( <i>Coffea arabica</i> ), madera ( <i>Aucoumea klaineana</i> ), ( <i>Entandrophragma cylindricum</i> ), planta enraizada con sustrato ( <i>Mangifera indica</i> )  |
| 433 | <i>Xylosandrus germanus</i> (Blandford)         | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Madera ( <i>Fagus sylvatica</i> )  |
| 434 | <i>Xylosandrus crassiusculus</i> (Motschulsky)  | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Madera ( <i>Aucoumea klaineana</i> ), planta enraizada ( <i>Coffea arabica</i> ), planta enraizada con sustrato ( <i>Mangifera indica</i> ), ( <i>Tectona grandis</i> )  |
| 435 | <i>Xylosandrus discolor</i> (Blandford, 1898)   | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta enraizada con sustrato ( <i>Mangifera indica</i> )  |
| 436 | <i>Xylosandrus mutilatus</i> Blandford, 1894    | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Plywood ( <i>Acer saccharum</i> )  |
| 437 | <i>Xylotrechus quadripes</i> Chevrolat, 1863    | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta café ( <i>Coffea arabica</i> )  |

| No. | Nombre Científico   | Grupo    | Situación                             | Artículos reglamentados   |
|-----|---|----------|---------------------------------------|---|
| 438 | <i>Zaprionus indianus</i> Gupta   | Insecta  | Ausente: no hay registros de la plaga | Higo fresco ( <i>Ficus carica</i> )   |
| 439 | <i>Zeugodacus cucurbitae</i> Coquillett                                   | Insecta  | Ausente: no hay registros de la plaga | Melón fresco ( <i>Cucumis melo</i> ), sandía fresca ( <i>Citrullus lanatus</i> )  |
| 440 | <i>Cornu aspersum</i> Müller  | Mollusca | Ausente: no hay registros de la plaga | Repollo fresco ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> ), remolacha fresca ( <i>Beta vulgaris</i> ), lechuga fresca ( <i>Lactuca sativa</i> ), coliflor fresco ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> ), tomate fresco ( <i>Solanum lycopersicum</i> ), flores corte ( <i>Delphinium alpinum</i> ), ( <i>Lathyrus odoratus</i> ), fresa fresca ( <i>Fragaria ananassa</i> )  |
| 441 | <i>Lissachatina fulica</i> Bowdich 1822                                   | Mollusca | Ausente: no hay registros de la plaga | Maiz, musáceas, papayas, cítricos, soya, lechuga, remolacha, ornamentales y forestales  |
| 442 | <i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema - Bos, 1891) Christie, 1932      | Nematoda | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes ( <i>Begonia boliviensis</i> ), planta raíz desnuda ( <i>Fragaria ananassa</i> )   |
| 443 | <i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner & Buhner, 1932 | Nematoda | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes ( <i>Mimulus hybrida</i> ), ( <i>Verbena peruviana</i> ), ( <i>Salvia guaranitica</i> ), planta raíz desnuda ( <i>Fragaria ananassa</i> )  |
| 444 | <i>Belonolaimus longicaudatus</i> Rau, 1958                               | Nematoda | Ausente: no hay registros de la plaga | Estolón pasto elefante ( <i>Pennisetum purpureum</i> ), estolón bermuda ( <i>Cynodon dactylon</i> )   |
| 445 | <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Buhner, 1934) Nickle, 1970   | Nematoda | Ausente: no hay registros de la plaga | Madera ( <i>Pinus</i> sp.)  |
| 446 | <i>Cactodera cacti</i> Filipjev & Schuurmans Stekhoven, 1941              | Nematoda | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes ( <i>Saccharum officinarum</i> )   |
| 447 | <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn, 1857) Filip'ev, 1936                    | Nematoda | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla maíz ( <i>Zea mays</i> ), semilla cebolla ( <i>Allium cepa</i> ), bulbos begonia ( <i>Begonia</i> sp.), semilla papa ( <i>Solanum tuberosum</i> ), semilla ajo ( <i>Allium sativum</i> ), ajo fresco ( <i>Allium sativum</i> ), semilla apio ( <i>Apium graveolens</i> ), semilla remolacha ( <i>Beta vulgaris</i> ), cebolla fresca ( <i>Allium cepa</i> ), cebollino fresco ( <i>Allium schoenoprasum</i> ), puerro fresco ( <i>Allium porrum</i> ), semilla puerro ( <i>Allium porrum</i> ), papa fresca ( <i>Solanum tuberosum</i> ), planta begonia ( <i>Begonia hybrida</i> ), semilla haba ( <i>Vicia faba</i> ), semilla alfalfa ( <i>Medicago sativa</i> ), planta enraizada ( <i>Phlox drummondii</i> ), planta raíz desnuda ( <i>Fragaria ananassa</i> ), semilla arveja ( <i>Pisum sativum</i> ), flores corte ( <i>Tulipa hybrid</i> ) |
| 448 | <i>Ditylenchus destructor</i> Thorne, 1945                                | Nematoda | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta in vitro ( <i>Ipomoea batatas</i> ), semilla papa ( <i>Solanum tuberosum</i> ), cebolla fresca ( <i>Allium cepa</i> ), ajo fresco ( <i>Allium sativum</i> ), papa fresca ( <i>Solanum tuberosum</i> ), planta té ( <i>Camellia sinensis</i> ), planta camelina ( <i>Camelia hybrida</i> )  |
| 449 | <i>Globodera pallida</i> Stone 1973                                       | Nematoda | Ausente: no hay registros de la plaga | Papa fresca ( <i>Solanum tuberosum</i> ), semilla papa ( <i>Solanum tuberosum</i> )   |
| 450 | <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber, 1923) Skarbilovich, 1959     | Nematoda | Ausente: no hay registros de la plaga | Papa fresca ( <i>Solanum tuberosum</i> ), semilla papa ( <i>Solanum tuberosum</i> )   |
| 451 | <i>Helicotylenchus pseudorobustus</i> (Steiner, 1914) Golden, 1956        | Nematoda | Ausente: no hay registros de la plaga | Zanahoria fresca ( <i>Daucus carota</i> )   |
| 452 | <i>Hemicriconemoides mangiferae</i> Siddiqi, 1961                         | Nematoda | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta mango ( <i>Mangifera indica</i> )  |
| 453 | <i>Heterodera cajani</i> Koshy, 1967                                      | Nematoda | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla ajonjolí ( <i>Sesamum indicum</i> )   |
| 454 | <i>Heterodera glycines</i> Ichinohe, 1952                                 | Nematoda | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla remolacha ( <i>Beta vulgaris</i> ), semilla soya ( <i>Glycine max</i> )   |
| 455 | <i>Heterodera schachtii</i> A. Schmidt, 1871                              | Nematoda | Ausente: no hay registros de la plaga | Flores corte ( <i>Gypsophila elegans</i> ), semilla remolacha ( <i>Beta vulgaris</i> ), planta in vitro ( <i>Portulaca oleracea</i> )   |
| 456 | <i>Heterodera trifolii</i> Goffart, 1932                                  | Nematoda | Ausente: no hay registros de la plaga | Flores corte ( <i>Dianthus caryophyllus</i> )   |
| 457 | <i>Hirschmanniella miticausa</i> Bridge, Mortimer & Jackson, 1983         | Nematoda | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta malanga ( <i>Colocasia esculenta</i> )   |
| 458 | <i>Hoplolaimus seinhorsti</i> Luc, 1958                                   | Nematoda | Ausente: no hay registros de la plaga | Plántulas tomate ( <i>Solanum lycopersicum</i> )  |
| 459 | <i>Meloidogyne coffeicola</i> Lourdello & Zamith, 1960                    | Nematoda | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes ( <i>Coffea canefora</i> )   |
| 460 | <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden, O'Bannon, Santo & Finley, 1980       | Nematoda | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla papa ( <i>Solanum tuberosum</i> )   |

| No. | Nombre Científico  | Grupo       | Situación                             | Artículos reglamentados   |
|-----|--|-------------|---------------------------------------|---|
| 461 | <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback, 1983                            | Nematoda    | Ausente: no hay registros de la plaga | Plantar raíz desnuda café ( <i>Coffea arabica</i> ), planta con sustrato angelonia ( <i>Angelonia angustifolia</i> ), planta enraizada camote ( <i>Ipomoea batatas</i> ), planta enraizada con sustrato café ( <i>Coffea arabica</i> )  |
| 462 | <i>Meloidogyne lopezi</i>  | Nematoda    | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta café raíz desnuda ( <i>Coffea arabica</i> )  |
| 463 | <i>Meloidogyne mayaguensis</i> Rammah & Hirschmann, 1988                         | Nematoda    | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta raíz desnuda ( <i>Psidium guajava</i> ), ( <i>Coffea arabica</i> ), planta in vitro ( <i>Coffea arabica</i> ), ( <i>Angelonia angustifolia</i> )   |
| 464 | <i>Meloidogyne paranaensis</i> Carneiro et al.                                   | Nematoda    | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta raíz desnuda ( <i>Coffea arabica</i> )   |
| 465 | <i>Nacobbus aberrans</i> (Thorne, 1935) Thorne & Allen, 1944                     | Nematoda    | Ausente: no hay registros de la plaga | Remolacha fresca ( <i>Beta vulgaris</i> ), papa fresca ( <i>Solanum tuberosum</i> )   |
| 466 | <i>Paratrichodorus porosus</i> (Allen, 1957) Siddiqi, 1974                       | Nematoda    | Ausente: no hay registros de la plaga | Plantas banano, platano ( <i>Musa</i> sp.), planta raíz desnuda, planta enraizada con sustrato olivo ( <i>Olea europaea</i> )   |
| 467 | <i>Pratylenchus penetrans</i> (Cobb, 1917) Filipjev & Schuurmans Stekhoven, 1941 | Nematoda    | Ausente: no hay registros de la plaga | Camote fresco ( <i>Ipomoea batatas</i> ), cebolla fresca ( <i>Allium cepa</i> ), cebollino fresco ( <i>Allium schoenoprasum</i> ), puerro fresco ( <i>Allium porrum</i> ), remolacha fresca ( <i>Beta vulgaris</i> ), zanahoria fresca ( <i>Daucus carota</i> ), esqueje ( <i>Saccharum officinarum</i> ), planta con sustrato naranja ( <i>Citrus sinensis</i> ), planta enraizada cámara ( <i>Lantana camara</i> ), planta enraizada con sustrato ( <i>Mangifera indica</i> ), planta enraizada con sustrato ( <i>Rosasp.</i> ) |
| 468 | <i>Pratylenchus zeae</i> Graham, 1951  | Nematoda    | Ausente: no hay registros de la plaga | Esqueje ( <i>Saccharum officinarum</i> ), planta raíz desnuda ( <i>Psidium guajava</i> ), planta enraizada con sustrato ( <i>Psidium guajava</i> )  |
| 469 | <i>Pratylenchus loosi</i> Loof, 1960   | Nematoda    | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta enraizada con sustrato ( <i>Mangifera indica</i> )   |
| 470 | <i>Scutellonema bradys</i> (Steiner & Le Hew, 1933) Andrassy, 1958               | Nematoda    | Ausente: no hay registros de la plaga | Jicama fresco ( <i>Pachyrhizus erosus</i> ), plántulas tomate ( <i>Solanum lycopersicum</i> ),  |
| 471 | <i>Tylenchorhynchus claytoni</i> Steiner, 1937                                   | Nematoda    | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta enraizada con sustrato olivo ( <i>Olea europaea</i> )  |
| 472 | <i>Xiphinema index</i> Thorne & Allen, 1950                                      | Nematoda    | Ausente: no hay registros de la plaga | Esqueje uva ( <i>Vitis vinifera</i> )   |
| 473 | <i>Xiphinema rivesi</i> Dalmaso, 1969  | Nematoda    | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta raíz desnuda ( <i>Rosa floribunda</i> ), ( <i>Rosa hybrid tea</i> )  |
| 474 | Avocado sunblotch viroid   | Viroide     | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla, varetas, planta enraizada, yemas aguacate ( <i>Persea americana</i> )  |
| 475 | Citrus blight disease  | Desconocido | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta toronja ( <i>Citrus x paradisi</i> )   |
| 476 | Potato purple-top wilt agent   | Desconocido | Ausente: no hay registros de la plaga | Papa fresca ( <i>Solanum tuberosum</i> )  |
| 477 | Citrus exocortis viroid  | Viroide     | Ausente: no hay registros de la plaga | Naranja fresca ( <i>Citrus sinensis</i> ), mandarina fresca ( <i>Citrus reticulata</i> ), esquejes sin raíz ( <i>Citrus sinensis</i> )  |
| 478 | Potato spindle tuber viroid  | Viroide     | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla tomate ( <i>Solanum lycopersicum</i> ), semilla papa ( <i>Solanum tuberosum</i> ), semilla, varetas aguacate ( <i>Persea americana</i> ), planta in vitro ( <i>Calibrachoa hybrida</i> )  |
| 479 | Alfalfa mosaic virus   | Virus       | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla tomate ( <i>Solanum lycopersicum</i> ), semilla berenjena ( <i>Solanum melongena</i> ), plantas pimiento ( <i>Capsicum annuum</i> ), semilla soya ( <i>Glycine max</i> ), semilla pimiento ( <i>Capsicum annuum</i> ), semilla frijol ( <i>Phaseolus vulgaris</i> ), semilla apio ( <i>Apium graveolens</i> ), semilla tomate ( <i>Solanum lycopersicum</i> ), semilla alfalfa ( <i>Medicago sativa</i> ), semilla tomate de árbol ( <i>Cyphomandra betacea</i> ), planta in vitro ( <i>Vinca maculata</i> )              |
| 480 | <i>Angelonia flower break virus</i>  | Virus       | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta in vitro ( <i>Angelonia angustifolia</i> ), ( <i>Impatiens walleriana</i> ), ( <i>Verbena peruviana</i> )  |
| 481 | Andean potato latent virus   | Virus       | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla papa ( <i>Solanum tuberosum</i> )   |
| 482 | <i>Arabis mosaic virus</i>   | Virus       | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla zucchini ( <i>Cucurbita pepo</i> ), semilla zanahoria ( <i>Daucus carota</i> )  |
| 483 | Banana bunchy top virus  | Virus       | Ausente: no hay registros de la plaga | Plantas banano y platano ( <i>Musa</i> sp.)   |
| 484 | Bean common mosaic necrosis virus  | Virus       | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla frijol ( <i>Phaseolus vulgaris</i> ), semilla crotolaria ( <i>Crotalaria juncea</i> )   |

| No. | Nombre Científico                                 | Grupo | Situación                             | Artículos reglamentados   |
|-----|---|-------|---------------------------------------|---|
| 485 | <i>Bean yellow mosaic virus</i>                   | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla maní ( <i>Arachis hypogaea</i> ), semilla haba ( <i>Vicia faba</i> ), semilla arveja ( <i>Pisum sativum</i> )   |
| 486 | <i>Bell pepper mottle virus</i>                   | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta calibrachoa ( <i>Calibrachoa hybrida</i> )   |
| 487 | <i>Blackeye cowpea mosaic virus</i>               | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla crotolaria ( <i>Crotalaria juncea</i> )   |
| 488 | <i>Broad bean wilt virus</i>                      | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla zanahoria ( <i>Daucus carota</i> ), semilla pimienta ( <i>Capsicum annuum</i> )   |
| 489 | <i>Dasheen mosaic virus</i>                       | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta in vitro ( <i>Colocasia esculenta</i> )  |
| 490 | <i>Cactus virus X</i>                             | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Esqueje ( <i>Hylocereus undatus</i> ), esquejes enraizados ( <i>Cereus forbesii</i> )   |
| 491 | <i>Cassava common mosaic virus</i>                | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Varetas yuca ( <i>Manihot esculenta</i> )   |
| 492 | <i>Chrysanthemum stunt viroid</i>                 | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta in vitro, esqueje ( <i>Argyranthemum frutescens</i> )  |
| 493 | <i>Cymbidium mosaic virus</i>                     | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Orquídeas raíz desnuda ( <i>Dendrobium</i> sp.), ( <i>Phalaenopsis</i> sp.), phalaenopsis enraizada ( <i>Phalaenopsis amabilis</i> ), ( <i>Phalaenopsis hybrids</i> ), planta enraizada con sustrato ( <i>Phalaenopsis</i> sp.), planta in vitro, esquejes sin raíz ( <i>Vanilla planifolia</i> ) |
| 494 | <i>Citrus psorosis B</i>                          | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Esqueje sin raíz ( <i>Citrus sinensis</i> )   |
| 495 | <i>Clover yellow vein virus</i>                   | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta in vitro ( <i>Impatiens walleriana</i> ), ( <i>Verbena peruviana</i> ), flores corte ( <i>Lathyrus odoratus</i> )  |
| 496 | <i>Coffee ringspot virus</i>                      | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta raíz desnuda ( <i>Coffea arabica</i> )   |
| 497 | <i>Cowpea mild mottle virus</i>                   | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla maní ( <i>Arachis hypogaea</i> ), semilla soya ( <i>Glycine max</i> )   |
| 498 | <i>Cucumber mosaic virus</i>                      | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla melón ( <i>Cucumis melo</i> ), semilla sandía ( <i>Citrullus lanatus</i> ), semilla pimienta ( <i>Capsicum annuum</i> ), semilla algodón ( <i>Gossypium hirsutum</i> ), semilla berenjena ( <i>Solanum melongena</i> ), semilla caupi ( <i>Vigna unguiculata</i> )                        |
| 499 | <i>Cucumber green mottle mosaic virus</i>         | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla sandía ( <i>Citrullus lanatus</i> ), semilla melón ( <i>Cucumis melo</i> ), semilla zuchini ( <i>Cucurbita pepo</i> ), semilla pepino ( <i>Cucumis sativus</i> ), semilla ayote, zapallo, calabaza ( <i>Cucurbita moschata</i> ), ( <i>Cucurbita maxima</i> )                             |
| 500 | <i>Grapevine fanleaf virus</i>                    | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Esqueje sin raíz uvas ( <i>Vitis vinifera</i> )   |
| 501 | <i>Grapevine leafroll-associated viruses</i>      | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Esqueje ( <i>Vitis vinifera</i> )   |
| 502 | <i>Grapevine virus A</i>                          | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes ( <i>Vitis vinifera</i> )  |
| 503 | <i>Hop stunt viroid Sasaki and Shikata, 1977a</i> | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta con sustrato ( <i>Citrus sinensis</i> )  |
| 504 | <i>Iris yellow spot virus Cortés et al. 1998</i>  | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta in vitro ( <i>Petunia hybrida</i> )  |
| 505 | <i>Maize dwarf mosaic virus</i>                   | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla maíz ( <i>Zea mays</i> )  |
| 506 | <i>Maize chlorotic mottle virus</i>               | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla maíz ( <i>Zea mays</i> )  |
| 507 | <i>Melon necrotic spot virus</i>                  | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla melón ( <i>Cucumis melo</i> )   |
| 508 | <i>Lettuce mosaic virus</i>                       | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla lechuga ( <i>Lactuca sativa</i> )   |
| 509 | <i>Lily symptomless virus</i>                     | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Bulbos gladiolos ( <i>Gladiolus</i> sp.)  |

| No. | Nombre Científico                                     | Grupo | Situación                             | Artículos reglamentados   |
|-----|---|-------|---------------------------------------|---|
| 510 | <i>Onion yellow dwarf virus</i>                       | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Cebolla fresca ( <i>Allium cepa</i> )   |
| 511 | <i>Odontoglossum ringspot virus</i>                   | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta in vitro, esquejes sin raíz ( <i>Vanilla planifolia</i> )  |
| 512 | <i>Papaya ringspot virus</i>                          | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla papaya ( <i>Carica papaya</i> )   |
| 513 | <i>Peach rosette mosaic virus</i>                     | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Esqueje ( <i>Vitis vinifera</i> )   |
| 514 | <i>Peanut mottle virus</i>                            | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla mani ( <i>Arachis hypogaea</i> ), semilla ajonjolí ( <i>Sesamum indicum</i> )   |
| 515 | <i>Peanut stripe virus</i>                            | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla mani ( <i>Arachis hypogaea</i> )  |
| 516 | <i>Pepper mild mottle virus</i>                       | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla pimiento ( <i>Capsicum annuum</i> ), planta pimiento ( <i>Capsicum annuum</i> ), semilla tomate ( <i>Solanum lycopersicum</i> )   |
| 517 | <i>Potato black ringspot virus</i>                    | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla papa ( <i>Solanum tuberosum</i> )   |
| 518 | <i>Potato mop-top virus</i>                           | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla papa ( <i>Solanum tuberosum</i> ), planta in vitro ( <i>Solanum tuberosum</i> )   |
| 519 | <i>Potato virus M</i>                                 | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla papa ( <i>Solanum tuberosum</i> )   |
| 520 | <i>Potato leafroll virus</i>                          | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla papa ( <i>Solanum tuberosum</i> ), papa fresca ( <i>Solanum tuberosum</i> )   |
| 521 | <i>Potato virus S</i>                                 | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla papa ( <i>Solanum tuberosum</i> ), papa fresca ( <i>Solanum tuberosum</i> )   |
| 522 | <i>Potato yellow dwarf virus</i>                      | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla papa ( <i>Solanum tuberosum</i> )   |
| 523 | <i>Prune dwarf virus</i>                              | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla almendra ( <i>Prunus dulcis</i> ), ( <i>Prunus amygdalus</i> )  |
| 524 | <i>Prunus necrotic ringspot virus</i>                 | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla pepino ( <i>Cucumis sativus</i> ), semilla almendra ( <i>Prunus dulcis</i> ), ( <i>Prunus amygdalus</i> )   |
| 525 | <i>Rice black streaked dwarf virus</i>                | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla maíz ( <i>Zea mays</i> )  |
| 526 | <i>Soybean mosaic virus</i> Gardner & Kendrick (1921) | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla soya ( <i>Glycine max</i> )   |
| 527 | <i>Squash mosaic virus</i>                            | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla sandía ( <i>Citrullus lanatus</i> ), semilla melón ( <i>Cucumis melo</i> ), semilla ayote ( <i>Cucurbita maxima</i> ), semilla pepino ( <i>Cucumis sativus</i> ), semilla zapallo, calabaza ( <i>Cucurbita moschata</i> ) |
| 528 | <i>Strawberry crinkle virus</i>                       | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta raíz desnuda fresa ( <i>Fragaria ananassa</i> )  |
| 529 | <i>Strawberry latent ringspot virus</i>               | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta raíz desnuda fresa ( <i>Fragaria ananassa</i> )  |
| 530 | <i>Strawberry mild yellow edge virus</i>              | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta raíz desnuda fresa ( <i>Fragaria ananassa</i> )  |
| 531 | <i>Strawberry mottle virus</i>                        | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta raíz desnuda fresa ( <i>Fragaria ananassa</i> )  |
| 532 | <i>Strawberry vein banding virus</i>                  | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta raíz desnuda fresa ( <i>Fragaria ananassa</i> )  |
| 533 | <i>Sweet potato chlorotic stunt virus</i>             | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Esqueje sin raíz camote ( <i>Ipomoea batatas</i> )  |
| 534 | <i>Sweet potato feathery mottle virus</i>             | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta pimiento ( <i>Capsicum annuum</i> ), planta enraizada ( <i>Ipomoea batatas</i> ), planta in vitro ( <i>Ipomoea batatas</i> )   |
| 535 | <i>Taro bacilliform virus</i>                         | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta in vitro ( <i>Colocasia esculenta</i> )  |

| No. | Nombre Científico   | Grupo  | Situación                             | Artículos reglamentados  |
|-----|---|--------|---------------------------------------|--|
| 536 | <i>Tobacco mild green mosaic virus</i>                    | Virus  | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta in vitro ( <i>Calibrachoa hybrida</i> )   |
| 537 | <i>Tomato bushy stunt virus</i>                           | Virus  | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta pimiento ( <i>Capsicum annuum</i> ), semilla pimiento ( <i>Capsicum annuum</i> ), semilla tomate ( <i>Solanum lycopersicum</i> ), semilla berenjena ( <i>Solanum melongena</i> )  |
| 538 | <i>Tomato black ring virus</i>                            | Virus  | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla tomate ( <i>Solanum lycopersicum</i> ), semilla berenjena ( <i>Solanum melongena</i> ), semilla lechuga ( <i>Lactuca sativa</i> )  |
| 539 | <i>Tomato brown rugose fruit virus</i>                    | Virus  | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla pimiento ( <i>Capsicum annuum</i> ), semilla tomate ( <i>Solanum lycopersicum</i> )  |
| 540 | <i>Tomato mosaic virus</i>                                | Virus  | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla tomate ( <i>Solanum lycopersicum</i> ), semilla pimiento ( <i>Capsicum annuum</i> )  |
| 541 | <i>Tobacco mosaic virus</i>                               | Virus  | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla pimiento ( <i>Capsicum annuum</i> ), planta in vitro ( <i>Torenia hybrida</i> )  |
| 542 | <i>Tobacco rattle virus</i>                               | Virus  | Ausente: no hay registros de la plaga | Semillas pimiento ( <i>Capsicum annuum</i> )   |
| 543 | <i>Tobacco streak virus</i>                               | Virus  | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla tomate ( <i>Solanum lycopersicum</i> ), semilla pimiento ( <i>Capsicum annuum</i> ), planta pimiento ( <i>Capsicum annuum</i> ), semilla lechuga ( <i>Lactuca sativa</i> ), semilla soya ( <i>Glycine max</i> ), semilla alfalfa ( <i>Medicago sativa</i> ), planta in vitro ( <i>Calendula officinalis</i> ), semilla espárrago ( <i>Asparagus officinalis</i> ), semilla arveja ( <i>Pisum sativum</i> )   |
| 544 | <i>Turnip mosaic virus</i>                                | Virus  | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla repollo ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> ), planta in vitro ( <i>Petunia hybrida</i> )  |
| 545 | <i>Tomato leaf curl New Delhi virus</i>                   | Virus  | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla zuchini ( <i>Cucurbita pepo</i> )  |
| 546 | <i>Tomato yellow leaf curl virus</i>                      | Virus  | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta raíz desnuda ( <i>Petunia hybrida</i> )   |
| 547 | <i>Tomato ringspot virus</i>                              | Virus  | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla tomate ( <i>Solanum lycopersicum</i> )   |
| 548 | <i>Tomato spotted wilt orthotospovirus</i>                | Virus  | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta in vitro ( <i>Zantedeschia aethiopica</i> ), ( <i>Bidens pilosa</i> ), ( <i>Calibrachoa hybrid</i> ), ( <i>Catharanthus roseus</i> ), planta raíz desnuda ( <i>Phalaenopsis</i> sp.), planta enraizada ( <i>Phalaenopsis amabilis</i> ), ( <i>Phalaenopsis hybrids</i> ), esqueje sin raíz ( <i>Iberis gibraltica</i> ), semilla pimiento ( <i>Capsicum annuum</i> ), esqueje sin raíz ( <i>Petunia hybrida</i> ), planta enraizada con sustrato ( <i>Zantedeschia aethiopica</i> ), ( <i>Begonia multiflora</i> ), ( <i>Stevia rebaudiana</i> ), ( <i>Ficus elastica</i> ), planta enraizada ( <i>Gerbera jamesonii</i> ), flores corte ( <i>Lathyrus odoratus</i> ) |
| 549 | <i>Zucchini yellow mosaic virus</i>                       | Virus  | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla ayote ( <i>Cucurbita moschata</i> ), semilla pepino ( <i>Cucumis sativus</i> ), sandía fresca ( <i>Citrullus lanatus</i> ), melón fresco ( <i>Cucumis melo</i> ), semilla calabaza, zuchini ( <i>Cucurbita pepo</i> ), semilla sandía ( <i>Citrullus lanatus</i> )   |
| 550 | <i>Abutilon theophrasti</i> Medik.                        | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Grano trigo ( <i>Triticum aestivum</i> ), malta cebada grano ( <i>Hordeum vulgare</i> )  |
| 551 | <i>Acalypha amentacea</i> Roxb.                           | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 552 | <i>Adiantum pedatum</i> L.                                | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 553 | <i>Agave americana</i> L.                                 | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 554 | <i>Agave attenuata</i> Salm-Dyck                          | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 555 | <i>Ageratina adenophora</i> (Spreng.) R.M. King & H. Rob. | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Planta enraizadas con compost de corteza de pino y perlita macadamia ( <i>Macadamia integrifolia</i> )   |
| 556 | <i>Aloe striata x maculata</i>                            | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 557 | <i>Alopecurus myosuroides</i> Huds. (1762)                | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Grano maíz ( <i>Zea mays</i> ), grano linaza ( <i>Linum usitatissimum</i> ), malta cebada grano ( <i>Hordeum vulgare</i> ), semilla maíz ( <i>Zea mays</i> ), grano trigo ( <i>Triticum aestivum</i> )   |
| 558 | <i>Alternanthera ficoidea</i>                             | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |



| No. | Nombre Científico                                  | Grupo  | Situación                             | Artículos reglamentados  |
|-----|--|--------|---------------------------------------|--|
| 559 | <i>Allium neapolitanum</i> Cirillo                 | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 560 | <i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb. | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Grano y semilla arroz ( <i>Oryza sativa</i> )  |
| 561 | <i>Amaranthus palmeri</i> S. Watson                | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Grano soya ( <i>Glycine max</i> )  |
| 562 | <i>Amaranthus retroflexus</i> L. (1753)            | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes), semilla zanahoria ( <i>Daucus carota</i> )   |
| 563 | <i>Anagallis arvensis</i> L. (1753)                | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Grano de girasol ( <i>Helianthus annuus</i> )  |
| 564 | <i>Anemone coronaria</i>                           | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 565 | <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.                  | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Grano y semilla frijol ( <i>Phaseolus vulgaris</i> ), grano trigo ( <i>Triticum aestivum</i> ), grano arroz ( <i>Oryza sativa</i> ), grano y semilla girasol ( <i>Helianthus annuus</i> ), semilla y grano maíz ( <i>Zea mays</i> ), semilla tomate ( <i>Solanum lycopersicum</i> ), grano soya ( <i>Glycine max</i> ) |
| 566 | <i>Ambrosia trifida</i> L.                         | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Grano maíz amarillo ( <i>Zea mays</i> )  |
| 567 | <i>Arachis glabrata</i> Benth.                     | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 568 | <i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco     | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 569 | <i>Arundo donax</i> L.                             | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 570 | <i>Avena sterilis</i> L.                           | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Grano trigo ( <i>Triticum aestivum</i> )   |
| 571 | <i>Avena fatua</i> L. (1753)                       | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Grano arroz ( <i>Oryza sativa</i> ), grano trigo ( <i>Triticum aestivum</i> ), grano girasol ( <i>Helianthus annuus</i> ), malta cebada grano ( <i>Hordeum vulgare</i> ), grano maíz ( <i>Zea mays</i> ), semilla arroz ( <i>Oryza sativa</i> )  |
| 572 | <i>Borreria latifolia</i> (Aubl.) K. Schum. 1888   | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla cebolla ( <i>Allium cepa</i> ), semilla alfalfa ( <i>Medicago sativa</i> ), grano de soya ( <i>Glycine max</i> )   |
| 573 | <i>Bouvardia ternifolia</i> (Cav.) Schltldl.       | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 574 | <i>Bromus madritensis</i> L.                       | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla girasol ( <i>Helianthus annuus</i> )   |
| 575 | <i>Bromus secalinus</i> L.                         | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Grano trigo ( <i>Triticum aestivum</i> )   |
| 576 | <i>Bromus sterilis</i> L.                          | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla girasol ( <i>Helianthus annuus</i> )   |
| 577 | <i>Bromus tectorum</i> L.                          | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Grano trigo ( <i>Triticum aestivum</i> ), malta cebada grano ( <i>Hordeum vulgare</i> )  |
| 578 | <i>Caryota mitis</i> Lour.                         | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 579 | <i>Chloris barbata</i> Sw. 1797                    | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla rroz ( <i>Oryza sativa</i> )   |
| 580 | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop. (1772)           | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Grano linaza ( <i>Linum usitatissimum</i> ), malta cebada grano ( <i>Hordeum vulgare</i> ), grano trigo ( <i>Triticum aestivum</i> )   |
| 581 | <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.                 | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Grano linaza ( <i>Linum usitatissimum</i> ), semilla y grano maíz ( <i>Zea mays</i> ), malta cebada grano ( <i>Hordeum vulgare</i> ), grano arroz ( <i>Oryza sativa</i> ), grano trigo ( <i>Triticum aestivum</i> )  |
| 582 | <i>Convolvulus arvensis</i> L.                     | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes), semilla alfalfa ( <i>Medicago sativa</i> ), grano linaza ( <i>Linum usitatissimum</i> ), malta cebada grano ( <i>Hordeum vulgare</i> ), grano trigo ( <i>Triticum aestivum</i> )   |
| 583 | <i>Commelina benghalensis</i> L. (1753)            | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla pasto brachiaria ( <i>Brachiaria brizantha</i> ), ( <i>Brachiaria decumbens</i> ), semilla pasto panicum ( <i>Panicum maximum</i> ), grano arroz ( <i>Oryza sativa</i> ), semilla tomate ( <i>Solanum lycopersicum</i> )   |

| No. | Nombre Científico   | Grupo  | Situación                             | Artículos reglamentados  |
|-----|---|--------|---------------------------------------|--|
| 584 | <i>Cuscuta campestris</i> Yuncker (1932)                  | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Grano y semilla ajonjolí ( <i>Sesamum indicum</i> ), semilla alfalfa ( <i>Medicago sativa</i> )  |
| 585 | <i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L. 1774                     | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla zanahoria ( <i>Daucus carota</i> )   |
| 586 | <i>Cyperus papyrus</i> L.                                 | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 587 | <i>Chenopodium murale</i> L.                              | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla tomate ( <i>Solanum lycopersicum</i> ), grano sorgo ( <i>Sorghum bicolor</i> )   |
| 588 | <i>Dianthus deltoides</i>                                 | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 589 | <i>Delphinium staphisagria</i> L.                         | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 590 | <i>Dieffenbachia amoena</i> Bull.                         | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 591 | <i>Dietes bicolor</i> (Steud.) Sweet ex Klatt             | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 592 | <i>Duranta erecta</i> L.                                  | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 593 | <i>Dypsis cabadae</i> (H.E.Moore) Beentje & J.Dransf.     | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 594 | <i>Dracaena reflexa</i> Lam.                              | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 595 | <i>Emex australis</i> Steinh.                             | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla sorgo ( <i>Sorghum bicolor</i> )   |
| 596 | <i>Emex spinosa</i> (L.) Campd.                           | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Malta cebada grano ( <i>Hordeum vulgare</i> )  |
| 597 | <i>Epipremnum pinnatum</i> (L.) Engl.                     | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 598 | <i>Eragrostis eliottii</i> S. Watson                      | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 599 | <i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey ex F. Delaroché | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 600 | <i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á.Löve                   | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla arroz ( <i>Oryza sativa</i> ), grano arroz oro y granza ( <i>Oryza sativa</i> ), grano linaza ( <i>Linum usitatissimum</i> ), malta cebada grano ( <i>Hordeum vulgare</i> ), grano trigo ( <i>Triticum aestivum</i> ), grano soya ( <i>Glycine max</i> ) |
| 601 | <i>Festuca</i> L.   | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 602 | <i>Ficus retusa</i> L.                                    | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 603 | <i>Fumaria officinalis</i> L. (1753)                      | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla zanahoria ( <i>Daucus carota</i> )   |
| 604 | <i>Furcraea foetida</i> (L.) Haw.                         | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 605 | <i>Freesia alba</i> (G.L.Mey.) Gumbel.                    | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 606 | <i>Gazania linearis</i> (Thunb.) Druce                    | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 607 | <i>Gardenia brighamii</i> H. Mann                         | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 608 | <i>Hedera helix</i> L.                                    | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 609 | <i>Hedera algeriensis</i> Hibberd                         | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |

| No. | Nombre Científico                                     | Grupo  | Situación                             | Artículos reglamentados  |
|-----|---|--------|---------------------------------------|--|
| 610 | <i>Heliconia bihai</i> (L.) L.                        | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 611 | <i>Heliconia chartacea</i> Lane ex Barreiros          | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 612 | <i>Heliconia psittacorum</i> L. f.                    | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 613 | <i>Imperata cylindrica</i> (Linnaeus) Rauschel (1797) | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Grano, semilla arroz ( <i>Oryza sativa</i> )   |
| 614 | <i>Lamium amplexicaule</i> L.                         | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Malta cebada grano ( <i>Hordeum vulgare</i> )  |
| 615 | <i>Lepidium draba</i> L. (1753)                       | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla alfalfa ( <i>Medicago sativa</i> ), grano cebada ( <i>Hordeum vulgare</i> ), grano girasol ( <i>Helianthus annuus</i> ), malta cebada grano ( <i>Hordeum vulgare</i> )                                   |
| 616 | <i>Leptochloa chinensis</i> (L.) Nees, 1824           | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla arroz ( <i>Oryza sativa</i> )  |
| 617 | <i>Liriope muscari</i> (Decne.) L.H.Bailey            | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 618 | <i>Lobelia erinus</i> L.                              | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 619 | <i>Lobularia</i> Desv.                                | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 620 | <i>Lolium multiflorum</i> Lam. (1779)                 | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Grano linaza ( <i>Linum usitatissimum</i> ), grano cebada ( <i>Hordeum vulgare</i> ), malta cebada grano ( <i>Hordeum vulgare</i> ), grano trigo ( <i>Triticum aestivum</i> ), grano soya ( <i>Glycine max</i> ) |
| 621 | <i>Lolium temulentum</i> L.                           | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla rábano ( <i>Raphanus sativus</i> ), semilla sandía ( <i>Citrullus lanatus</i> ), malta cebada grano ( <i>Hordeum vulgare</i> )   |
| 622 | <i>Lysimachia nummularia</i> L.                       | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 623 | <i>Macrosiphonia longiflora</i> (Desf.) Müll. Arg.    | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 624 | <i>Ophiopogon japonicus</i> (L. f.) Ker Gawl.         | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 625 | <i>Orobancha minor</i> Sm. (1797)                     | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla alfalfa ( <i>Medicago sativa</i> )   |
| 626 | <i>Orobancha ramosa</i> L. (1753)                     | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla brócoli ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i> )   |
| 627 | <i>Oryza punctata</i> Kotschy ex Steud.               | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla arroz ( <i>Oryza sativa</i> )  |
| 628 | <i>Oryza rufipogon</i> Griff.                         | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Grano y semilla arroz ( <i>Oryza sativa</i> )  |
| 629 | <i>Pennisetum pedicellatum</i> Trin.                  | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla sorgo ( <i>Sorghum bicolor</i> )   |
| 630 | <i>Pennisetum setaceum</i> (Forsskal) Chiovenda, 1923 | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 631 | <i>Pennisetum villosum</i> R. Br. ex Fresen.          | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 632 | <i>Peperomia clusiifolia</i> (Jacq.) Hook.            | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 633 | <i>Persicaria maculosa</i> Gray                       | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Grano soya ( <i>Glycine max</i> ), malta cebada grano ( <i>Hordeum vulgare</i> )   |
| 634 | <i>Philodendron xanadu</i> Croat, Mayo & J.Boos       | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 635 | <i>Polygonum aviculare</i> L. (1753)                  | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla cebolla ( <i>Allium cepa</i> ), semilla alfalfa ( <i>Medicago sativa</i> )   |

| No. | Nombre Científico   | Grupo  | Situación                             | Artículos reglamentados  |
|-----|---|--------|---------------------------------------|--|
| 636 | <i>Ranunculus asiaticus</i> L.                                | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 637 | <i>Rhapis excelsa</i> (Thunb.) Henry ex Rehder                | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 638 | <i>Ruscus aculeatus</i> L.                                    | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 639 | <i>Rumex acetosella</i> L.                                    | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla pasto brachiaria ( <i>Brachiaria brizantha</i> ), ( <i>Brachiaria decumbens</i> ), semilla pasto panicum ( <i>Panicum maximum</i> )  |
| 640 | <i>Saccharum spontaneum</i> L.                                | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Cormo piña ( <i>Ananas comosus</i> )   |
| 641 | <i>Salsola vermiculata</i> L.                                 | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla melón ( <i>Cucumis melo</i> )  |
| 642 | <i>Sedum palmeri</i> S. Watson                                | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 643 | <i>Sedum praealtum</i> A. DC.                                 | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 644 | <i>Schefflera arboricola</i> (Hayata) Merr.                   | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 645 | <i>Senecio vulgaris</i> L. (1753)                             | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla pasto ( <i>Lolium perenne</i> )  |
| 646 | <i>Sesbania sericea</i> (Willd.) Link. 1822                   | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Grano arroz ( <i>Oryza sativa</i> )  |
| 647 | <i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult. (1817)          | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Grano linaza ( <i>Linum usitatissimum</i> )  |
| 648 | <i>Solanum carolinense</i> L. (1753)                          | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla dactilo ( <i>Dactylis glomerata</i> )  |
| 649 | <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cavanilles                      | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla algodón ( <i>Gossypium hirsutum</i> ), semilla pasto bermuda ( <i>Cynodon dactylon</i> ), grano y semilla maiz ( <i>Zea mays</i> ), semilla alfalfa ( <i>Medicago sativa</i> ), grano trigo ( <i>Triticum aestivum</i> ) |
| 650 | <i>Spergula arvensis</i> L.                                   | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Grano maiz ( <i>Zea mays</i> )   |
| 651 | <i>Sphenoclea zeylanica</i> Gaertn. (1788)                    | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla arroz ( <i>Oryza sativa</i> )  |
| 652 | <i>Striga asiatica</i> (L.) Kuntze                            | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla arroz ( <i>Oryza sativa</i> )  |
| 653 | <i>Tecoma capensis</i> (Thunb.) Lindl.                        | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 654 | <i>Thlaspi arvense</i> L.                                     | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Grano girasol ( <i>Helianthus annuus</i> )   |
| 655 | <i>Torenia fournieri</i> Linden ex E. Fourn.                  | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 656 | <i>Urochloa panicoides</i> P. Beauv.                          | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla sorgo ( <i>Sorghum bicolor</i> )   |
| 657 | <i>Urochloa platyphylla</i> (Munro ex C. Wright) R.D. Webster | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Arroz en granza ( <i>Oryza sativa</i> )  |
| 658 | <i>Vetiveria zizanioides</i> (L.) Nash                        | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 659 | <i>Veronica officinalis</i> L.                                | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes)   |
| 660 | <i>Vicia villosa</i>  | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Malta cebada grano ( <i>Hordeum vulgare</i> )  |

| No. | Nombre Científico                                     | Grupo  | Situación                             | Artículos reglamentados        |
|-----|---|--------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 661 | <i>Xanthium strumarium</i> L. (1753)                  | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes) |
| 662 | <i>Wodyetia bifurcata</i> A.K.Irvine                  | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes) |
| 663 | <i>Zamia furfuracea</i> Aiton                         | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes) |
| 664 | <i>Zamia purpurea</i> Vovides, J.D.Rees & Vázq.Torres | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga | Material de siembra (esquejes) |

#### LISTA DE PLAGAS NO CUARENTENARIAS REGLAMENTADAS

| No. | Nombre Científico   | Grupo    | Situación                          | Artículos reglamentados  |
|-----|---|----------|------------------------------------|--|
| 1   | <i>Citrus huanglongbing (greening) disease</i>  | Bacteria | Presente: sujeta a control oficial | Material de siembra de cítricos. Norma Técnica Obligatoria Nicaraguense (NTON) No. 11038-13 "Certificación Fitosanitaria de Material Propagativo de Cítricos" y Acuerdo Ministerial No. 021-2010.  |
| 2   | <i>Citrus leprosis virus C</i>  | Virus    | Presente: sujeta a control oficial | Material de siembra de cítricos. Norma Técnica Obligatoria Nicaraguense (NTON) No. 11038-13 "Certificación Fitosanitaria de Material Propagativo de Cítricos" y Acuerdo Ministerial No. 11 - 2006.   |
| 3   | <i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting et al., 2009                       | Bacteria | Presente: sujeta a control oficial | Material de siembra (tubérculos). Acuerdo Ministerial No. 004-2012.  |
| 4   | <i>Burkholderia glumae</i> (Kurita & Tabei 1967) Urakami et al. 1994                    | Bacteria | Presente: sujeta a control oficial | Material de siembra (semilla). Acuerdo Ministerial No. 003-2011.   |
| 5   | <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996                         | Bacteria | Presente: sujeta a control oficial | Material de siembra de musáceas. Norma Técnica Obligatoria Nicaraguense (NTON) No. 11 046 14. Certificación de Material de Propagación. Musáceas. Norma Técnica para la Certificación de Semilla de Tomate y Pimiento. Norma Técnica Obligatoria Nicaraguense (NTON) No. 11 018 06.  |
| 6   | <i>Fusarium oxysporum f.sp. cubense</i> (E.F. Sm.) W.C. Snyder & H.N. Hansen (anamorph) | Fungi    | Presente: sujeta a control oficial | Material de siembra de musáceas. Norma Técnica Obligatoria Nicaraguense (NTON) No. 11 046 14. Certificación de Material de Propagación. Musáceas.  |
| 7   | <i>Dickeya</i> sp.  | Bacteria | Presente: sujeta a control oficial | Material de siembra de musáceas. Norma Técnica Obligatoria Nicaraguense (NTON) No. 11 046 14. Certificación de Material de Propagación. Musáceas.  |
| 8   | <i>Pythium myriotylum</i> Drechsler   | Fungi    | Presente: sujeta a control oficial | Material de siembra de quequisque ( <i>Xanthosoma</i> spp.) y malanga ( <i>Colocasia esculenta</i> ). Norma Técnica Obligatoria Nicaraguense (NTON) No. 11 047 15. Certificación de Material de Propagación. yuca ( <i>Manihot esculenta</i> Crantz), quequisque ( <i>Xanthosoma</i> spp.) y malanga ( <i>Colocasia esculenta</i> ). |