

FRANKREICH

Verordnung vom 31. Juli 2000 zur Festlegung der Schadorganismen von Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen und anderen Gegenständen, die der Bekämpfung unterliegen

(Arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire)

Quelle: <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000584174/2026-10-30>, aufgerufen am 30.10.2026

(Auszugsweise Übersetzung aus dem Französischen, Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, Institut für nationale und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft; 30.10.2026)

Die Übersetzung und Wiedergabe erfolgen ohne Gewähr.

Inoffiziell konsolidierte Fassung. Geändert durch:

- M1 Verordnung vom 26.09.2016
- M2 Verordnung vom 16.02.2020
- M3 Verordnung vom 28.04.2026

Verordnung vom 31. Juli 2000 zur Festlegung der Schadorganismen von Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen und anderen Gegenständen, die der Bekämpfung unterliegen

...

Liste der Organismen, die der dauerhaften Bekämpfung im gesamten Gebiet unterliegen.

Anhang A

▼M3

Kapitel I: (Aufgehoben)

Kapitel II: Bestimmungen für Übersee-Départements.

1. Départements Martinique und Guadeloupe

Folgende Schadorganismen:

Acromyrmex spp. außer A. octospinosus für Guadeloupe;

Atta spp.;

Bactrocera umbrosa;

Bactrocera tryoni;

Bactrocera zonata;

Banana bunchy top virus;

Banana streak virus;

Bract mosaic disease;

Ceratitis capitata;

Cercospora angolensis;
Dacus bivittatus;
Dacus ciliatus;
Diaphorina citri;
Elephantiasis;
Mycosphaerella fijensis oder *Cercospora fijensis*;
Pratylenchus goodeyi;
Ralstonia solanacearum race II;
Rhizoctonia theobromae;
Spiroplasma citri;
 Sugarcane fidji virus;
 Sugarcane mosaic virus;
 Tephritidées außer *Anastrepha obliqua*;
Xanthomonas campestris pv. *celebensis*;
Xanthomonas axonopodis pv. *citri*.

2. Département Guyana

i) Folgende Schadorganismen:

Achatina fulica (achatine);
Acysta persea (hémiptère tingidae sur avocatier);
Aleurocanthus spiniferus (aleurode du manguier);
Anthonomus grandis (coton);
Bactrocera spp. (außer *B. carambolae*);
Brevipalpus australis (léprose sur citrus);
Ceratitis spp. (mouche méditerranéenne des fruits);
Ceratostomella paradoxa (pourriture de l'ananas, du café, de la canne);
Chilo partellus (foreur de la canne et du maïs);
Clavibacter xili subsp. *xili* (rabougrissement des repousses de cannes);
 Coconut foliar decay virus;
Conotrachelus aguacatae (charançon de l'avocatier);
Conotrachelus persea (charançon de l'avocatier);
Cosmopolites sorditus (charançon du bananier);
Dacus spp.;
Deuterophoma tracheiphila (malseco des agrumes);

Diplodia natalensis (chancre de l'avocatier);
Eldana saccharina (pyrale de la canne à sucre);
Erwinia chrysanthemi;
Erwinia sp. nicht-pektinolytisch (sur Carica papaya);
Frankliniella occidentalis (thrips californien);
Heillipus lauri (charançon des graines d'avocatier);
Henosepilachna elaterii (coccinelle phytophage);
Hirschmaniella orizae et spinicodata (nématodes sur riz);
Hoja blanca virus;
Impatiens necrotic spot virus;
Lethal yellowing disease (mycoplasme du jaunissement mortel);
Limicolaria aurora (escargot géant d'Afrique);
Maize streak virus (souche canne à sucre);
Megastes grandalis (pyrale de la patate douce);
Megastes pusialis (pyrale de la patate douce);
Meloidogyne graminicola (nématode sur riz);
Mycosphaerella fijensis (cercosporiose noire du bananier);
Myndus spp. (cicadelles vectrices du jaunissement mortel);
Ochlerus spp. (punaises vectrices du dépérissement foliaire des palmacées);
Opogona sacchari (tordeuse du bananier);
Papaya bunchy top mycoplasma;
Papaya distortion ring spot virus;
Papaya mosaic virus;
Phoma tracheiphila (citrus);
Pratylenchus goodeyi (nématode du bananier);
Prays citri (teigne du citronnier);
Prays endocarpa (teigne des agrumes);
Prosopis glandulosa (légumineuse mimosée épineuse);
Pseudomonas fuscovaginae;
Pseudomonas syringae pv. passiflorae;
Pseudomonas syringae pv. purpureae;
Quadraspidiotus perniciosus;
Ralstonia solanacearum race II (maladie de Moko sur musacées et zingiberacées);

Recilia mica (cicadelle responsable du blast des palmiers);
Rhizoctonia theobromae (maladie du balai de sorcière du manioc);
 Rice grassy stunt virus (rabougrissement herbacé du riz);
Roxia pornia (mouche des fruits polyphage);
Sphacelotheca macrospora (charbon vêtu de la canne);
Spiroplasma citri (stubborn);
Stenoma catenifer (chenille de la graine et du fruit de l'avocatier);
Stephanitis typica (punaise phytophage vectrice de dépérissement des palmacées);
Striga spp.;
Tenipalpus pseudocuneatus (léprose sur citrus);
Trialeurodes vaporariorum (aleurode tropicale);
Vanilla mosaic potyvirus (potyvirus Tahiti);
Vanilla necrotic potyvirus (potyvirus Tonga);
 Viroïde du cadang (dépérissement ou taches jaunes du cocotier);
Xanthium spp. (astéracées annuelles ou vivaces à involucre épineux);
Xanthomonas albilineans (échaudure de la canne à sucre);
Xanthomonas axonopodis pv. *dieffenbachiae* (feu bactérien de l'anthurium);
Xanthomonas campestris pv. *celebensis* (sur *Musa* spp.);
Xanthomonas campestris pv. *mangiferae indicae* (bactériose du manguier);
Xanthomonas campestris pv. *manihoti* (bactériose du manioc);
Xanthomonas campestris pv. *passiflorae*;
Xanthomonas campestris pv. *vasculorum* (sur graminées et bambous);

- ii) Die in den Anhängen I und II der Verordnung vom 24. Mai 2006 über die gesundheitlichen Anforderungen an Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und andere Gegenstände genannten Schadorganismen, mit Ausnahme der nachstehend aufgeführten:

Aleurocanthus woglumi (aleurode noire des citrus);
Anastrepha spp. (außer *A. ludens* et *A. fraterculus*) (mouche des fruits);
Aphelenchoides besseyi;
Bemisia tabaci (aleurode);
Citrus tristeza closterovirus (tristeza);
Elsinoe spp.;
Liriomyza trifolii (mouche mineuse);
Psorosis (psorose écailleuse);
Radopholus similis (nématode du bananier);

Ralstonia solanacearum race 1 (flétrissement bactérien);
Septoria lycopersici;
Spodoptera eridania (noctuelle);
Spodoptera frugiperda (noctuelle des graminées);
Thrips palmi;
Toxoptera citricida (puceron noir des agrumes);
Unaspis citri.

3. Département La Réunion

- i) Folgende Schadorganismen:
 - a) Animaux:
 - Aceria litchi*;
 - Aceria mangifera*;
 - Aceria sheldoni*;
 - Acrolepiopsis assectella*;
 - Acromyrmex octopinosus*;
 - Acromyrmex* spp.;
 - Acysta persea* (an Früchten, Blättern und Blüten von Avocado);
 - Agromyza oryzae*;
 - Aleurocanthus cocos*;
 - Aleurocanthus spiniferus*;
 - Aleurocanthus woglumi*;
 - Alissonotum piceum*;
 - Anarsia lineatella*;
 - Anastrepha* spp.;
 - Aphelenchoïdes besseyi*;
 - Argyrotaenia pulcellana*;
 - Atta cephalotes*;
 - Atta sexdens*;
 - Atta* spp.;
 - Cacyreus marshalli* (an Pélargonium und Géranium);
 - Castnia deadalus*;
 - Castnia licoïdes*;
 - Ceratitis cosvra*;

Chilo partellus;
Clemora smithi;
Conotrachelus perseae;
Ctenarytaina eucalypti;
Dacus bivittatus;
Dacus frenchi = *Bactrocera umbrosa*;
Dacus neohumeralis;
Dacus tryoni;
Dacus zonatus;
Daktulosphaira vitifoliae;
Delia antiqua;
Delia brassica;
Ditylenchus angustus;
Echinothrips americanus (an Araceae und Balsaminaceae);
Eldana saccharina;
Eupoecilia ambiguella;
Grapholita molesta;
Heillipus lauri;
Heterodera schachtii;
Heteronychus arator;
Heteronychus licas;
Heteronychus spp.;
Hypothenemus hampeii;
Idiocerus spp.;
Iridomyrmex humilis;
Lampestis equestris;
Laspeyresia funebrata;
Laspeyresia nigricana;
Laspeyresia pomonella;
Leptinotarsa decemlineata;
Leucoptera scitella;
Lincus spp. (punaises vectrices de dépérissements foliaires des palmacées à phytomonas
 Hartrot du cocotier, Marchitez du palmier à huile);

Lopesia botrana;
Lyonetia clerklela;
Maconellicoccus hirsutus;
Megastes grandalis (pyrale de la patate douce *Ipomea batatas*);
Megastes pusialis;
Melolontha melolontha;
Merodon equestris (mouche des bulbes);
Messor barbarus;
Metcalfa pruinosa;
Myndus spp. (cicadelles cixiidées vectrices du dépérissement foliaire viral CFDV et du jaunissement mortel Lethal yellowing MLO);
Ochlerus spp. (punaises vectrices de dépérissements foliaires des palmacées à *Phytophthora* Hartrot du cocotier);
Oecophylla spp.;
Otiorrhynchus spp. (otiorrhynques);
Pardalaspis quinaria;
Parlagena benetti;
Parlatoria zizyphii;
Perkinsiella saccharicida;
Phthorimea operculella (teigne de la pomme de terre);
Phyllophaga smithii (hanneton de la Barbade et de Maurice);
Planococcus citri;
Pratylenchus coffea;
Prays endocarpa;
Prostephanus truncatus;
Pseudococcus viburni (cochenille farineuse de la tomate);
Psila rosae;
Psylla mali;
Quadraspidotus perniciosus;
Recilia mica (cicadelle responsable du , blast ¹ des palmiers);
Rhadinaphelenchus cocophilus;
Sogatella furcifera;
Sogatella kolophon und *S. cubana* (homoptères responsables de la pourriture sèche du cœur de cocotier);

Stephanitis typicus;

Sternocnetus frigidus;

Sternochetus mangiferae (an Früchten und Samen von *Mangifera indica*);

Tephritidées à l'exception de *Pardalaspis cyanescens*, *Ceratitis rosa*, *Ceratitis cattoirii*, *Dacus ciliatus*, *Bactrocera cucurbitae*, *Dacus demmerezi* (mouches des fruits);

Thaumetopoea pityocampa;

Tylenchorhynchus martini;

Unaspis citri;

Viteus vitifolii;

Zeuzera pyrina;

b) Bactéries:

Agrobacterium tumefaciens rubi (oder Biovar III);

Curtobacterium (*Corynebacterium*) *flaccumfasciens*;

Erwinia amylovora;

Erwinia ananas;

Erwinia nicht-pektolytisch für Papaya;

Erwinia stewartii;

Erwinia tracheiphila;

Phytophthora sp. (responsable de dépérissements sur végétaux de *Cocos nucifera* et palmier à huile);

Pseudomonas andropogoni (sorgho, canne à sucre);

Pseudomonas gladioli pv. *gladioli*;

Pseudomonas solanacearum race II;

Pseudomonas syringae pv. *lachrymans*;

Pseudomonas syringae pv. *mors-prunorum*;

Pseudomonas syringae pv. *passiflorae*;

Pseudomonas syringae pv. *purpurea* (Pflanzen, Früchte und Samen von Avocado);

Pseudomonas syringae pv. *syringae*;

Pseudomonas syringae pv. *tabaci*;

Xanthomonas campestris pv. *begoniae*;

Xanthomonas campestris pv. *celebensis* (Pflanzen von *Musa* spp.);

Xanthomonas campestris pv. *mangiferae indicae*;

Xanthomonas campestris pv. *manihotis*;

Xanthomonas campestris pv. *passiflorae*;

- Xanthomonas campestris* pv. *vasculorum*;
Xylella fastidiosa;
- c) Cryptogames:
- Botryodiplodia* sp.;
Cercospora angolensis;
Colletotrichum fragariae;
Diplodia natalensis (chancre de l'avocatier);
Elsinoe sp., *Sphaeceloma* sp. (tavelures des agrumes);
Eutypa armeniacae;
Eutypa lata;
Fusarium oxysporum f. sp. *cubense* Rasse IV;
Fusarium oxysporum f. sp. *Melonis*;
Gibberella xylarioïdes;
Marasmius perniciosus;
Mycosphaerella fijiensis;
Mycosphaerella fijiensis var. *difformis*;
Mycosphaerella musicola;
Peronosclerospora sacchari (oder *Sclerophtora sacchari*);
Peronospora litchi;
Phytophthora fragariae;
Phytophthora rubi (dépérissement du framboisier);
Piricularia oryzae (piriculariose du riz *Oryza sativae* L sur semences et végétaux);
Pseudocercospora purpurea;
Sceropora macrospora;
Thielaviopsis basicola;
Trachyphaera fructigena;
Urocystis cepulae;
- d) Virus et pathogènes similaires aux virus:
- Avocado sun blotch viroïd;
Bamboo mosaic virus (Pflanzen von *Bambusa* spp.);
Banana bunchy top virus;
Banana mosaic virus (Cucumber mosaic virus);
Bract mosaic disease;

Chrysanthemum stunt viroïde;
 Chrysanthemum virus B;
 Citrus Blight;
 Citrus Cachexie;
 Coconut foliar decay virus (dépérissement foliaire du cocotier);
 Cucumber green mottle virus;
 Dioscorea (= Yam) Green Banding virus;
 Grapevine Fanleaf virus;
 Hibiscus chlorotic ringspot virus (Hibiscus, Rosa sinensis);
 Hibiscus latent ringspot virus (Hibiscus, Rosa sinensis);
 Impatiens necrotic spot virus (virus nécrotique de l'impatiens nombreuses plantes hôtes);
 Maïze Streak virus (souche canne à sucre);
 Maracudja mosaic virus (Passiflora spp.);
 Mycoplasme de la flavescence dorée;
 Mycoplasme du Grassy Shoot;
 Mycoplasme du jaunissement mortel (oder Letal Yellowing oder Kaincope-Krankheit oder Cap Saint-Paul-Krankheit);
 Mycoplasme du White Leaf;
 New peach mosaic virus (nouvelle mosaïque du pêcher);
 Papaya bunchy top mycoplasma;
 Papaya ring spot virus souche P (papayers et cucurbitacées);
 Papayer mosaic virus;
 Passion fruit ring spot virus;
 Passion fruit woodiness virus;
 Peach latent mosaic viroid;
 Peanut clump virus;
 Pepper mild mottle virus (Pflanzen von Capsicum sp. und anderen Solanaceae);
 Phytomonas sp.;
 Pineapple chlorotic streak virus (Ananas sp.);
 Pineapple wilt virus;
 Plum pox virus;
 Potato spindle tuber Viroïd;
 Potato yellow dwarf virus;

Potato yellow Vein virus;
 Spiroplasma citri (Stubborn);
 Squash mosaïc virus;
 Strawberry vein banding virus;
 Sugar cane Fiji virus;
 Sugar cane mosaïc virus;
 Sugar cane streak virus;
 Sweet potato feathery mottel virus;
 Sweet potato mild mottle virus;
 Sweet potato vein mosaïc virus;
 Sweet potato yellow dwarf virus;
 Tobacco etch virus (Capsicum sp., Lycopersicon sp., Nicotiana sp.);
 Tobacco ring spot virus;
 Tobacco streak virus;
 Tomato aspermy virus;
 Tomato bunchy top virus;
 Tomato bushy stunt virus;
 Tomato bushy stunt virus (rabougrissement de la tomate);
 Tomato spotted wilt virus;
 Vanilla potyvirus;
 Cadang-Cadang-Viroid;
 Watermelon silver mottle virus (Cucurbitaceae);
 Xyloporosis viroid (Citrus sp.);
 Yam internal browning disease;

e) Phanerogame:

Cuscuta spp.;
 Cyperus spp.;
 Elodea spp.;
 Salvinia molesta;
 Sorghum halepense;
 Striga spp.);

- ii) Die in den Anhängen I und II der Verordnung vom 24. Mai 2006 genannten Schadorganismen, mit Ausnahme der nachstehend aufgeführten:

Bemisia tabaci;
Ceratocystis fagacearum;
Clavibacter michiganensis subsp. *michiganensis*;
Citrus tristeza closterovirus (tristeza);
Dacus ciliatus;
Bactrocera cucurbitae;
Neoceratitis cyanescens;
Ditylenchus destructor;
Ditylenchus dipsaci;
Elsinoe fawcetti;
Erwinia chrysanthemi pv. *dianthicola*;
Helicoverpa armigera;
Liberobacter africanum (Citrus greening bacterium);
Liberobacter asiaticum (Citrus greening bacterium);
Liriomyza huidobrensis;
Liriomyza trifolii;
Mycoplasme de la nécrose du phloème d'*Ulmus*;
Mycosphaerella larici-leptolepes und *M. popularum*;
Ralstonia solanacearum Rassen 1 und 3;
Ceratitis rosa;
Puccinia horiana;
Radopholus similis;
Parasaissetia nigra;
Scirtothrips aurantii;
Septoria lycopersici;
Spodoptera littoralis;
Spodoptera litura;
Thrips palmi;
Tilletia indica;
Tomato spotted wilt virus;
Tomato yellow leaf curl virus;

Toxoptera citricida;
 Trioza erythrae (psylle africain des agrumes, Vektor von Citrus greening);
 Verticillium dahliae;
 Xanthomonas axonopodis pv. citri;
 Xanthomonas campestris pv. phaseoli;
 Xanthomonas campestris pv. vesicatoria;
 Xanthomonas fragariae;
 Xiphinema americanum.

**Liste des organismes contre lesquels la lutte est obligatoire sous certaines conditions.
 (Article Annexe B)**

Annexe B

▼ M2

Kapitel I: (Aufgehoben)

Kapitel II: Bestimmungen für Übersee-Départements.

1. Départements Martinique und Guadeloupe

- i) Die in den Anhängen I und II der Verordnung vom 24. Mai 2006 über die gesundheitlichen Anforderungen an Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und andere Gegenstände genannten Schadorganismen, die nicht in Anhang A Kapitel II Punkt 1 dieser Verordnung genannt sind;
- ii) Folgende Schadorganismen:
 - a) Tierische Organismen:
 - Aceria mangiferae (acarier du manguier);
 - Achatina fulica (achatine);
 - Acrolepiopsis assectella;
 - Acromyrmex spp. (fourmi défoliatrice polyphage);
 - Acysta perseo (hémiptère Tingidae sur avocatier);
 - Agromyza oryzae;
 - Aleurocanthus spiniferus (aleurode du citronnier, du manguier et de la vigne);
 - Aleurocanthus woglumi (aleurode noir des agrumes);
 - Aphelenchoïdes besseyi;
 - Bemisia tabaci;
 - Castnia deadalus;
 - Castnia licoïdes;
 - Ceratitis capitata;
 - Ceratitis cosyra (mouche du manguier);

Chilo partellus (foreur de la canne et du maïs);
Conotrachelus aguacatae;
Conotrachelus perseae;
Cosmopolites sordidus (charançon du bananier);
 Criquets (criquets);
Cyclas formicarius;
Dacus spp. (Fruchtfliege);
Delia antiqua;
Ditylenchus angustus;
Echinothrips americanus (thrips des aracées et balsaminacées);
Eldana saccharina (pyrale de la canne à sucre);
Frankliniella occidentalis;
Heillipus lauri;
Henosepilachna elaterii;
Heterodera schachtii;
Hexacolus guyanensis;
Hypothenemus hampei;
Idiocerus clypealis;
Iridomyrmex humilis;
Lampestis equestris;
Limicolaria aurora;
Leptinotera decemlineata;
Lincus spp. (punaises vectrices de dépérissements foliaires des palmacées à *Phytomonas*);
Maconellicoccus hirsutus;
Megastes grandalis et *Megastes pusialis* (pyrale de la patate douce);
Merodon equestris;
Mus musculus (souris domestique);
Mussidia migrivenella;
Myndus spp. (cicadelles cixiidées vectrices du dépérissement foliaire viral CFDV et du jaunissement mortel);
Ochlerus spp. (punaises vectrices de dépérissements foliaires de palmacées à *Phytomonas*);
Orchamoplatus mammaeferus (aleurode du croton);
Parfatoria zizyphii (cochenille noire des agrumes);

Parlagena benetti (cochenille du cocotier);
Pentalonia nigronervosa (puceron vecteur du Banana bunchy top virus);
Perkinsiella saccharicida;
Phthorimaea operculella (teigne de la pomme de terre);
Phyllocnistis citrella (tordeuse des agrumes);
Pratylenchus spp. (nématode du café et du bananier);
Prays citri;
Prays endocarpa (teigne des agrumes);
Quadraspidotus perniciosus (pou de San José);
Radopholus similis (nématode du bananier et souche citrus);
Rattus norvegicus (rat gris ou rat d'égout ou surmulot);
Rattus rattus (rat noir);
Recilia mica (cicadelle responsable du Blast des palmiers);
Rhadinaphelenchus cocophilus;
Roxia pornia;
Scutellonema bradys;
Sogatella furcifera (cicadelle du riz et autres graminées, vectrice du Stunt disease);
Sogatella kolophon und *S. cubana* (Homopterus delphacides responsables de la pourriture sèche du coeur du cocotier);
Stenoma catenifer;
Stephanitis typica (punaise phytophage);
Sternochetus mangiferae (charançon de la graine du manguier);
Sternocnetus frigidus;
Thecla basilides;
Toxoptera aurantii (puceron noir des agrumes, Vektor von Tristeza);
Trioza erythrae (psylle africain des agrumes, Vektor von Citrus greening);
Viteus vitifolii;
Xylopsocus capucinus;

b) Bakterien:

Agrobacterium tumefaciens;
Clavibacter xili ssp. *xili*;
Erwinia ananas;
Erwinia chrysanthemi;

Erwinia sp. nicht-pektolytisch (Pflanzen von *Carica papaya*);
Erwinia tracheiphila;
Liberobacter africanum (Citrus greening bacterium);
Liberobacter asiaticum (Citrus greening bacterium);
Pseudomonas andropogonis (Sorghum, Zuckerrohr);
Pseudomonas fuscovaginae;
Pseudomonas gladioli pv. *alliicola*;
Pseudomonas gladioli pv. *gladioli*;
Pseudomonas syringae pv. *lachrymans*;
Pseudomonas syringae pv. *Mors-prunorum*;
Pseudomonas syringae pv. *passiflorae* (*Passiflora* spp.);
Pseudomonas syringae pv. *purpurea* (an Avocado);
Pseudomonas syringae pv. *tabaci*;
Xanthomonas albilineans (Zuckerrohr);
Xanthomonas anoxopodis pv. *dieffenbachiae* (dépérissement de l'anthurium);
Xanthomonas campestris pv. *mangiferae indicae*;
Xanthomonas campestris pv. *manihotis*;
Xanthomonas campestris pv. *passiflorae* (Pflanzen und Früchte von *Passiflora* spp.);
Xanthomonas campestris pv. *pruni* (bactériose des arbres fruitiers à noyaux);
Xanthomonas campestris pv. *vasculorum*;
Xylella fastidiosa;

c) Pilze:

Botryodiplodia sp.;
Botrysphaeria sp.;
Catacauma torendiella;
Ceratostomella paradoxa;
Colletotrichum coffeanum var. *virulans*;
Crinipellis perniciosus;
Deuterophoma tracheiphila;
Diplodia natalensis (chancre de l'avocatier);
Eutypa armeniaca et *Eutypa lata* (eutypiose de la vigne, de l'abricotier, du cassis);
Fusarium moniliforme var. *subglutinans*;
Fusarium oxysporum f. sp. *cubense* Rasse IV;

Fusarium oxysporum f. sp. *gladioli*;
Fusarium oxysporum f. sp. *melonis*;
Gibberella xylarioïdes;
Hemileia vastratix;
Moniliophthora roreri;
Mycosphaerella musicola oder *Cercospora musae*;
Pachymetra chaunorhiza;
Peronosclerospora sacchari (oder *Sclerophthora sacchari*);
Phomopsis artocarpj;
Pseudocercospora purpurea (cercosporiose de l'avocatier);
Pyricularia oryzae;
Sclerophthora macrospora (charbon vêté de la canne à sucre covered smut);
Sphaceloma perseae;
Trachyphaera fructigena (maladie du bout de cigare du bananier);
Uromyces transversalis;
Ustilago scitaminea (charbon de la canne à sucre);

d) Phanerogame:

Alternanthera phylloxeroïdes (amaranthacées);
Borreria alata;
Cassia tora;
Commelina bengalensis;
Cuscuta spp.;
Cyperus spp.;
Elodea spp.;
Prosopis glandulosa;
Salvinia molesta;
Senna tora;
Sorghum halepense;
Spermacoce alata;
Striga spp.);
Xanthium spp.;

e) Viren, Mykoplasmen, Viroide:

Avocado sun blotch viroïd;

Badnavirus (igname);
 Bamboo mosaic virus (Bambusa spp.);
 Banana mosaic virus (Cucumber Mosaic virus);
 Bean common mosaic virus;
 Cacao swollen shoot virus;
 Cacao yellow mosaic virus;
 Cassava african mosaic virus;
 Cassava brown streak virus;
 Cassava common mosaic virus;
 Citrus tristeza closterovirus (Tristeza);
 Coconut foliar decay virus (dépérissement foliaire du cocotier);
 Coffea ring spot virus;
 Cucumber green mottle virus;
 Cucumber mosaic virus;
 Cymbidium mosaic virus;
 Dasheen badnavirus (Xanthosoma, Alocasia und Colocasia);
 Dasheen mosaic virus;
 Dioscorea (= Yam) Green Banding virus;
 Exocortis (exocortis des agrumes);
 Ficus mosaic virus;
 Frangipani mosaic virus (Plumeria sp.);
 Hibiscus chlorotic ringspot virus (Hibiscus, Rosa sinensis);
 Hibiscus latent ringspot virus (Hibiscus, Rosa sinensis);
 Impatiens necrotic spot virus (virus nécrotique de l'impatiens);
 Lettuce mosaic virus;
 Maize Streak virus;
 Mancha annular;
 Mycoplasme du Grassy Shoot;
 Mycoplasme du jaunissement mortel (oder Letal Yellowing Kaincope-Krankheit oder cap Saint-Paul-Krankheit);
 Mycoplasme du White Leaf;
 Odontoglossum ring spot virus;
 Pangola stunt virus (Digitaria decumbens);

Papaya Bunchy top mycoplasma;
 Papaya distortion ring spot virus;
 Papaya mosaic virus;
 Papaya ring spot virus = (Watermelon mosaic I) Souche I;
 Passiflora mosaic virus (Passiflora spp.);
 Passion fruit ring Spot virus;
 Passion fruit woodiness virus;
 Passionfruit mosaic virus (Passiflora spp.);
 Peanut clump virus;
 Pepper mild mottle virus (Capsicum sp. und andere Solanaceae);
 Phytophthora sp.;
 Pineapple chlorotic streak virus (ananas);
 Pineapple wilt virus (maladie du flétrissement sur ananas);
 Potato yellow mosaic virus (Virus, das von Bemisia tabaci auf Solanaceae übertragen wird);
 Squash mosaic virus (Cucurbitaceae);
 Stries chlorotiques;
 Sugar cane Streak virus;
 Sweet potato feathery mottle virus;
 Sweet potato mild mottle virus (rabougrissement modéré de la patate douce);
 Sweet potato vein Mosaic virus;
 Sweet potato yellow dwarf virus;
 Tobacco etch virus (Capsicum, Lycopersicon und Nicotiana);
 Tobacco leaf curl virus (Lycopersicon et Nicotiana);
 Tobacco streak virus;
 Tomato bunchy top virus;
 Tomato bushy stunt virus (rabougrissement de la tomate);
 Tomato spotted wilt virus (maladie bronzée de la tomate);
 Tomato yellow leaf curl virus (enroulement de la tomate, papaye, tabac);
 Vanilla mosaic potyvirus (potyvirus Tahiti);
 Vanilla necrotic potyvirus (potyvirus Tonga);
 Watermelon mosaic virus II (cucurbitacées);
 Xylem necrosis viroid (Citrus spp.);
 Yam Internal Browning disease;

Yam mosaïc virus;
Yam mosaic virus (mosaïque internervaire de l'igname);
Yellow leaf syndrome (*Saccharum officinarum*);
Zucchini yellow mosaic virus (*Cucurbitaceae*).

2. Département Guyana

- i) Die in den Anhängen I und II der Verordnung vom 24. Mai 2006 genannten Schadorganismen, die nicht in Anhang A Kapitel II Punkt 2 dieser Verordnung genannt sind;
- ii) Folgende Schadorganismen:
 - a) Tierische Organismen:
 - Acrolepiopsis assectella*;
 - Agromyza oryzae*;
 - Aleurocanthus woglumi*;
 - Anastrepha grandis*;
 - Aphelenchoïdes besseyi*;
 - Bactrocera carambolae* (außer *Dacus dorsalis*) (mouche de la carambole);
 - Bemisia tabaci*;
 - Cyclas formicarius*;
 - Delia antiqua*;
 - Ditylenchus angustus*;
 - Heterodera schachtii*;
 - Hypothenemus hampei*;
 - Idiocerus clypealis*;
 - Iridomyrmex humilis*;
 - Leptinotera decemlineata*;
 - Macronellicoccus hirsutus*;
 - Meloïdogyne oryzae*;
 - Perkinsiella saccharicida*;
 - Plutella xylostella*;
 - Radopholus similis*;
 - Rattus norvegicus*;
 - Rattus rattus*;
 - Rhadinaphelenchus cocophilus*;
 - Scutellonema bradys* (nématode de l'igname);

- Sogatella furcifera;
- Sternochetus mangifera (charançon du noyau de la mangue);
- Sternocnetus frigidus;
- Toxoptera aurantii;
- Viteus vitifolii;
- b) Bakterien:
 - Agrobacterium tumefaciens;
 - Curtobacterium (Corynebacterium) flaccumfasciens;
 - Greening (bactérie limitée au phloème);
 - Pseudomonas gladioli pv. alliicola;
 - Pseudomonas gladioli pv. gladioli;
 - Pseudomonas syringae pv. lachrymans;
 - Pseudomonas syringae pv. mors-prunorum;
 - Pseudomonas syringae pv. Tabaci;
- c) Kryptogames:
 - Botryodiplodia sp.;
 - Colletotrichum coffeanum var. virulans;
 - Crinipellis perniciosus;
 - Fusarium moniliforme var. subglutinans;
 - Fusarium oxysporum f. sp. cubense;
 - Fusarium oxysporum F. sp. melonis;
 - Gibberella xylarioïdes;
 - Hemileia vastratix;
 - Moniliophthora rorari;
 - Pachymetra chaunorhiza;
 - Peronosclerospora sacchari (oder Sclerophthora sacchari);
 - Phomopsis artocarpj;
 - Pyricularia oryzae;
 - Sphaceloma perseae;
 - Uromyces transversalis;
- d) Viren, Mykoplasme und ähnliche:
 - Avocado Sun blotch viroïd;
 - Banana Bunchy Top virus;

Banana Mosaic virus (Cucumber mosaic virus);
Banana streak virus;
Bean common mosaic virus;
Bract Mosaic Disease;
Cacao swollen shoot virus;
Cacao yellow mosaic virus;
Cassava african mosaic virus;
Cassava brown streak virus;
Cassava common mosaic virus;
Citrus Tristeza Virus;
Coffea ring spot virus;
Cucumber green mottle virus;
Cucumber mosaic virus;
Cymbidium mosaic virus;
Dasheen mosaic virus;
Dioscorea (= Yam) Green Banding virus;
Elephantiasis;
Ficus mosaic virus;
Lettuce mosaic virus;
Maize Streak virus;
Mancha annular;
Mycoplasma du Grassy Shoot;
Odontoglossum ring spot virus;
Papaya ring spot virus = (Watermelon mosaic I) Souche I;
Passion Fruit ring Spot virus;
Passion Fruit Woodiness virus;
Peanut clump virus;
Phytomonas sp.;
Stries chlorotiques;
Sugar cane Fiji virus;
Sugar cane mosaic virus;
Sugar cane streak virus;
Sweet potato feathery mottle virus;

Sweet potato vein mosaic virus;
Sweet potato yellow dwarf virus;
Tobacco ring spot virus;
Tobacco streak virus;
Tomato bunchy top virus;
Tomato (tobacco) leaf curl virus;
Yam internal browning disease;
Yam mosaic virus;

e) Phanerogame:

Alternanthera phylloxeroïdes;
Commelina bengalensis;
Cuscuta spp.;
Cyperus spp.;
Elodea spp.;
Salvinia molesta;
Senna tora;
Sorghum halepense.

3. Département La Réunion

- i) Die in den Anhängen I und II der Verordnung vom 24. Mai 2006 genannten Schadorganismen, die nicht in Anhang A Kapitel II Punkt 3 dieser Verordnung genannt sind;
- ii) Folgende Schadorganismen:
- Anacridium melanorhodon arabicum (criquet);
Aphis gossypii;
Arabis mosaic virus;
Aspidiotus destructor;
Bambusoideae;
Banana streak virus;
Bean common mosaic virus;
Bean yellow mosaic virus;
Bemisia tabaci;
Brevicoryne brassicae;
Ceratitis capitata;
Ceratosmella paradoxa;

Chaetosiphon fragaefolii;
Citrus tristeza virus;
Colletotrichum acutatum;
Cucumber mosaic virus;
Cuscuta spp.;
Cymbidium mosaic virus;
Deuterophoma tracheiphila;
Diaphorina citri (psylle des agrumes);
Dysaphis plantaginea;
Elephantiasis;
Eotetranychus carpini;
Erwinia vitivora;
Exobasidium vexans;
Frankliniella occidentalis;
Helicotylenchus sp.;
Hoplochelus marginalis (ver blanc);
Lettuce mosaic virus;
Lettuce necrotic yellow virus;
Liberobacter africanum (Citrus greening bacterium);
Liberobacter asiaticum (Citrus greening bacterium);
Ligustrum robustum var. walkeri (troène);
Locusta migratoria (criquet);
Mus musculus (souris);
Myzus persicae;
Nomadacris septemfasciata (criquet);
Odontoglossum ring spot virus;
Panonychus citri;
Panonychus ulmi;
Papaya ring spot virus;
Peronophytophthora lichi;
Peronospora tabaci;
Phorbia brunescens;
Phyllocnistis citrella;

Plutella maculipennis - Plutella xylostella;
Pseudomonas flectens;
Pycnonotus jocosus (merle de Maurice-Bulbul orphée).
Rattus norvegicus;
Rattus rattus;
Rhadopholus similis;
Rice grassy stunt virus;
Rubus alceifolius
Scirtothrips citri;
Solanum mauritianum;
Sparganothis pilleriana;
Spilonota sp.;
Spongospora subterranea;
Stephanoderes coffea;
Striga;
Thrips tabaci;
Tomato yellow leaf curl virus;
Trioza erythrae;
Trioza litsae;
Ulex europaeus;
Uromyces transversalis;
Ustilaginoïdella ædipigera;
Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae;
Xanthomonas campestris pv. pisi;
Xanthomonas fragariae.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement de la directrice générale de l'alimentation:

Le chef de service,

B. Vallat.