

PFLANZENGEUNDHEITLICHE REGELUNGEN MAROKKOS

Kurzfassung

Erstellt von der Pflanzenschutzorganisation für Europa und den Mittelmeerraum (EPPO).

Übersetzung aus dem Englischen und Fortführung, Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, Institut für nationale und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit, 23.10.2026

Für die Richtigkeit der Angaben wird keine Gewähr übernommen.

Allgemeine Anforderungen	2
KONTAKT	2
RECHTSGRUNDLAGEN	2
EINFUHRVERBOTE	2
EINLASSSTELLEN	2
DURCHFUHR	3
ZEUGNISSE	3
LISTEN DER QUARANTÄNESCHADORGANISMEN	4
SCHADORGANISMEN, DEREN EINSCHLEPPEN VERBOTEN IST	4
Pflanzen*	12
Zwiebeln und Knollen	43
Samen	44
Schnittblumen und Zweige	48
Früchte und Gemüse*	51
Holz	53
Lose Rinde	53
Verpackungsmaterial	54
Erde/Kultursubstrat	55
Vorratsprodukte	56
Sonstiges	58
Ordnungen, Familien und ihre Gattungen	59

PFLANZENGEUNDHEITLICHE REGELUNGEN MAROKKOS

Kurzfassung

Erstellt von der Pflanzenschutzorganisation für Europa und den Mittelmeerraum (EPPO).

Übersetzung aus dem Englischen, Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, Institut für nationale und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit, 23.10.2026

Für die Richtigkeit der Angaben wird keine Gewähr übernommen.

Allgemeine Anforderungen

KONTAKT

RECHTSGRUNDLAGEN

Gesetz über den Pflanzenschutz Nr. 76-17, verabschiedet am 14.07.2021

Erlass Nr. 2-22-243 vom 21. Juli 2022 zur Anwendung einzelner Bestimmungen des Gesetzes Nr. 76-17 über den Pflanzenschutz

Verordnung vom 1951-05-22 (B.O. Nr. 2016 vom 1951-06-13) über die Einfuhr von Pflanzen oder Pflanzenteilen der Unterfamilie Aurantioideae.

Verordnung Nr. 823-93 vom 1993-04-20 über die Einfuhr von Stecklingen oder Samen von Zuckerrohr nach Marokko.

Verordnung Nr. 824-93 vom 1993-06-04 über die Einfuhr von bestimmten Früchten und Zierpflanzen von Rosaceae.

Verordnung Nr. 207-05 vom 2005-11-11 über pflanzengesundheitliche Anforderungen für die Einfuhr von Pflanzenmaterial von *Vitis* (L.)

Beschluss Nr. 2-16-525 über das Einfuhrverbot für bestimmte Kunststoffhüllen und -planen

Verordnung Nr. 593-17 vom 8. August 2017 über die pflanzengesundheitliche Einfuhrkontrolle

Mitteilung vom 10.06.2020 zu Maßnahmen gegen Tomato brown rugose fruit virus

Verordnung 2279-22 zu *Xylella fastidiosa*

EINFUHRVERBOTE

Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und andere Gegenstände, die mit Quarantäneschadorganismen befallen sind (siehe Listen der Quarantäneschadorganismen) und diese Schadorganismen in isoliertem Zustand.

Jegliche Kulturen von Pilzen oder Bakterien, ausgenommen solche, die von wirtschaftlichem Nutzen sind und jegliche lebende Insekten ausgenommen Bienen und Seidenraupen

Bestimmte Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse (siehe Anforderungen für Warenarten)

EINLASSTELLEN

[593-2017]

Die Einfuhr von jeglichen geregelten Gegenständen sowie ihre Aus- oder Durchfuhr darf nur über die folgenden Grenzkontrollstellen erfolgen:

- die Häfen von Agadir, Al Hoceima, Casablanca, El-Jadida, Kenitra, Laâyoune, Dakhla, Larache, Nador, Tanger, Tanger Méditerranée und Safi;
- die Grenzstationen Beni-Ansar (Nador), F'Nideq (Tanger) und Jouj Baghal (Oujda) und Guerguarate (Aousserd);
- die Flughäfen von Agadir, Casablanca, Fes, Marrakesch, Oujda, Rabat-Salé, Tanger,

Tétouan, Al Hoceima, Nador, Ouarzazate,
Laâyoune und Dakhla.

DURCHFÜHR

Verbotene Einfuhren gemäß den
Anforderungen für Warenarten dürfen nicht in
Transit durch Marokko durchgeführt werden.

ZEUGNISSE

[2022/243]

Das Pflanzengesundheitszeugnis (PGZ) ist im
Allgemeinen für alle Pflanzen und
Pflanzenerzeugnisse (siehe Ausnahmen)
erforderlich. Es muss von der Nationalen
Pflanzenschutzorganisation des Ursprungs-
landes in Übereinstimmung mit den
entsprechenden Punkten des IPPC ausgestellt
worden sein. Das PGZ darf höchstens 14 Tage
vor dem Versand der Sendung nach einer
amtlichen phytosanitären Untersuchung im
Ausfuhrland ausgestellt worden sein, während
derer die Sendung als frei von
Quarantäneschadorganismen befunden wurde
(Siehe Listen der Quarantäneschadorganis-
men).

Das Wiederausfuhrzeugnis, ausgestellt vom
letzten Wiederausfuhrland, muss von dem
Original des PGZ oder einer beglaubigten
Kopie davon begleitet sein. Das
Wiederausfuhrzeugnis wird für Sendungen
gefordert, die aus einem anderen Land als
dem Ursprungsland ausgeführt werden.

In einigen Fällen, in den Anforderungen für
Warenarten erklärt, muss das PGZ eine
zusätzliche Erklärung (ZE) enthalten.

LISTEN DER QUARANTÄNESCHADORGANISMEN

Liste I

SCHADORGANISMEN, DEREN EINSCHLEPPEN VERBOTEN IST

[832-02]

a) Insekten

Acleris gloverana
Acleris variana
Adoxophyes orana
Agrilus anxius
Agrilus planipennis
Aleurocanthus spiniferus
Aleurocanthus woglumi
Aleurodicus dispersus
Amauromyza maculosa
Anastrepha bistrigata
Anastrepha distincta
Anastrepha fraterculus
Anastrepha ludens
Anastrepha obliqua
Anastrepha pseudoparallela
Anastrepha serpentina
Anastrepha sororcula
Anastrepha striata
Anastrepha suspensa
Anastrepha turpiniae
Anoplophora chinensis
Anoplophora glabripennis
Anoplophora malasiaca
Anthonomus bisignifer
Anthonomus eugenii
Anthonomus grandis
Anthonomus signatus
Aonidiella citrina
Aonidiella inornata
Aonidiella orientalis
Apriona cinerea
Apriona germari
Apriona rugicollis «*A. japonica* »
Archips argyrospilus
Archips rosana
Argyrotaenia amatana
Argyrotaenia citrana
Argyrotaenia kimballi

Aromia bungii
Aspidiotus excisus
Bactericera cockrelli
Bactrocera aquilonis
Bactrocera carambolae
Bactrocera caryae
Bactrocera caudata
Bactrocera correcta
Bactrocera cucumis
Bactrocera cucurbitae
Bactrocera curvipennis
Bactrocera diversa
Bactrocera dorsalis / *B. invadens* –
Bactrocera facialis
Bactrocera frauenfeldi
Bactrocera jarvisi
Bactrocera kandiensis *Bactrocera kirki*
Bactrocera latifrons
Bactrocera melanotus
Bactrocera minax
Bactrocera neohumeralis
Bactrocera occipitalis
Bactrocera papyae
Bactrocera passiflorae
Bactrocera pedestris
Bactrocera philippinensis
Bactrocera psidii
Bactrocera pyrifoliae
Bactrocera scutellata
Bactrocera tau
Bactrocera trivialis
Bactrocera tryoni
Bactrocera tsuneonis
Bactrocera xanthodes
Bactrocera zonata
Biprorulus bibax
Blitopertha orientalis
Busseola fusca
Cacyreus marshalli
Carneocephala fulgida

Carposina niponensis
Carposina sasakii
Ceratitis cosyra
Ceratitis malgassa
Ceratitis rosa
Ceratothripoides brunnens
Ceratothripoides claratris
Ceroplastes ceriferus
Ceroplastes cirripediformis
Ceroplastes floridensis
Ceroplastes grandis
Ceroplastes japonicus
Ceroplastes sinensis
Chilo suppressalis
Choristoneura conflictana
Choristoneura fumiferana
Choristoneura occidentalis
Choristoneura rosaceana
Cicadulina mbila
Citripestis sagittiferella
Conogethes punctiferalis
Conotrachelus nenuphar
Contarinia pseudotsugae
Cosmopolites sordidus
Ctenopseustis obliquana
Cydia inopinata
Cydia packardii
Cydia prunivora
Dacus ciliatus
Dacus zonatus
Dendroctonus adjunctus
Dendroctonus adjunctus
Dendroctonus brevicomis
Dendroctonus brevicomis
Dendroctonus frontalis
Dendroctonus frontalis
Dendroctonus micans
Dendroctonus ponderosae
Dendroctonus ponderosae
Dendroctonus pseudotsugae
Dendroctonus pseudotsugae
Dendroctonus rufipennis
Dendroctonus rufipennis
Deudorix socrates
Diabrotica barberi
Diabrotica speciose

Diabrotica undecimpunctata
Diabrotica virgifera
Diaphorina citri
Diatraea saccharalis)
Diocalandra frumenti Fabricius
Dirioxa pornia
Draeculacephala minerva
Drosophila immigrans
Drosophila paulistorum
Drosophila pseudoobscura
Drosophila repleta
Drosophila suzukii
Drosophila willistoni
Dryocoetes confusus
Dryocoetes confusus
Dysmicoccus neobrevipes
Dysmicoccus nesophilus
Ecdytolopha aurantianum
Egira curialis
Epitrix cucumeris
Epitrix similis
Epitrix subcrinita
Epitrix tuberis
Epochra canadensis
Eudocima fullonia
Eudocima salaminia
Euwallacea fornicatus
Euzopherodes vapidella
Frankliniella bispinosa
Frankliniella kellyae
Frankliniella occidentalis
Gnathotrichus sulcatus
Gnathotrichus sulcatus
Goniapterus gibberus
Goniapterus scutellatus
Gonodonta pyrgo
Graphocephala atropunctata
Graphognathus leucoloma
Gymnandrosoma aurantianum
Haplaxius crudus
Helicoverpa zea
Heteronychus arator
Homalodisca vitripennis
Howardia biclavata
Hyalesthes obsoletus
Ips calligraphus

Ips cembrae
Ips confusus
Ips duplicatus
Ips grandicollis
Ips lecontei
Ips pini
Ips plastographus
Ips sexdentatus
Ips typographus
Keiferia lycopersicella
Lecanoideus floccissimus
Lepidosaphes ussuriensis
Leptinotarsa decemlineata
Leucinodes africensis
Leucinodes orbonalis
Leucinodes pseudorbonalis
Leucinodes rimavallis
Liriomyza huidobrensis
Liriomyza sativae
Liriomyza trifolii
Listronotus bonariensis
Lopholeucaspis japonica
Lycorma delicatula
Lymantria mathura
Maconellicoccus hirsutus
Malacosoma americanum
Malacosoma disstria
Malacosoma parallela
Margarodes prieskaensis
Margarodes vitis
Margarodes vredendalensis
Marmara salicella
Massicus raddei
Mega platypus mutatus
Melanotus communis
Metamasius hemipterus
Monacrostichus citricola
Monacrostichus malaysiae
Monochamus spp
Myndus crudus
Naupactus leucoloma
Nemorimyza maculosa)
Neoleucinodes elegantalis
Neosilba bifida
Neosilba certa
Neosilba glaberrima

Neosilba inesperata
Neosilba laura
Neosilba parva
Neosilba pendula
Neosilba pradoi
Neosilba zadolicha
Numonia pyrivorella
Oemona hirta
Opogona sacchari
Orgyia pseudotsugata
Ostrinia furnacalis
Ostrinia nubilalis
Paracoccus marginatus
Paysandisia archon
Pentalonia nigronervosa
Perkinsiella saccharicida
Perkinsiella vastatrix
Pezothrips kellyanus
Pheletes (Limonius) californicus
Pissodes nemorensis
Pissodes piceae
Pissodes pini
Pissodes piniphilus
Pissodes strobi
Pissodes terminalis
Pissodes validrostris
Planococcus kenyae
Planococcus kraunhiae
Planococcus lilacinus
Planococcus minor
Planotortrix excessana
Platynota flavedana
Platynota stultana
Polygraphus proximus
Popillia japonica
Praelonga orthezia praelonga
Prays endocarpa
Premnotrypes spp.
Prodiplosis longifila
Proeulia auraria
Proeulia chrysopteris
Prostephanus truncatus
Pseudacysta perseae
Pseudaonidia duplex
Pseudococcus comstocki
Pseudococcus cryptus

Pseudococcus elisae
Pseudococcus jackbeardsleyi
Pseudococcusc alceolariae
Pseudopityophthorus minutissimus
Pseudopityophthorus pruinosis
Quadraspidiotus perniciosus
Raoiella indica
Rastrococcus iceryoides
Rastrococcus invadens
Rastrococcus mangiferae
Rastrococcus rubellus
Rastrococcus spinosus
Rhagoletis cerasi
Rhagoletis cingulata
Rhagoletis completa
Rhagoletis fausta
Rhagoletis indifferens
Rhagoletis mendax
Rhagoletis pomonella
Rhizoecus americanus
Rhynchophorus bilineatus
Rhynchophorus ferrugineus
Rhynchophorus palmarum
Rhynchophorus phoenicis
Rhynchophorus vulneratus
Ripersiella hibisci
Saperda candida
Scaphoideus luteolus
Scirtothrips aurantii
Scirtothrips citri
Scirtothrips dorsalis
Scirtothrips inermis
Scolytus morawitzi
Selenaspidus articulatus
Sesamia cretica
Singhiella simplex
Sirex ermak
Spodoptera eridania
Spodoptera frugiperda
Spodoptera litura
Sternochetus frigidus
Sternochetus mangiferae
Strauzia longipennis
Strobilomyia viaria
Tecia solanivora
Tegolophus australis

Tetropium gracilicorne
Thaumatotibia leucotreta
Thrips hawaiiensis
Thrips palmi
Toxoptera citricidus
Trichoferus campestris
Trioza erytrae
Trogoderma granarium
Unaspis citri
Unaspis yanonensis
Viteus vitifoliae
Xylosandrus compactus
Xylosandrus crassiusculus
Xylotrechus altaicus
Xylotrechus namanganensis

b) Milben

Aceria kuko
Aculops fuchsiae
Aculops pelekassi
Brevipalpus chilensis
Brevipalpus juncus
Cenopalpus pulcher
Eoteranychus tiliarum
Eotetranychus sexmaculatus
Eotetranychus yumensis
Epiphyas postvittana
Eutetranychus orientalis
Oligonychus perditus
Schizotetranychus hindustanicus
Tetranychus desertorum
Tetranychus evansi
Tetranychus mexicanus
Tetranychus pacificus
Tuckerella knorri
Tuckerella pavoniformis

c) Bakterien und Phytoplasmen

Acidovorax citrulli
Burkholderia caryophilli
Candidatus Liberibacter spp.
Candidatus liberibacter africanum
Candidatus liberibacter solanacearum
Candidatus liberibacter asiaticum
Candidatus phytoplasma americanum
Candidatus Phytoplasma mali

Candidatus Phytoplasma palmae
Candidatus phytoplasma phoenicium
Candidatus phytoplasma pruni
Candidatus Phytoplasma pyri
Candidatus Phytoplasma solani
Candidatus phytoplasma ulmi
Candidatus Phytoplasma vitis
Clavibacter michiganensis subsp. *insidiosus*
Clavibacter michiganensis subsp. *michiganensis*
Clavibacter michiganensis subsp. *sepedonicus*
Clavibacter xyli subsp. *xyli*
Curtobacterium flaccumfaciens pv. *flaccumfaciens*
Dickeya dianthicola
Erwinia amylovora
Erwinia chrysanthemi
Liberobacter africanum & *L. asiaticum*
Olive phytoplasma diseases
Palm lethal yellowing phytoplasma
Pantoea citrea
Pantoea stewartii
Peach rosette phytoplasma
Peach yellows phytoplasma
Phytoplasma aurantifoli
Potato stolbur phytoplasma
Pseudomonas rubrilineans
Pseudomonas rubrisubabicans
Pseudomonas syringae pv. *actinidiae*
Pseudomonas syringae pv. *persicae*
Ralstonia pseudosolanacearum
Ralstonia solanacearum
Ralstonia syzygii
Strawberry witches' broom phytoplasma
Sugarcane grassy shoot mycoplasma
Sugarcane white leaf mycoplasma
Xanthomonas albilineans
Xanthomonas arboricola pv. *corylina*
Xanthomonas arboricola pv. *Pruni*
Xanthomonas axonopodis / *X. campestris*
Xanthomonas axonopodis / *X. citri*
Xanthomonas axonopodis pv. *allii*
Xanthomonas axonopodis pv. *phaseoli*
Xanthomonas axonopodis pv. *poinsetticola*
Xanthomonas axonopodis pv. *dieffenbachiae*
Xanthomonas campestris pv. *glycines*

Xanthomonas campestris pv. *malvacearum*
Xanthomonas euvesicatoria
Xanthomonas fragariae
Xanthomonas fuscans subsp. *aurantifolii*
Xanthomonas gardneri
Xanthomonas oryzae pv. *oryzae*
Xanthomonas oryzae pv. *oryzicola*
Xanthomonas perforans
Xanthomonas populi
Xanthomonas translucens pv. *translucens*
Xanthomonas vesicatoria
Xylella fastidiosa
Xylophilus ampelinus

d) Kryptogame

Alteraria alternata pv. *citri*
Alternaria mali
Anisogramma anomala
Apiosporina morbosa
Atropellis spp.
Botryosphaeria laricina
Ceratocystis fimbriata f.sp. *platani*
Ceratocystis fagacearum
Ceratocystis paradoxa
Chrysomyxa arctostaphyli
Ciborinia camelliae
Cronartium coleosporioides
Cronartium comandrae
Cronartium comptoniae
Cronartium fusiforme
Cronartium himalayense
Cronartium kamtschaticum
Cronartium quercuum
Cryphonectria parasitica
Cytospora sacchari
Deuterophoma tracheiphila
Diaporthe citricola
Diaporthe helianthi
Diaporthe medusaea
Diaporthe vaccinii
Didymella ligulicola
Drechslera sacchari
Elsinoë australis
Endocronartium harknessii
Exobasidium vexans
Fusarium circinatum

Fusarium foetens
Fusarium oxysporum fsp. albedinis
Fusarium oxysporum fsp. cubense
Geosmithia morbida (Vektor *Pityophthorus juglandis*)
Gloeosporium citri
Gloeosporium limetticulum
Glomerella gossypii
Glomerella tucumanensis
Gremmeniella abietina
Guignardia citricarpa
Gymnosporangium asiaticum
Gymnosporangium clavipes
Gymnosporangium globosum
Gymnosporangium juniperi-virginianae
Gymnosporangium yamadae
Heterobasidion irregulare
Lecanosticta acicola
Melampsora farlowii
Melampsora medusae
Monilinia fructicola
Mycosphaerella citri
Mycosphaerella dearnessii
Mycosphaerella gibsonii
Mycosphaerella larici-leptolepidis
Mycosphaerella musicola
Mycosphaerella populorum
Mycovellosiella koepkei
Oidium tingitaninum
Ophiostoma wagneri
Peronosclerospora philippinensis
Peronosclerospora sacchari
Peronosclerospora spontanea
Phellinus weirii
Phialophora cinerescens
Phoma andina
Phoma exigua var. *foveata*
Phyllosticta citricarpa
Phyllosticta solitaria
Phymatotrichopsis omnivora
Physalospora rhodina
Phytophthora cinnamomi
Phytophthora fragariae
Phytophthora kernoviae
Phytophthora lateralis
Phytophthora palmivora

Phytophthora ramorum
Phytophthora rubi
Phytophthora boehmeriae
Plasmopara halstedii
Plenodomus cheiphilus
Puccinia hemerocallidis
Puccinia horiana
Puccinia kuchni
Puccinia kuehnii
Puccinia melanocephala
Puccinia pittieriana
Puccinia psidii
Sclerophthora macrospora
Septoria citri
Septoria lycopersici var. *malagutii*
Sirococcus tsugae
Sphaceloma arachidis
Stagonosporopsis chrysanthemi
Stenocarpella macrospora
Stenocarpella maydis
Synchytrium endobioticum
Thecaphora solani
Thekopsora minima
Tilletia indica
Ustilago scitaminea

e) Viren und Viroide

American plum line pattern virus
 Andean potato mild mosaic virus
 Andean potato mottle virus
 Apple mosaic ilar virus
 Avocado sun blotch viroid
 Banana bract mosaic virus
 Banana bunchy top luteovirus
 Bean golden mosaic virus
 Beet leaf curl virus
 Beet necrotic yellow vein virus
 Black raspberry latent ilarvirus
 Blueberry leaf mottle virus
 Blueberry scorch virus
 Cherry leaf rolls virus
 Cherry little cherry disease
 Cherry rasp leaf virus
 Chrysanthemum stem necrosis virus
 Citrus bark cracking viroid
 Citrus blight disease

Citrus leprosis virus
 Citrus mosaic badnavirus
 Citrus mosaic virus
 Citrus tatter leaf virus
 Citrus tristeza virus
 Citrus vein enation virus
 Citrus yellow mosaic virus
 Coconut cadang-cadang viroid
 Cucumber vein yellowing virus
 Cucurbit yellow stunting disorder virus
 Grapevine chrome mosaic nepovirus
 Grapevine red blotch-associated virus
 Impatiens necrotic spot tospovirus
 Lettuce infectious yellows virus
 Maize streak geminivirus
 Mosaic dwarf virus
 Peach American mosaic closterovirus
 Peach latent mosaic viroid
 Peach rosette mosaic virus
 Peach rosette mosaic virus
 Peanut stripe potyvirus
 Pepino mosaic virus (PepMV)
 Plum American line pattern ilarvirus
 Plum pox virus
 Potato aucuba mosaic virus
 Potato black ringspot virus
 Potato mop-top virus
 Potato spindle tuber viroid
 Potato virus T
 Potato yellow vein virus
 Potato yellowing virus
 Raspberry leaf curl virus
 Raspberry ringspot virus
 Rose rosette virus
 Satsuma dwarf virus
 Squash leaf curl virus
 Strawberry crinkle cytorhabdovirus
 Strawberry latent C virus
 Strawberry vein banding virus
 Sugar yellow leaf virus
 Sugarcane bacilliform virus
 Sugarcane chlorotic streak virus
 Sugarcane fidji disease virus
 Sugarcane mosaic virus
 Tea phloem necrosis virus
 Tobacco ringspot virus

Tomato brown rugose fruit virus
 Tomato chlorosis virus
 Tomato infectious chlorosis virus
 Tomato leaf curl New Delhi virus
 Tomato mottle virus
 Tomato necrotic spot tospovirus
 Tomato ringspot virus
 Tomato spotted wilt virus
 Tomato yellow leaf curl virus and related viruses
 Virus andin latent de la pomme de terre
 Water melon silver mottle virus

f) Nematoden

Aphelenchoides besseyi
Aphelenchoides fragariae
Bursaphelenchus xylophilus (Vektor
Monochamus spp.)
Ditylenchus destructor
Ditylenchus dipsaci
Globodera pallida
Globodera rostochiensis
Heterodera elachista
Heterodera glycines
Meloidogyne chitwoodi
Meloidogyne enterolobii
Meloidogyne ethiopica / *Meloidogyne luci*
Meloidogyne fallax
Meloidogyne graminicola
Meloidogyne mali
Nacobbus aberrans
Pratylenchus coffeae
Radopholus citrophilus
Radopholus similis
Xiphinema americanum sensu stricto
Xiphinema bricolense
Xiphinema californicum
Xiphinema rivesi

g) Invasive und parasitäre Pflanzen

Acer rufinerve
Alternanthera philoxeroides
Amaranthus palmeri
Baccharis halimifolia
Baccharis spicata
Bidens subalternans

Broussonetia papyrifera
Cardiospermum grandiflorum
Cenchrus longispinus
Crassula helmsii
Eichhornia crassipes
Galenia pubescens
Gymnocoronis spilanthoides
Heracleum persicum
Heracleum sosnowskyi
Hydrocotyle ranunculoides
Impatiens edgeworthii
Ludwigia grandiflora
Ludwigia peploides
Microstegium vimineum
Miscanthus sinensis
Myriophyllum heterophyllum
Parthenium hysterophorus
Pistia spp.
Polygonum perfoliatum
Pueraria montana
Salvinia molesta
Typha australis
Arceuthobium spp.

Pflanzen*

Hinweise

* Beachten Sie, dass der hier benutzte Terminus "Pflanzen" als Abkürzung für "Pflanzen zum Anpflanzen (einschließlich Pflanzenteile zur Vermehrung wie Stecklinge und Gewebekulturen), außer Samen, Zwiebeln und Knollen sowie Pollen" zu verstehen ist.

Die genannten Anforderungen berücksichtigen keine taxonomischen oder anderen Hierarchien.

Jede Warengruppe beginnt ggf. mit der Auflistung der Anforderungen für alle Arten.

Anforderungen für über- oder untergeordnete Taxa sind getrennt zu suchen.

Alle Arten

Alle Pflanzen	Einfuhrgenehmigung [76-17] PGZ und ggf. Weiterversendungszeugnis [593-2017]
Obstgehölze	Frei von <i>Agrobacterium tumefaciens</i>
Tropische fruchttragende Pflanzen [2010]	Frei von Früchten
Pflanzen mit anhaftender Erde	Frei von Schadorganismen
Pflanzen in bezug auf <i>Xylella fastidiosa</i> [2022/2079]	Ursprungszeugnis
– Wirtspflanzen aus Befallsländern	Einfuhrverbot
– Wirtspflanzen aus befallsfreien Ländern	Vorherige Sendung einer Mitteilung, dass das Land frei von <i>Xylella fastidiosa</i> ist. Vorherige Sendung einer Liste der registrierten und kontrollierten Produktionsstätten durch die NPPO. Pflanzengesundheitszeugnis mit zusätzlichen Erklärungen: – Das Land XYZ (Ursprungsland der Pflanzen) ist frei von dem Bakterium <i>Xylella fastidiosa</i>. – Die Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse in der Sendung wurden in einem von der NPPO registrierten und kontrollierten Pflanzenbetrieb erzeugt.
– Obstpflanzen mit Ursprung in einem Befallsland	a) Ursprung in einem befallsfreien Gebiet gemäß ISPM Nr. 4 und vorherige Sendung der Liste dieser Gebiete durch die NPPO an ONSSA.

- b) Ursprung in einem registrierten und kontrollierten Pflanzenbetrieb und vorherige Sendung einer Liste dieser Betriebe durch die NPPO an ONSSA.

Pflanzengesundheitszeugnis mit zusätzlichen Erklärungen: dass die Pflanzen in der Sendung:

- in einer Produktionsstätte erzeugt wurden, die in der unter obigem Buchstaben b genannten Liste genannt ist und in Bereichen liegt, die gemäß obigem Absatz 2 festgelegt wurden; die Bezeichnung und der Standort der Produktionsstätte sind anzugeben;
- vor dem Versand nach Marokko mit einem Breitband-Pflanzenschutzmittel behandelt wurden und vor jeglicher Kontamination durch das Bakterium *Xylella fastidiosa* geschützt wurden;
- sind frei von dem Bakterium *Xylella fastidiosa* gemäß Tests in einem von der zuständigen Stelle des Ursprungslandes anerkannten Labor an einer von dieser Stelle genommenen Probe, wenn die zum Anpflanzen bestimmten Obstpflanzen Wirt des besagten Bakteriums sind.

Analysenbericht, der von einem von der zuständigen Behörde des Ursprungslandes anerkannten Labor erstellt wurde und bescheinigt, dass die Pflanzen frei von *Xylella fastidiosa* sind

Arundo donax

Alle Pflanzen	[2010]	Einfuhrverbot
---------------	--------	---------------

Cannabis sativa

Alle Pflanzen	[2010]	Einfuhrverbot
---------------	--------	---------------

Capsicum annum [10.06.2020]

- 1) Pflanzgut mit Ursprung in Ländern, die frei von Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) sind
- Ursprungszeugnis
 - Pflanzengesundheitszeugnis mit zusätzlicher Erklärung „Das Land ist frei von dem Virus ToBRFV.“
 - Vorlage eines Laborberichts, in dem festgestellt wird, dass das Pflanzenmaterial frei von ToBRFV ist.
 - Einfuhrkontrolle auf ToBRFV

Pflanzen

2) Pflanzgut mit Ursprung in Ländern, in denen ToBRFV vorkommt

- Das Gebiet der Erzeugung ist frei von ToBRFV.
- Pflanzengesundheitszeugnis mit zusätzlichen Erklärungen:
 - Das Gebiet der Erzeugung des Pflanzguts ist frei von dem Virus *ToBRFV* gemäß den Internationalen Standards für pflanzengesundheitliche Maßnahmen.
 - Das Pflanzgut stammt von Samen, die unter Verwendung einer geeigneten Methode in einem amtlichen Test an einer repräsentativen Probe für frei von dem Virus *ToBRFV* befunden wurden.
 - Laborbericht eines von der zuständigen Stelle des Ursprungslandes anerkannten Laboratoriums.
- Im Pflanzengesundheitszeugnis unter Ursprungsort: Namen des Landes und des Gebietes.
- Einfuhrkontrolle auf ToBRFV.

Chaenomeles

Alle Pflanzen	[824-93]	Einfuhrverbot
---------------	----------	---------------

Citrofortunella

Alle Pflanzen	[1951]	Einfuhrverbot
---------------	--------	---------------

Citroncirus

Alle Pflanzen	[1951]	Einfuhrverbot
---------------	--------	---------------

Citrus

Alle Pflanzen	[1951]	Einfuhrverbot
---------------	--------	---------------

Cotoneaster

Alle Pflanzen	[824-93]	Einfuhrverbot
---------------	----------	---------------

Crataegus

Alle Pflanzen	[824-93]	Einfuhrverbot
---------------	----------	---------------

***Cydonia* [824-93]**

Alle Pflanzen		Einfuhrgenehmigung
		"Befallsfreies Gebiet" für <i>Erwinia amylovora</i>
		In Vegetationsruhe und höchstens ein Jahr nach dem Pfropfen
		ZE mit Angabe des Pfropfdatums
		"Befallsfreier Umkreis" (250 m von der Anbaufläche, aufgrund mindestens 2 Inspektionen im Juli/August und im

	September/Oktober) für <i>Erwinia amylovora</i> (oder entsprechenden Zeiträumen in der südlichen Hemisphäre)
	Orte der Erzeugung innerhalb eines Umkreises von 1 km von der Anbaufläche frei (aufgrund von Stichprobenerhebung zwischen Juni und Oktober) von <i>Erwinia amylovora</i> (oder in einem entsprechenden Zeitraum in der südlichen Hemisphäre)
	"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Pear decline phytoplasma
	Praktisch frei (letzte Vegetationsperiode) von Viren und virusähnlichen Organismen
Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen <i>Monilinia fructicola</i> auftritt	"Befallsfreies Gebiet" für <i>Monilinia fructicola</i>
	"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte Vegetationsperiode) für <i>Monilinia fructicola</i>
Pflanzen mit Ursprung in Ländern der nördlichen Hemisphäre, eingeführt zwischen dem 15. Februar und dem 1. November	Einfuhrverbot
Pflanzen mit Ursprung in Ländern der südlichen Hemisphäre, eingeführt zwischen dem 15. Oktober und dem 1. Mai	Einfuhrverbot
<i>Eriobotrya</i>	
Alle Pflanzen [824-93]	Einfuhrverbot
<i>Eucalyptus</i>	
Alle Pflanzen [2662-63]	Einfuhrverbot
<i>Fortunella</i>	
Alle Pflanzen [1951]	Einfuhrverbot
<i>Fragaria</i> [824-93]	
Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen <i>Phytophthora fragariae</i> auftritt	"Befallsfreie Fläche" (letzte Vegetationsperiode) für <i>Phytophthora fragariae</i>
Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Arabis mosaic nepovirus auftritt	"Befallsfreie Fläche" (letzte Vegetationsperiode) für Arabis mosaic nepovirus

Pflanzen

Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Strawberry latent ringspot nepovirus auftritt	"Befallsfreie Fläche" (letzte Vegetationsperiode) für Strawberry latent ringspot nepovirus
Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Tomato black ring nepovirus auftritt	"Befallsfreier Ort der Erzeugung" (letzte Vegetationsperiode) für Tomato black ring nepovirus
Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Raspberry ringspot nepovirus auftritt	"Befallsfreie Fläche" (letzte Vegetationsperiode) für Raspberry ringspot nepovirus
Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen <i>Aphelenchoides besseyi</i> auftritt	
A. Pflanzen in Gewebekultur	Abstammung von Material, das die Anforderung unmittelbare Umgebung frei von (letzte Vegetationsperiode) <i>Aphelenchoides besseyi</i> und frei (aufgrund von Tests) von <i>Aphelenchoides besseyi</i> erfüllt
B. Pflanzen nicht in Gewebekultur	"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte Vegetationsperiode) für <i>Aphelenchoides besseyi</i> Frei (aufgrund von Tests) von <i>Aphelenchoides besseyi</i>
Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen <i>Aphelenchoides fragariae</i> auftritt	
A. Pflanzen in Gewebekultur	Abstammung von Material, das die Anforderung unmittelbare Umgebung frei von (letzte Vegetationsperiode) <i>Aphelenchoides fragariae</i> und frei (aufgrund von Tests) von <i>Aphelenchoides fragariae</i> erfüllt
B. Pflanzen nicht in Gewebekultur	"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte Vegetationsperiode) für <i>Aphelenchoides fragariae</i> Frei (aufgrund von Tests) von <i>Aphelenchoides fragariae</i>
Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen <i>Xanthomonas fragariae</i> auftritt	
A. aus Samen angezogen	"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte Vegetationsperiode) für <i>Xanthomonas fragariae</i>
B. nicht aus Samen angezogen	"Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für <i>Xanthomonas fragariae</i> oder "Abstammung von getestetem Material" (letzte 3

	Vegetationsperioden) für <i>Xanthomonas fragariae</i>
	"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte Vegetationsperiode) für <i>Xanthomonas fragariae</i>
Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Strawberry crinkle cytorhabdovirus auftritt	
A. aus Samen angezogen	"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte Vegetationsperiode) für Strawberry crinkle virus
B. nicht aus Samen angezogen	"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte Vegetationsperiode) für Strawberry crinkle virus
	"Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für Strawberry crinkle rhabdovirus
	oder
	"Abstammung von getestetem Material" (letzte 3 Vegetationsperioden) auf Strawberry crinkle rhabdovirus
Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Strawberry latent C (?) rhabdovirus auftritt	
A. aus Samen angezogen	"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte Vegetationsperiode) für Strawberry latent C rhabdovirus
B. nicht aus Samen angezogen	"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte Vegetationsperiode) für Strawberry latent C rhabdovirus
	"Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für Strawberry latent C rhabdovirus
	oder
	"Abstammung von getestetem Material" (letzte 3 Vegetationsperioden) auf Strawberry latent C rhabdovirus
Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Strawberry vein-banding caulimovirus auftritt	
A. aus Samen angezogen	"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte Vegetationsperiode) für Strawberry vein-banding caulimovirus
B. nicht aus Samen angezogen	"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte Vegetationsperiode) für Strawberry vein-banding caulimovirus

	"Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für Strawberry vein-banding caulimovirus oder "Abstammung von getestetem Material" (letzte 3 Vegetationsperioden) auf Strawberry vein-banding caulimovirus
Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Strawberry witches' broom phytoplasma auftritt	
A. aus Samen angezogen	"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte Vegetationsperiode) für Strawberry witches' broom phytoplasma
B. nicht aus Samen angezogen	"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte Vegetationsperiode) für Strawberry witches' broom phytoplasma "Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für Strawberry witches' broom phytoplasma oder "Abstammung von getestetem Material" (letzte 3 Vegetationsperioden) auf Strawberry witches' broom phytoplasma
Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Strawberry mild yellow edge disease auftritt	
A. aus Samen angezogen	"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte Vegetationsperiode) für Strawberry mild yellow edge disease
B. nicht aus Samen angezogen	"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte Vegetationsperiode) für Strawberry mild yellow edge disease "Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für Strawberry mild yellow edge disease oder "Abstammung von getestetem Material" (letzte 3 Vegetationsperioden) auf Strawberry mild yellow edge disease
Malus [824-93]	
Pflanzen der Sorten Idared, Red Jade, Van Eseltine	Einfuhrverbot

Alle Pflanzen	Einfuhrgenehmigung "Befallsfreies Gebiet" für <i>Erwinia amylovora</i> In Vegetationsruhe und höchstens ein Jahr nach dem Pfropfen ZE mit Angabe des Pfropfdatums "Befallsfreier Umkreis" (250 m von der Anbaufläche, durch mindestens 2 Inspektionen im Juli/August und im September/Okttober) für <i>Erwinia amylovora</i> (oder entsprechenden Zeiträumen in der südlichen Hemisphäre) Orte der Erzeugung innerhalb eines Umkreis von 1 km von der Anbaufläche frei (aufgrund von Stichprobenerhebung zwischen Juni und Oktober) von <i>Erwinia amylovora</i> (oder in einem entsprechenden Zeitraum in der südlichen Hemisphäre) Praktisch frei (letzte Vegetationsperiode) von Viren und virusähnlichen Organismen
Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen <i>Phyllosticta solitaria</i> auftritt	"Befallsfreier Ort der Erzeugung" (letzte Vegetationsperiode) für <i>Phyllosticta solitaria</i>
Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Cherry rasp leaf nepovirus auftritt	"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Cherry raspleaf nepovirus "Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für Cherry raspleaf nepovirus oder "Abstammung von getestetem Material" (letzte 3 Vegetationsperioden) auf Cherry raspleaf nepovirus
Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Tomato ringspot nepovirus auftritt	"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) Tomato ringspot nepovirus "Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für Tomato ringspot nepovirus oder "Abstammung von getestetem Material" (letzte 3 Vegetationsperioden) auf Tomato ringspot nepovirus
Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen	"Befallsfreies Gebiet" für <i>Monilinia fructicola</i>

Pflanzen

Monilinia fructicola auftritt

"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte Vegetationsperiode) für *Monilinia fructicola*

Pflanzen mit Ursprung in Ländern der nördlichen Hemisphäre, eingeführt zwischen dem 15. Februar und dem 1. November

Einfuhrverbot

Pflanzen mit Ursprung in Ländern der südlichen Hemisphäre, eingeführt zwischen dem 15. Oktober und dem 1. Mai

Einfuhrverbot

Malus domestica

Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Apple proliferation phytoplasma auftritt

A. in Gewebekultur

"Befallsfreies Gebiet" für Apple proliferation phytoplasma

oder

"Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für Apple proliferation phytoplasma

oder

"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Apple proliferation phytoplasma

B. nicht in Gewebekultur

"Befallsfreies Gebiet" für Apple proliferation phytoplasma

oder

"Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für Apple proliferation phytoplasma

oder

"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Apple proliferation phytoplasma

"Abstammung von getestetem Material" (letzte 6 Vegetationsperioden) auf Apple proliferation phytoplasma

Pflanzen der Sorten Idared, Red Jade oder Van Eseltine

Einfuhrverbot

Obstbäume

Obstbäume

Frei von *Agrobacterium tumefaciens*

Panicum

Alle Pflanzen	[2010]	Einfuhrverbot
---------------	--------	---------------

Poncirus

Alle Pflanzen	[1951]	Einfuhrverbot
---------------	--------	---------------

Prunus [824-93]

Alle Pflanzen		Einfuhrgenehmigung
---------------	--	--------------------

Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Cherry rasp leaf nepovirus auftritt	"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Cherry rasp leaf nepovirus "Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für Cherry rasp leaf nepovirus oder "Abstammung von getestetem Material" (letzte 3 Vegetationsperioden) auf Cherry rasp leaf nepovirus
--	--

Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Tomato ringspot nepovirus auftritt	"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) Tomato ringspot nepovirus "Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für Tomato ringspot nepovirus oder "Abstammung von getestetem Material" (letzte 3 Vegetationsperioden) auf Tomato ringspot nepovirus
---	---

Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Peach rosette phytoplasma auftritt	"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Peach rosette phytoplasma "Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für Peach rosette phytoplasma oder "Abstammung von getestetem Material" (letzte 3 Vegetationsperioden) auf Peach rosette phytoplasma
---	---

Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Peach yellows phytoplasma auftritt	"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Peach yellows phytoplasma "Abstammung aus einem Zertifizierungssystem"
---	--

Pflanzen

	für Peach yellows phytoplasma oder "Abstammung von getestetem Material" (letzte 3 Vegetationsperioden) auf Peach yellows phytoplasma
Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Plum American line pattern ilarvirus auftritt	"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum American line pattern ilarvirus "Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für Plum American line pattern ilarvirus oder "Abstammung von getestetem Material" (letzte 3 Vegetationsperioden) auf Plum American line pattern ilarvirus
Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Peach X disease phytoplasma auftritt	"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Peach X disease phytoplasma "Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für Peach X disease phytoplasma oder "Abstammung von getestetem Material" (letzte 3 Vegetationsperioden) auf Peach X disease phytoplasma
Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> auftritt	"Befallsfreier Ort der Erzeugung" (letzte Vegetationsperiode) für <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i>
Erde, Torf, Kompost oder Tierdung	"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Cherry little cherry (?) virus "Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für Cherry little cherry (?) virus oder "Abstammung von getestetem Material" (letzte 3 Vegetationsperioden) auf Cherry little cherry (?) virus
Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Peach American mosaic virus auftritt	"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Peach American mosaic closterovirus

Pflanzen

	"Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für Peach American mosaic closterovirus oder "Abstammung von getestetem Material" (letzte 3 Vegetationsperioden) auf Peach American mosaic closterovirus
Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen <i>Monilinia fructicola</i> auftritt	"Befallsfreies Gebiet" für <i>Monilinia fructicola</i> "Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte Vegetationsperiode) für <i>Monilinia fructicola</i>
Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Apricot chlorotic leaf roll phytoplasma auftritt	"Befallsfreier Ort der Erzeugung" (letzte Vegetationsperiode) für Apricot chlorotic leafroll phytoplasma
<i>Prunus armeniaca</i>	
Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Plum pox potyvirus auftritt	
A. aus Samen angezogen	"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet
B. nicht aus Samen angezogen	"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet "Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für Plum pox potyvirus oder "Abstammung von getestetem Material" für Plum pox potyvirus
<i>Prunus avium</i>	
Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Cherry necrotic rusty mottle disease auftritt	"Befallsfreier Ort der Erzeugung" (letzte Vegetationsperiode) für Cherry necrotic rusty mottle disease

Prunus blireiana

Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Plum pox potyvirus auftritt

A. aus Samen angezogen

"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus

Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet

B. nicht aus Samen angezogen

"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus

Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet

"Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für Plum pox potyvirus oder

"Abstammung von getestetem Material" für Plum pox potyvirus

Prunus brigantina

Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Plum pox potyvirus auftritt

A. aus Samen angezogen

"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus

Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet

B. nicht aus Samen angezogen

"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus

Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet

"Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für Plum pox potyvirus

oder

"Abstammung von getestetem Material" für Plum pox potyvirus

Prunus cerasifera

Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Plum pox potyvirus auftritt

A. aus Samen angezogen

"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus

Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet

B. nicht aus Samen angezogen

"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus

Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet

"Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für Plum pox potyvirus

oder

"Abstammung von getestetem Material" für Plum pox potyvirus

Prunus cistena

Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Plum pox potyvirus auftritt

A. aus Samen angezogen

"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus

Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet

B. nicht aus Samen angezogen

"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus

Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet

"Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für Plum pox potyvirus

oder

"Abstammung von getestetem Material" für Plum pox potyvirus

Prunus curdica

Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Plum pox potyvirus auftritt

A. aus Samen angezogen

"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus

Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet

B. nicht aus Samen angezogen

"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus

Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet

"Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für Plum pox potyvirus

oder

"Abstammung von getestetem Material" für Plum pox potyvirus

Prunus domestica

Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Plum pox potyvirus auftritt

A. aus Samen angezogen

"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus

Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet

B. nicht aus Samen angezogen

"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus

Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet

"Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für Plum pox potyvirus

oder

"Abstammung von getestetem Material" für Plum pox potyvirus

Prunus domestica subsp. insititia

Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Plum pox potyvirus auftritt

A. aus Samen angezogen

"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus

Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet

B. nicht aus Samen angezogen

"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus

Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet

"Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für Plum pox potyvirus

oder

"Abstammung von getestetem Material" für Plum pox potyvirus

Prunus domestica subsp. italica

Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Plum pox potyvirus auftritt

A. aus Samen angezogen

"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus

Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet

B. nicht aus Samen angezogen

"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus

Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet

"Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für Plum pox potyvirus

oder

"Abstammung von getestetem Material" für Plum pox potyvirus

Prunus dulcis

Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Plum pox potyvirus auftritt

A. aus Samen angezogen

"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus

Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet

B. nicht aus Samen angezogen

"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus

Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet

"Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für Plum pox potyvirus

oder

"Abstammung von getestetem Material" für Plum pox potyvirus

Prunus glandulosa

Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Plum pox potyvirus auftritt

A. aus Samen angezogen

"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus

Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet

B. nicht aus Samen angezogen

"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus

Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet

"Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für Plum pox potyvirus

oder

"Abstammung von getestetem Material" für Plum pox potyvirus

Prunus holosericea

Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Plum pox potyvirus auftritt

A. aus Samen angezogen

"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus

Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet

B. nicht aus Samen angezogen

"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus

Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet

"Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für Plum pox potyvirus

oder

"Abstammung von getestetem Material" für Plum pox potyvirus

Prunus hortulana

Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Plum pox potyvirus auftritt

A. aus Samen angezogen

"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus

Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet

B. nicht aus Samen angezogen

"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus

Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet

"Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für Plum pox potyvirus

oder

"Abstammung von getestetem Material" für Plum pox potyvirus

Prunus japonica

Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Plum pox potyvirus auftritt

A. aus Samen angezogen

"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus

Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet

B. nicht aus Samen angezogen

"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus

Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet

"Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für Plum pox potyvirus

oder

"Abstammung von getestetem Material" für Plum pox potyvirus

Prunus mandshurica

Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Plum pox potyvirus auftritt

A. aus Samen angezogen

"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus

Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet

B. nicht aus Samen angezogen

"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus

Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet

"Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für Plum pox potyvirus

oder

"Abstammung von getestetem Material" für Plum pox potyvirus

Prunus maritima

Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Plum pox potyvirus auftritt

A. aus Samen angezogen

"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus

Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet

B. nicht aus Samen angezogen

"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus

Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet

"Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für Plum pox potyvirus

oder

"Abstammung von getestetem Material" für Plum pox potyvirus

Prunus mume

Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Plum pox potyvirus auftritt

A. aus Samen angezogen

"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus

Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet

B. nicht aus Samen angezogen

"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus

Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet

"Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für Plum pox potyvirus

oder

"Abstammung von getestetem Material" für Plum pox potyvirus

Prunus nigra

Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Plum pox potyvirus auftritt

A. aus Samen angezogen

"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus

Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet

B. nicht aus Samen angezogen

"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus

Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet

"Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für Plum pox potyvirus

oder

"Abstammung von getestetem Material" für Plum pox potyvirus

Prunus persica

Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Plum pox potyvirus auftritt

A. aus Samen angezogen

"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus

Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet

B. nicht aus Samen angezogen

"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus

Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet

"Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für Plum pox potyvirus

oder

"Abstammung von getestetem Material" für Plum pox potyvirus

Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen

"Befallsfreies Gebiet" für Pseudomonas syringae

Pflanzen

Pseudomonas syringae pv. persicae auftritt	pv. persicae oder "Befallsfreier Ort der Erzeugung" (letzte Vegetationsperiode) für Pseudomonas syringae pv. persicae
<i>Prunus salicina</i>	
Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Plum pox potyvirus auftritt	
A. aus Samen angezogen	"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet
B. nicht aus Samen angezogen	"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet "Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für Plum pox potyvirus oder "Abstammung von getestetem Material" für Plum pox potyvirus
<i>Prunus sibirica</i>	
Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Plum pox potyvirus auftritt	
A. aus Samen angezogen	"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet
B. nicht aus Samen angezogen	"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet

	"Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für Plum pox potyvirus oder "Abstammung von getestetem Material" für Plum pox potyvirus
<i>Prunus simonii</i>	
Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Plum pox potyvirus auftritt	
A. aus Samen angezogen	"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet
B. nicht aus Samen angezogen	"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet "Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für Plum pox potyvirus oder "Abstammung von getestetem Material" für Plum pox potyvirus
<i>Prunus spinosa</i>	
Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Plum pox potyvirus auftritt	
A. aus Samen angezogen	"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet
B. nicht aus Samen angezogen	"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet

	"Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für Plum pox potyvirus oder "Abstammung von getestetem Material" für Plum pox potyvirus
<i>Prunus tomentosa</i>	
Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Plum pox potyvirus auftritt	
A. aus Samen angezogen	"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet
B. nicht aus Samen angezogen	"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet "Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für Plum pox potyvirus oder "Abstammung von getestetem Material" für Plum pox potyvirus
<i>Prunus triloba</i>	
Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Plum pox potyvirus auftritt	
A. aus Samen angezogen	"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet
B. nicht aus Samen angezogen	"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Plum pox potyvirus Pflanzen am Ort der Erzeugung mit Anzeichen von anderen Viren oder virusähnlichen Krankheiten vernichtet

	"Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für Plum pox potyvirus oder "Abstammung von getestetem Material" für Plum pox potyvirus
<i>Pyracantha</i>	
Alle Pflanzen [2010]	Einfuhrverbot [824-93]
<i>Pyrus</i> [824-93]	
Pflanzen der Sorten Alexandrine Douillard, Durondeau, Passe-Crassane	Einfuhrverbot
Alle Pflanzen	Einfuhrgenehmigung "Befallsfreies Gebiet" für <i>Erwinia amylovora</i> In Vegetationsruhe und höchstens ein Jahr nach dem Pfropfen ZE mit Angabe des Pfropfdatums "Befallsfreier Umkreis" (250 m von der Anbaufläche, durch mindestens 2 Inspektionen im Juli/August und im September/Okttober) für <i>Erwinia amylovora</i> (oder entsprechenden Zeiträumen in der südlichen Hemisphäre) Orte der Erzeugung innerhalb eines Umkreis von 1 km von der Anbaufläche frei (aufgrund von Stichprobenerhebung zwischen Juni und Oktober) von <i>Erwinia amylovora</i> (oder in einem entsprechenden Zeitraum in der südlichen Hemisphäre) "Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Pear decline phytoplasma Praktisch frei (letzte Vegetationsperiode) von Viren und virusähnlichen Organismen
Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen <i>Monilinia fructicola</i> auftritt	"Befallsfreies Gebiet" für <i>Monilinia fructicola</i> "Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte Vegetationsperiode) für <i>Monilinia fructicola</i>
Pflanzen mit Ursprung in Ländern der nördlichen Hemisphäre, eingeführt zwischen	Einfuhrverbot

dem 15. Februar und dem 1. November

Pflanzen mit Ursprung in Ländern der südlichen Hemisphäre, eingeführt zwischen dem 15. Oktober und dem 1. Mai

Einfuhrverbot

Pyrus communis

Pflanzen von Kultivaren von Alexandrine Douillard, Durondeau, Passe-Crassane

Einfuhrverbot

Rosaceae

Pflanzen mit Ursprung in Ländern der nördlichen Hemisphäre, eingeführt zwischen dem 15. Februar und dem 1. November [2010]

Einfuhrverbot

Pflanzen mit Ursprung in Ländern der südlichen Hemisphäre, eingeführt zwischen dem 15. Oktober und dem 1. Mai [2010]

Einfuhrverbot

Pflanzen [Info Marokko]

ZE: Die Pflanzen wurden in einem Gebiet angezogen, das frei von *Erwinia amylovora* und *Plum pox virus* ist.

***Rubus* [824-93]**

Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Tomato ringspot nepovirus auftritt

"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) Tomato ringspot nepovirus

Frei von Blattläusen und ihren Eiern

"Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für Tomato ringspot nepovirus

oder

"Abstammung von getestetem Material" (letzte 3 Vegetationsperioden) auf Tomato ringspot nepovirus

Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Arabis mosaic nepovirus auftritt

"Befallsfreier Ort der Erzeugung" (letzte Vegetationsperiode) für Arabis mosaic nepovirus

Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Strawberry latent ringspot nepovirus auftritt

"Befallsfreier Ort der Erzeugung" (letzte Vegetationsperiode) für Strawberry latent ringspot nepovirus

Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Tomato black ring nepovirus auftritt

"Befallsfreier Ort der Erzeugung" (letzte Vegetationsperiode) für Tomato black ring nepovirus

Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen

"Befallsfreier Ort der Erzeugung" (letzte

Pflanzen

Raspberry ringspot nepovirus auftritt	Vegetationsperiode) für Raspberry ringspot nepovirus
Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Raspberry leaf curl luteovirus auftritt	"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Raspberry leaf curl luteovirus Frei von Blattläusen und ihren Eiern "Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für Raspberry leaf curl luteovirus oder "Abstammung von getestetem Material" (letzte 3 Vegetationsperioden) auf Raspberry leaf curl luteovirus
Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Cherry leaf roll nepovirus an Rubus auftritt	"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Cherry leaf roll nepovirus Frei von Blattläusen und ihren Eiern "Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für Cherry leaf roll nepovirus oder "Abstammung von getestetem Material" (letzte 3 Vegetationsperioden) auf Cherry leaf roll nepovirus
Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Apple mosaic ilarvirus an Rubus auftritt	"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Apple mosaic ilarvirus Frei von Blattläusen und ihren Eiern "Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für Apple mosaic ilarvirus oder "Abstammung von getestetem Material" (letzte 3 Vegetationsperioden) auf Apple mosaic ilarvirus
Pflanzen mit Ursprung in Ländern, in denen Black raspberry latent ilarvirus auftritt	"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) für Black raspberry latent ilarvirus Frei von Blattläusen und ihren Eiern "Abstammung aus einem Zertifizierungssystem" für Black raspberry latent ilarvirus oder

	"Abstammung von getestetem Material" (letzte 3 Vegetationsperioden) auf Black raspberry latent ilarvirus
--	--

Rutaceae

Alle Pflanzen	[1951]	Einfuhrverbot
---------------	--------	---------------

***Saccharum* [823-93]**

Stecklinge	Einfuhrverbot PGZ und ggf. Weiterversendungszeugnis Einfuhrgenehmigung Nacheinfuhrquarantäne ZE mit Mengenangabe für jede Sorte Frei von <i>Clavibacter xyli</i> subsp. <i>xyli</i>, <i>Acidovorax avenae</i>, <i>Pseudomonas rubrisubalbicans</i>, <i>Xanthomonas albilineans</i>, <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>vasculorum</i>, <i>Ceratocystis paradoxa</i>, <i>Cytospora sacchari</i>, <i>Drechslera sacchari</i>, <i>Glomerella tucumanensis</i>, <i>Mycovellosiella koepkei</i>, <i>Puccinia kuehnii</i>, <i>Puccinia melanocephala</i>, <i>Sclerophthora macrospora</i>, <i>Ustilago scitaminea</i>, Sugarcane dwarf disease, Sugarcane streak geminivirus, Sugarcane chlorotic streak virus und Sugarcane mosaic potyvirus (ZE) Frei von <i>Peronosclerospora philippinensis</i>, <i>Peronosclerospora sacchari</i>, <i>Peronosclerospora spontanea</i>, Sugarcane Fiji disease fijivirus, Sugarcane grassy shoot phytoplasma oder Sugarcane white leaf phytoplasma (ZE) Fungizid-Behandlung Behandelt mit Wasser bei einer Temperatur von 50 °C für 30 min oder 52 °C für 20 min und danach für 3 min in kaltes Wasser getaucht sortenrein
------------	--

***Solanum lycopersicum* [10.06.2020]**

- 1) Pflanzgut mit Ursprung in Ländern, die frei von Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) sind
 - Ursprungszeugnis
 - Pflanzengesundheitszeugnis mit zusätzlicher Erklärung „Das Land ist frei von dem Virus ToBRFV.“

Pflanzen

- Vorlage eines Laborberichts, in dem festgestellt wird, dass das Pflanzenmaterial frei von ToBRFV ist.
- Einfuhrkontrolle auf ToBRFV
- 2) Pflanzgut mit Ursprung in Ländern, in denen ToBRFV vorkommt
 - Das Gebiet der Erzeugung ist frei von ToBRFV.
 - Pflanzengesundheitszeugnis mit zusätzlichen Erklärungen:
 - Das Gebiet der Erzeugung des Pflanzguts ist frei von dem Virus ToBRFV gemäß den Internationalen Standards für pflanzengesundheitliche Maßnahmen.
 - Das Pflanzgut stammt von Samen, die unter Verwendung einer geeigneten Methode in einem amtlichen Test an einer repräsentativen Probe für frei von dem Virus *ToBRFV* befunden wurden.
 - Laborbericht eines von der zuständigen Stelle des Ursprungslandes anerkannten Laboratoriums.
 - Im Pflanzengesundheitszeugnis unter Ursprungsort: Namen des Landes und des Gebietes.
 - Einfuhrkontrolle auf ToBRFV.

Sorbus

Alle Pflanzen	[824-93]	Einfuhrverbot	[824-93]
---------------	----------	---------------	----------

Sorghum (einzelne Arten)

Alle Pflanzen	[2010]	Einfuhrverbot	
---------------	--------	---------------	--

Stranvaesia

Alle Pflanzen	[824-93]	Einfuhrverbot	
---------------	----------	---------------	--

***Vitis* [207-2005]**

Alle Pflanzen, einschl. in-vitro-Material	Einfuhrgenehmigung
	In Vegetationsruhe und frei von Blättern, Erde und organischem Material
	Frei von <i>Xylella fastidiosa</i> und <i>Candidatus</i> phytoplasma australiense, <i>Xylophilus ampélinus</i> , Grapevine flavescence dorée phytoplasma Rougeau, Grapevine Yellows - Grapevine Bois noir, Vergilbungskrankheiten, <i>Phakopsora euvitis</i> , Tomato ring spot virus, <i>Viteus vitifoliae</i> , <i>Xiphinema americanum</i> sensu stricto, <i>Margarodes prieskaensis</i> , <i>M. vitis</i> , <i>M. vredendalensis</i> , <i>Agrobacterium tumefaciens</i>
	ZE: Das Pflanzmaterial stammt aus einem Gebiet, das als frei von <i>Xylophilus ampélinus</i> , Grapevine Yellows und Grapevine flavescence dorée

phytoplasma und seinem Vektor *Scaphoideus titanus* bekannt ist und es wurden keine Anzeichen der Schadorganismen am Ort der Erzeugung oder in seiner unmittelbaren Umgebung seit Beginn der letzten zwei Vegetationsperioden festgestellt.

Oder

Das Pflanzmaterial stammt von Mutterpflanzen, die mit einer geeigneten Methode getestet und dabei als frei von *Xylophilus ampélinus*, Grapevine Yellows und Grapevine flavescence dorée phytoplasma befunden wurden. (Versuchsprotokoll)

Thermische Behandlung gegen Grapevine flavescence dorée phytoplasma bei 50 °C für 45 min

ZE: Das Pflanzmaterial stammt aus einem Gebiet, das als frei von *Phakopsora euvitis* bekannt ist und es wurden keine Anzeichen des Schadorganismus am Ort der Erzeugung oder in seiner unmittelbaren Umgebung seit Beginn der letzten zwei Vegetationsperioden festgestellt.

ZE: Das Pflanzmaterial stammt von einem Ort der Erzeugung, der während der letzten beiden Vegetationsperioden untersucht und für frei von Tomato ring spot virus und *Vitis vitifoliae* befunden wurde.

ZE: Das Material stammt von einem Ort der Erzeugung, dessen Boden als frei von *Xiphinema americanum* sensu stricto bekannt ist.

Oder

Das Material ist frei von Wurzeln.

ZE: Das Pflanzmaterial stammt aus einem Gebiet, das als frei von *Agrobacterium tumefaciens* anerkannt ist und es wurden keine Anzeichen des Schadorganismen am Ort der Erzeugung oder in seiner unmittelbaren Umgebung festgestellt.

Oder

Das Pflanzmaterial stammt von Mutterpflanzen, die mit einer geeigneten Methode getestet und dabei als frei von *Agrobacterium tumefaciens* befunden wurden. (Versuchsprotokoll)

Pflanzen mit Ursprung in einem Land, in dem

ZE: Das Pflanzmaterial stammt aus einem Land,

Pflanzen

<i>Candidatus phytoplasma australiense</i> , <i>Margarodes prieskaensis</i> , <i>M. vitis</i> , <i>M. vredendalensis</i> nicht vorkommen	das als frei von <i>Candidatus phytoplasma australiense</i> , <i>Margarodes prieskaensis</i> , <i>M. vitis</i> , <i>M. vredendalensis</i> bekannt ist.
Pflanzen mit Ursprung in einem Land, in dem <i>Candidatus phytoplasma australiense</i> vorkommen	ZE: Das Pflanzmaterial stammt aus einem Gebiet, das als frei von <i>Candidatus phytoplasma australiense</i> gemäß ISPM 4 anerkannt ist und es wurden keine Anzeichen des Bakteriums und des Phytoplasmas am Ort der Erzeugung oder in seiner unmittelbaren Umgebung seit Beginn der letzten drei Vegetationsperioden festgestellt. Oder Das Pflanzmaterial stammt von Mutterpflanzen, die mit einer geeigneten Methode getestet und dabei als frei von <i>Candidatus phytoplasma australiense</i> befunden wurden. (Versuchsprotokoll) Sendung einschl. Verpackung gegen Vektoren von <i>Xylella fastidiosa</i> wie <i>Carneocephala fulgida</i>, <i>Racculacepha minerva</i> und <i>Graphocephala atropunctata</i> behandelt Thermische Behandlung gegen <i>Candidatus phytoplasma australiense</i> bei 50 °C für 45 min
Pflanzen mit Ursprung in einem Land, in dem <i>Margarodes prieskaensis</i> , <i>M. vitis</i> , <i>M. vredendalensis</i> vorkommen	ZE: Das Pflanzmaterial stammt aus einem Gebiet, das als frei <i>Margarodes prieskaensis</i>, <i>M. vitis</i>, <i>M. vredendalensis</i> anerkannt ist und es wurden keine Anzeichen der Schadorganismen am Ort der Erzeugung oder in seiner unmittelbaren Umgebung festgestellt. Oder Das Material ist frei von Wurzeln.
<i>Zea mays</i>	
Alle Pflanzen [2010]	Einfuhrverbot

Zwiebeln und Knollen

Hinweise

Jede Warengruppe beginnt ggf. mit der Auflistung der Anforderungen für alle Arten.

Anforderungen für über- oder untergeordnete Taxa sind getrennt zu suchen.

Alle Arten

Jegliche Zwiebeln oder Knollen	Einfuhrgenehmigung [76-17] PGZ und ggf. Weiterversendungszeugnis [593-2017]
<i>Solanum tuberosum</i>	
Alle Knollen von Pflanzkartoffeln [593-2017]	Eingestuft, gesäubert und verpackt an der Versendestelle oder an einer von der nationalen Pflanzenschutzorganisation anerkannten Versendestelle (ZE) Frei von Erde, Kraut und anderen Rückständen (ZE) Frei von <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i>, <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i>, <i>Ditylenchus destructor</i>, <i>Globodera pallida</i>, <i>Globodera rostochiensis</i>, <i>Leptinotarsa decemlineata</i>, <i>Meloidogyne</i> spp., Potato spindle tuber viroid, <i>Ralstonia solanacearum</i>, <i>Spongospora subterranea</i>, <i>Synchytrium endobioticum</i> und <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (ZE) Höchstens 10% (Gewichtsanteil) der Knollen befallen mit <i>Streptomyces scabies</i> (5% maximal), <i>Agriotes</i> sp. (5% maximal), <i>Erwinia</i> sp. (2% maximal), <i>Helminthosporium solani</i> (5 % maximal), <i>Phytophthora infestans</i> (2% maximal), Trockenfäule (2% maximal), <i>Thanatephorus cucumeris</i> (10% maximal), Viren - Maximum festgelegt gemäß Kategorie (1,5 % : SE Kategorie ; 2 % : E Kategorie ; 8 % : A Kategorie ; 10 % : B Kategorie)

Samen

Hinweise

Jede Warengruppe beginnt ggf. mit der Auflistung der Anforderungen für alle Arten.
Anforderungen für über- oder untergeordnete Taxa sind getrennt zu suchen.

Alle Arten

Alle Samen, Saatgut	Einfuhrgenehmigung [76-17] PGZ und ggf. Weiterversendungszeugnis [593-2017] Frei von Schadorganismen
---------------------	--

Anthyllis

Alle Samen [2010]	Frei von Samen von <i>Cuscuta</i>
-------------------	-----------------------------------

Cannabis sativa

Pflanzenteile [2010]	Einfuhrverbot
----------------------	---------------

Capsicum annum

- 1) Saatgut [593-2017]
 - PGZ (ggf. Weiterversendungszeugnis) mit zusätzlichen Erklärungen:
 - Eingestuft, gesäubert und verpackt an der Versendestelle oder an einer von der nationalen Pflanzenschutzorganisation anerkannten Versendestelle (ZE)
 - Frei von Erde, Kraut und anderen Rückständen (ZE)
 - Frei von *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis*, *Clavibacter michiganensis* subsp. *sepedonicus*, *Ditylenchus destructor*, *Globodera pallida*, *Globodera rostochiensis*, *Leptinotarsa decemlineata*, *Meloidogyne* spp., *Potato spindle tuber viroid*, *Ralstonia solanacearum*, *Spongospora subterranea*, *Synchytrium endobioticum* und *Xanthomonas campestris* pv. *vesicatoria* (ZE)
- 2) Saatgut mit Ursprung in Ländern, die frei von Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) sind [10.06.2020]
 - Ursprungszeugnis
 - Pflanzengesundheitszeugnis mit zusätzlicher Erklärung „Das Land ist frei von dem Virus ToBRFV.“
 - Vorlage eines Laborberichts, in dem festgestellt wird, dass das Pflanzenmaterial frei von ToBRFV ist.
 - Einfuhrkontrolle auf ToBRFV
- 3) Saatgut mit Ursprung in Ländern, in denen ToBRFV vorkommt [10.06.2020]
 - Das Gebiet der Erzeugung ist frei von ToBRFV.
 - Pflanzengesundheitszeugnis mit zusätzlichen Erklärungen:
 - Das Gebiet der Erzeugung des Saatguts ist frei von dem Virus ToBRFV gemäß den Internationalen Standards für pflanzengesundheitliche Maßnahmen.

Samen

- Das Saatgut wurde in einem amtlichen Test an einer repräsentativen Probe für frei von dem Virus ToBRFV befunden.
- Im Pflanzengesundheitszeugnis unter Ursprungsort: Namen des Landes und des Gebietes.
- Laborbericht eines anerkannten Laboratoriums.
- Einfuhrkontrolle auf ToBRFV.

Futterpflanzen

Alle Samen	[2010]	Frei von Samen von <i>Cuscuta</i>
------------	--------	-----------------------------------

Gossypium

Alle Samen	[1408-39]	Einfuhrverbot
------------	-----------	---------------

Lotus

Alle Samen	[2010]	Frei von Samen von <i>Cuscuta</i>
------------	--------	-----------------------------------

Medicago

Alle Samen	[2010]	Frei von Samen von <i>Cuscuta</i>
------------	--------	-----------------------------------

Medicago sativa

Alle Samen	[593-2017]	Frei von <i>Ditylenchus dipsaci</i> und <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> (ZE)
------------	------------	--

Oryza sativa

Alle Samen	[593-2017]	Frei von <i>Aphelenchoides besseyi</i> (ZE)
------------	------------	---

Phaseolus vulgaris

Alle Samen	[593-2017]	Frei von <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> und <i>Erwinia stewartii</i> (ZE)
------------	------------	--

Poaceae

Alle Samen	[Info Marokko]	Die Samen stammen von Pflanzen, die in einem Gebiet angezogen wurden, das frei von <i>Tilletia indica</i> und <i>Claviceps purpurea</i> ist.
------------	----------------	--

Prunus

Samen mit Ursprung in Ländern, in denen Tomato ringspot nepovirus auftritt	"Befallsfreie unmittelbare Umgebung" (letzte 3 Vegetationsperioden) Tomato ringspot nepovirus "Abstammung von getestetem Material" (letzte 3 Vegetationsperioden) auf Tomato ringspot nepovirus
--	--

Rutaceae

Samen [1951]	Einfuhrverbot
Saccharum [823-93]	
	Einfuhrgenehmigung
	Fungizid-Behandlung
	Frei von <i>Clavibacter xyli</i> subsp. <i>xyli</i>, <i>Acidovorax avenae</i>, <i>Pseudomonas rubrisubalbicans</i>, <i>Xanthomonas albilineans</i>, <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>vasculorum</i>, <i>Ceratocystis paradoxa</i>, <i>Cytospora sacchari</i>, <i>Drechslera sacchari</i>, <i>Glomerella tucumanensis</i>, <i>Mycovellosiella koepkei</i>, <i>Puccinia kuehnii</i>, <i>Puccinia melanocephala</i>, <i>Sclerophthora macrospora</i>, <i>Ustilago scitaminea</i>, Sugarcane dwarf disease, Sugarcane streak geminivirus, Sugarcane chlorotic streak virus und Sugarcane mosaic potyvirus (ZE)
	Frei von <i>Peronosclerospora philippinensis</i>, <i>Peronosclerospora sacchari</i>, <i>Peronosclerospora spontanea</i>, Sugarcane Fiji disease fijiavirus, Sugarcane grassy shoot phytoplasma oder Sugarcane white leaf phytoplasma (ZE)

Solanum lycopersicum

- 1) Saatgut [593-2017]
 - PGZ (ggf. Weiterversendungszeugnis) mit zusätzlichen Erklärungen:
 - Eingestuft, gesäubert und verpackt an der Versendestelle oder an einer von der nationalen Pflanzenschutzorganisation anerkannten Versendestelle (ZE)
 - Frei von Erde, Kraut und anderen Rückständen (ZE)
 - Frei von *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis*, *Clavibacter michiganensis* subsp. *sepedonicus*, *Ditylenchus destructor*, *Globodera pallida*, *Globodera rostochiensis*, *Leptinotarsa decemlineata*, *Meloidogyne* spp., *Potato spindle tuber viroid*, *Ralstonia solanacearum*, *Spongopora subterranea*, *Synchytrium endobioticum* und *Xanthomonas campestris* pv. *vesicatoria* (ZE)
- 2) Saatgut mit Ursprung in Ländern, die frei von Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) sind [10.06.2020]
 - Ursprungszeugnis
 - Pflanzengesundheitszeugnis mit zusätzlicher Erklärung „Das Land ist frei von dem Virus ToBRFV.“
 - Vorlage eines Laborberichts, in dem festgestellt wird, dass das Pflanzenmaterial frei von ToBRFV ist.
 - Einfuhrkontrolle auf ToBRFV

3) Saatgut mit Ursprung in Ländern, in denen ToBRFV vorkommt [10.06.2020]

- Das Gebiet der Erzeugung ist frei von ToBRFV.
- Pflanzengesundheitszeugnis mit zusätzlichen Erklärungen:
 - Das Gebiet der Erzeugung des Saatguts ist frei von dem Virus ToBRFV gemäß den Internationalen Standards für pflanzengesundheitliche Maßnahmen.
 - Das Saatgut wurde in einem amtlichen Test an einer repräsentativen Probe für frei von dem Virus ToBRFV befunden.
- Im Pflanzengesundheitszeugnis unter Ursprungsort: Namen des Landes und des Gebietes.
- Laborbericht eines anerkannten Laboratoriums.
- Einfuhrkontrolle auf ToBRFV.

Solanum melongena

1) Saatgut [593-2017]

- PGZ (ggf. Weiterversendungszeugnis) mit zusätzlichen Erklärungen:
 - Eingestuft, gesäubert und verpackt an der Versendestelle oder an einer von der nationalen Pflanzenschutzorganisation anerkannten Versendestelle (ZE)
 - Frei von Erde, Kraut und anderen Rückständen (ZE)
 - Frei von *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis*, *Clavibacter michiganensis* subsp. *sepedonicus*, *Ditylenchus destructor*, *Globodera pallida*, *Globodera rostochiensis*, *Leptinotarsa decemlineata*, *Meloidogyne* spp., *Potato spindle tuber viroid*, *Ralstonia solanacearum*, *Spongospora subterranea*, *Synchytrium endobioticum* und *Xanthomonas campestris* pv. *vesicatoria* (ZE)

Trifolium

Alle Samen	[2010]	Frei von Samen von <i>Cuscuta</i>
------------	--------	-----------------------------------

Schnittblumen und Zweige

Hinweise

Jede Warengruppe beginnt ggf. mit der Auflistung der Anforderungen für alle Arten.
Anforderungen für über- oder untergeordnete Taxa sind getrennt zu suchen.

Alle Arten

Alle Schnittblumen und geschnittene Zweige, Blüten, Knospen, Blattwerk [593-2017]	PGZ und ggf. Weiterversendungszeugnis
Pflanzen in bezug auf <i>Xylella fastidiosa</i> [2022/2079]	Ursprungszeugnis
– Wirtspflanzen aus Befallsländern	Einfuhrverbot
– Wirtspflanzen aus befallsfreien Ländern	Vorherige Sendung einer Mitteilung, dass das Land frei von <i>Xylella fastidiosa</i> ist. Vorherige Sendung einer Liste der registrierten und kontrollierten Produktionsstätten durch die NPPO. Pflanzengesundheitszeugnis mit zusätzlichen Erklärungen: – Das Land XYZ (Ursprungsland der Pflanzen) ist frei von dem Bakterium <i>Xylella fastidiosa</i>. – Die Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse in der Sendung wurden in einem von der NPPO registrierten und kontrollierten Pflanzenbetrieb erzeugt.
– Obstpflanzen mit Ursprung in einem Befallsland	a) Ursprung in einem befallsfreien Gebiet gemäß ISPM Nr. 4 und vorherige Sendung der Liste dieser Gebiete durch die NPPO an ONSSA. b) Ursprung in einem registrierten und kontrollierten Pflanzenbetrieb und vorherige Sendung einer Liste dieser Betriebe durch die NPPO an ONSSA. Pflanzengesundheitszeugnis mit zusätzlichen Erklärungen: dass die Pflanzen in der Sendung: – in einer Produktionsstätte erzeugt wurden, die in der unter obigem Buchstaben b genannten Liste genannt ist und in Bereichen liegt, die gemäß obigem Absatz 2 festgelegt wurden; die

			Bezeichnung und der Standort der Produktionsstätte sind anzugeben; – vor dem Versand nach Marokko mit einem Breitband-Pflanzenschutzmittel behandelt wurden und vor jeglicher Kontamination durch das Bakterium <i>Xylella fastidiosa</i> geschützt wurden; – sind frei von dem Bakterium <i>Xylella fastidiosa</i> gemäß Tests in einem von der zuständigen Stelle des Ursprungslandes anerkannten Labor an einer von dieser Stelle genommenen Probe, wenn die zum Anpflanzen bestimmten Obstpflanzen Wirt des besagten Bakteriums sind. Analysenbericht, der von einem von der zuständigen Behörde des Ursprungslandes anerkannten Labor erstellt wurde und bescheinigt, dass die Pflanzen frei von <i>Xylella fastidiosa</i> sind
Citrofortunella			
Alle geschnittenen Zweige	[1951]	Einfuhrverbot	
Citroncirus			
Alle geschnittenen Zweige	[1951]	Einfuhrverbot	
Citrus			
Alle geschnittenen Zweige	[1951]	Einfuhrverbot	
Cydonia			
Alle geschnittenen Zweige und Blüten	[824-93]	Einfuhrgenehmigung	
Eucalyptus			
Alle geschnittenen Zweige	[2088-52]	Einfuhrverbot	
Fortunella			
Alle geschnittenen Zweige	[1951]	Einfuhrverbot	

Malus

Alle geschnittenen Zweige und Blüten [93]	[824-	Einfuhrgenehmigung
--	-------	--------------------

Poncirus

Alle geschnittenen Zweige	[1951]	Einfuhrverbot
---------------------------	--------	---------------

Prunus

Alle geschnittenen Zweige und Blüten [93]	[824-	Einfuhrgenehmigung
--	-------	--------------------

Pyrus

Alle geschnittenen Zweige und Blüten [93]	[824-	Einfuhrgenehmigung
--	-------	--------------------

Rutaceae

Alle geschnittenen Zweige und Blüten [1951]		Einfuhrverbot
--	--	---------------

Früchte und Gemüse***Hinweise**

*Früchte und Gemüse (lebend) - im botanischen Sinne -, sofern nicht durch Tiefrieren haltbar gemacht.

Jede Warengruppe beginnt ggf. mit der Auflistung der Anforderungen für alle Arten.

Anforderungen für über- oder untergeordnete Taxa sind getrennt zu suchen.

Alle Arten

Jegliche Früchte[593-2017]	PGZ und ggf. Weiterversendungszeugnis
	Frei von Schadorganismen

Cydonia

Jegliche Früchte	[824-93]	Einfuhrgenehmigung
------------------	----------	--------------------

Fragaria

Früchte mit Ursprung in Ländern, in denen folgende Schadorganismen auftreten: [824-93]	"Befallsfreie Fläche" (letzte Vegetationsperiode) für:
• <i>Phytophthora fragariae</i> • Arabis mosaic nepovirus • Strawberry latent ringspot nepovirus • Tomato black ring nepovirus • Raspberry ringspot nepovirus • <i>Aphelenchoides besseyi</i> • <i>Aphelenchoides fragariae</i> • <i>Xanthomonas fragariae</i> • Strawberry crinkle cytorhabdovirus • Strawberry latent C (?) rhabdovirus • Strawberry vein-banding caulimovirus • Strawberry witches' broom phytoplasma • Strawberry mild yellow edge disease	• <i>Phytophthora fragariae</i> • Arabis mosaic nepovirus • Strawberry latent ringspot nepovirus • Tomato black ring nepovirus • Raspberry ringspot nepovirus • <i>Aphelenchoides besseyi</i> • <i>Aphelenchoides fragariae</i> • <i>Xanthomonas fragariae</i> • Strawberry crinkle cytorhabdovirus • Strawberry latent C (?) rhabdovirus • Strawberry vein-banding caulimovirus • Strawberry witches' broom phytoplasma • Strawberry mild yellow edge disease

Malus

Jegliche Früchte [824-93]	Einfuhrgenehmigung
Früchte mit Ursprung in Ländern, in denen	Frei (aufgrund von Tests) von <i>Monilinia fructicola</i>

<i>Monilinia fructicola</i> auftritt	oder Fungizid-Behandlung gegen <i>Monilinia fructicola</i> vor der Ausfuhr (ZE)
Mango	
Jegliche Früchte	Begasung
Phoenix	
Jegliche Früchte	Begasung
Prunus	
Jegliche Früchte [824-93]	Einfuhrgenehmigung
Früchte mit Ursprung in Ländern, in denen <i>Monilinia fructicola</i> auftritt [824-93]	Frei (aufgrund von Tests) von <i>Monilinia fructicola</i> oder Fungizid-Behandlung gegen <i>Monilinia fructicola</i> vor der Ausfuhr (ZE)
Pyrus	
Jegliche Früchte [824-93]	Einfuhrgenehmigung
Früchte mit Ursprung in Ländern, in denen <i>Monilinia fructicola</i> auftritt [824-93]	Frei (aufgrund von Tests) von <i>Monilinia fructicola</i> oder Fungizid-Behandlung gegen <i>Monilinia fructicola</i> vor der Ausfuhr (ZE)
Rubus	
Früchte mit Ursprung in Ländern, in denen folgende Schadorganismen auftreten: [824-93]	"Befallsfreie Fläche" (letzte Vegetationsperiode) für:
• Arabis mosaic nepovirus • Strawberry latent ringspot nepovirus • Tomato black ring nepovirus • Raspberry ringspot nepovirus • Raspberry leaf curl luteovirus • Cherry leaf roll nepovirus • Apple mosaic ilarvirus • Black raspberry latent ilarvirus	• Arabis mosaic nepovirus • Strawberry latent ringspot nepovirus • Tomato black ring nepovirus • Raspberry ringspot nepovirus • Raspberry leaf curl luteovirus • Cherry leaf roll nepovirus • Apple mosaic ilarvirus • Black raspberry latent ilarvirus

Holz

Holz	[593-2017]	PGZ und ggf. Weiterversendungszeugnis
Holzverpackungsmaterial	[593-2017]	gemäß ISPM 15

Lose Rinde

Nicht getrocknete Rinde	[593-2017]	PGZ und ggf. Weiterversendungszeugnis
-------------------------	------------	---------------------------------------

Verpackungsmaterial

Jegliches Verpackungsmaterial	Frei von Schadorganismen
[1568-42]	So ausgestattet, dass Inspektion und, falls notwendig, Begasung der Erzeugnisse möglich ist
Verpackungsmaterial aus verbotenen Pflanzen oder Pflanzenerzeugnissen	Einfuhrverbot
[1568-42]	
Holzverpackungsmaterial	gemäß ISPM 15
[593-2017]	

Erde/Kultursubstrat

Humus, Dung, Kompost	[593-2017]	Einfuhrverbot
Kultursubstrat ohne Erden und organisches Material (außer Humus, Dung, Kompost) [593-2017]		PGZ und ggf. Weiterversendungszeugnis Frei von Quarantäneschädlingen
Erde oder anderes organisches Material (außer reiner Torf)		Frei von Schadorganismen

Vorratsprodukte

Hinweise

Jede Warengruppe beginnt ggf. mit der Auflistung der Anforderungen für alle Arten.

Anforderungen für über- oder untergeordnete Taxa sind getrennt zu suchen.

Algen

Algen, getrocknet	[593-2017]	keine pflanzengesundheitliche Untersuchung
-------------------	------------	--

Coffea arabica, *C. liberica* und *C. stenophylla*

verarbeitete oder geröstete Kaffeebohnen von <i>Coffea arabica</i> , <i>C. liberica</i> , <i>C. stenophylla</i> [593-2017]		keine pflanzengesundheitliche Untersuchung
--	--	--

Gummi, Harze

Gummi, Harze, Gummiharze, Weihrauch, Benzoe, Aloeharz, verschiedene Gallarten, (chinesischer Gallapfel, Takaout, Eichengallen)		keine pflanzengesundheitliche Untersuchung
	[593-2017]	

Heilpflanzen

getrocknete und in Paketen abgepackte medizinische Pflanzen	[593-2017]	keine pflanzengesundheitliche Untersuchung
---	------------	--

Humulus lupulus, *H. japonicus*

getrocknete Hopfendolden	[593-2017]	keine pflanzengesundheitliche Untersuchung
--------------------------	------------	--

Lavandula vera, *L. latifolia*

getrocknet	[593-2017]	keine pflanzengesundheitliche Untersuchung
------------	------------	--

Lawsonia

Henna, getrocknete Blätter und Stängel von <i>Lawsonia alba</i>	[593-2017]	keine pflanzengesundheitliche Untersuchung
---	------------	--

Medicago sativa

Luzerne-Mehl	[593-2017]	keine pflanzengesundheitliche Untersuchung
--------------	------------	--

Nicotiana tabacum

Tabak, verarbeitet und in Dosen oder Paketen		keine pflanzengesundheitliche Untersuchung
--	--	--

[593-2017]

Pflanzen und Pflanzenteile

getrocknet in besonderen technischen Verfahren keine pflanzengesundheitliche Untersuchung

[593-2017]

Raffia

[593-2017] keine pflanzengesundheitliche Untersuchung

Rosmarinus officinalis

getrocknet [593-2017] keine pflanzengesundheitliche Untersuchung

Sisal

[593-2017] keine pflanzengesundheitliche Untersuchung

Tabak

verarbeiteter Tabak in Dosen oder Paketen keine pflanzengesundheitliche Untersuchung
[593-2017]

Thymus vulgaris

getrocknet [593-2017] keine pflanzengesundheitliche Untersuchung

Sonstiges

Sonstiges

Pollen	[593-2017]	PGZ und ggf. Weiterversendungszeugnis
Pflanzenfasern	[593-2017]	PGZ und ggf. Weiterversendungszeugnis
Heu		
Futter		
Ölkuchen		
Stroh		
Kleie		
Pflanzenreste	[593-2017, Gesetz 1927]	PGZ und ggf. Weiterversendungszeugnis
Kunststoffhüllen und –planen wie Netzen, Folien und ähnlichen Gegenständen, die für den Anbau, die Beförderung von oder bei der Arbeit mit Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen verwendet werden und Befall mit geregelten Schadorganismen aufweisen können	[2-16-535]	Einfuhrverbot

Ordnungen, Familien und ihre Gattungen

Rosaceae

<i>Acaena</i>	<i>Crataemespilus</i>	<i>Malus</i>	<i>Quillaja</i>
<i>Adenostoma</i>	<i>Cydonia</i>	<i>Margyricarpus</i>	<i>Raphiolepis</i>
<i>Agrimonia</i>	<i>Dichotomanthes</i>	<i>Mespilus</i>	<i>Rhaphiolepis</i>
<i>Alchemilla</i>	<i>Docynia</i>	<i>Neillia</i>	<i>Rhodotypos</i>
<i>Amelanchier</i>	<i>Dryas</i>	<i>Neviusia</i>	<i>Rosa</i>
<i>Amelasorbus</i>	<i>Duchesnea</i>	<i>Osmaronia</i>	<i>Rubus</i>
<i>Aphanes</i>	<i>Eriobotrya</i>	<i>Osteomeles</i>	<i>Sanguisorba</i>
<i>Aremonia</i>	<i>Exochorda</i>	<i>Pentactina</i>	<i>Sarcopoterium</i>
<i>Aronia</i>	<i>Fallugia</i>	<i>Peraphyllum</i>	<i>Sibbaldia</i>
<i>Aruncus</i>	<i>Filipendula</i>	<i>Petrophyton</i>	<i>Sibiraea</i>
<i>Cercocarpus</i>	<i>Fragaria</i>	<i>Photinia</i>	<i>Sieversia</i>
<i>Chaenomeles</i>	<i>Geum</i>	<i>Physocarpus</i>	<i>Sorbaria</i>
<i>Chamaebatia</i>	<i>Gillenia</i>	<i>Polylepis</i>	<i>Sorbaronia</i>
<i>Chamaebatiaria</i>	<i>Hagenia</i>	<i>Potentilla</i>	<i>Sorbocotoneaster</i>
<i>Cliffortia</i>	<i>Heteromeles</i>	<i>Prinsepia</i>	<i>Sorbopyrus</i>
<i>Coleogyne</i>	<i>Holodiscus</i>	<i>Prunus</i>	<i>Sorbus</i>
<i>Coluria</i>	<i>Hulthemia</i>	<i>Pseudocydonia</i>	<i>Spiraea</i>
<i>Cotoneaster</i>	<i>Kerria</i>	<i>Purshia</i>	<i>Stephanandra</i>
<i>Cowania</i>	<i>Leucosidea</i>	<i>Pyracantha</i>	<i>Stranvaesia</i>
<i>Crataegomespilus</i>	<i>Lindleya</i>	<i>Pyracomeles</i>	<i>Vauquelinia</i>
<i>Crataegus</i>	<i>Luetkea</i>	<i>Pyrocydonia</i>	<i>Waldsteinia</i>
<i>Crataegus</i> x	<i>Lyonothamnus</i>	<i>Pyronia</i>	
<i>Mespilus</i>	<i>Maddenia</i>	<i>Pyrus</i>	

Rutaceae

<i>Adenandra</i> sp.	<i>Citrofortunella</i> sp.	<i>Fortunella</i> sp.	<i>Ptelea</i> sp.
<i>Aegle</i> sp.	<i>Choisya</i> sp.	<i>Galipea</i> sp.	<i>Pelea</i> sp.
<i>Afraegle</i> sp.	<i>Coleonema</i> sp.	<i>Geijera</i> sp.	<i>Raputia</i> sp.
<i>Agathosma</i> sp.	<i>Casimiroa</i> sp.	<i>Haplophyllum</i> sp.	<i>Ruta</i> sp.
<i>Amyris</i> sp.	<i>Clausena</i> sp.	<i>Micromelum</i> sp.	<i>Severinia</i> sp.
<i>Acradenia</i> sp.	<i>Chloroxylon</i> sp.	<i>Melicope</i> sp.	<i>Skimmia</i> sp.
<i>Barosma</i> sp.	<i>Dictamnus</i> sp.	<i>Monnieria</i> sp.	<i>Toddalia</i> sp.
<i>Boenninghausenia</i> sp.	<i>Diphasia</i> sp.	<i>Murraya</i> sp.	<i>Teclea</i> sp.
<i>Boronia</i> sp.	<i>Eremocitrus</i> sp.	<i>Orixa</i> sp.	<i>Triphasia</i> sp.
<i>Calodendrum</i> sp.	<i>Evodia</i> sp.	<i>Pamburus</i> sp.	<i>Vepris</i> sp.
<i>Citrus</i> sp.	<i>Fagara</i> sp.	<i>Phellodendron</i> sp.	<i>Zanthoxylum</i> sp.
<i>Citropsis</i> sp.	<i>Feronia</i> sp.	<i>Pilocarpus</i> sp.	<i>Zieria</i> sp.
	<i>Flindersia</i> sp.	<i>Poncirus</i> sp.	