

Aprueban Lista de Plagas Reglamentadas, que detalla las plagas cuarentenarias no presentes en el Perú

RESOLUCION DIRECTORAL Nº 0056-2012-AG-SENASA-DSV

27 de diciembre de 2012

VISTOS:

El Informe Técnico Nº 0002-2012-AG-SENASA-DSV-SARVF-JNACCHA, elaborado por la Subdirección de Análisis de Riesgo y Vigilancia Fitosanitaria, que contiene la Lista actualizada de Plagas Reglamentadas, que detalla las Plagas Cuarentenarias no presentes en el Perú; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial de Comercio, autoriza a los países a establecer sus propias normas, que estén fundadas en principios científicos y sólo se apliquen en la medida necesaria para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales y que no discriminen de manera arbitraria o injustificable entre Miembros en que prevalezcan condiciones idénticas o similares;

Que, la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias NIMF 19, Directrices sobre las Listas de Plagas Reglamentadas, describe los procedimientos para establecer, mantener y poner a disposición de los interesados las listas de plagas reglamentadas y define como tales a las plagas cuarentenarias (plaga de importancia económica potencial para el área en peligro aun cuando la plaga no esté presente o, si está presente, no está extendida y se encuentra bajo control) y las plagas no cuarentenarias reglamentadas (plaga no cuarentenaria cuya presencia en las plantas para plantar afecta el uso destinado para esas plantas con repercusiones económicamente inaceptables y que, por lo tanto, está reglamentada en el territorio de la parte contratante importadora);

Que, el último párrafo del Artículo 9 del Reglamento de la Ley General de Sanidad Agraria aprobado mediante Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, señala que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) aprobará y difundirá la lista de plagas cuarentenarias y enfermedades notificables para el país, e implementará los mecanismos para fortalecer un eficiente proceso de notificación. El SENASA es la única autoridad autorizada en el país para hacer el reporte oficial de la presencia de dichas plagas y enfermedades;

Que, el inciso f) del Artículo 26 del Reglamento de Organización y Funciones del SENASA, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2005-AG y modificatoria, establece como una función de la Dirección de Sanidad Vegetal el establecer y conducir el sistema de vigilancia fitosanitaria, mediante la captación y procesamiento de información de plagas de importancia nacional e internacional;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1059 y el Decreto Supremo Nº 008-2005-AG; y con el visado de la Subdirección de Análisis de Riesgo y Vigilancia Fitosanitaria y de la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Lista de Plagas Reglamentadas, que detalla las plagas cuarentenarias no presentes en el Perú, la cual, como Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución. El Anexo será publicado en el Portal Institucional del SENASA (www.senasa.gob.pe).

Artículo 2.- La presente Lista de Plagas Reglamentadas, que detalla las plagas cuarentenarias no presentes en el Perú, no excluye otras que, con el debido sustento científico, podrán ser añadidas a aquella elaborada por el Órgano de Línea Competente del SENASA.

Artículo 3.- Todas las personas naturales o jurídicas que detecten plagas cuarentenarias dentro del territorio nacional, inscritas en la Lista de Plagas Reglamentadas, están obligadas a notificar este hecho al SENASA inmediatamente después de conocido, no pudiendo publicar su diagnóstico mientras no se haga la verificación por parte del SENASA y se determine oficialmente la situación de la plaga en el país.

Artículo 4.- La Lista de Plagas Reglamentadas, que detalla las plagas cuarentenarias no presentes en el Perú, se actualizará de forma periódica a través del Portal Institucional del SENASA (www.senasa.gob.pe).

Artículo 5.- Deróguese la Resolución Directoral Nº 44-2011-AG-SENASA-DSV.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE BARRENECHEA CABRERA

Director General

Dirección de Sanidad Vegetal

Servicio Nacional de Sanidad Agraria

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**SENASA**
PERU**LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU****ÁCAROS**

Nombre Científico	Taxonomía	Hospedante
<i>Acalitus essigi</i>	Eriophyidae	<i>Rubus idaeus</i>
<i>Acalitus vaccinii</i>	Eriophyidae	<i>Vaccinium</i> spp.
<i>Aceria ficus</i>	Eriophyidae	<i>Ficus carica</i>
<i>Aceria mangiferae</i>	Eriophyidae	<i>Mangifera indica</i>
<i>Aceria neocynarae</i>	Eriophyidae	<i>Cynara scolymus</i>
<i>Aceria oleae</i>	Eriophyidae	<i>Olea europaea</i>
<i>Aceria sheldoni</i>	Eriophyidae	<i>Citrus</i> spp.
<i>Aceria tosichella</i>	Eriophyidae	<i>Zea mays</i>
<i>Aculus fockeui</i>	Eriophyidae	Frutales de pepita y carozo
<i>Aculus schlechtendali</i>	Eriophyidae	<i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
<i>Amphitetranychus viennensis</i>	Tetranychidae	Rosaceae: <i>Prunus</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
<i>Aponychus corpuzae</i>	Tetranychidae	<i>Bambusa</i> spp.
<i>Brevipalpus chilensis</i>	Tenuipalpidae	<i>Citrus</i> spp., <i>Actinidia</i> spp., <i>Annona cherimola</i> , <i>Vitis</i> spp., <i>Geranium</i> spp.
<i>Brevipalpus lewisi</i>	Tenuipalpidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Juglans regia</i> , <i>Punica granatum</i> , <i>Vitis</i> spp.
<i>Brevipalpus obovatus</i>	Tenuipalpidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Gossypium</i> spp., <i>Camellia sinensis</i>
<i>Bryobia rubrioculus</i>	Tetranychidae	Frutales de pepita y carozo
<i>Calacarus heveae</i>	Eriophyidae	<i>Hevea brasiliensis</i>
<i>Calepitrimerus vitis</i>	Eriophyidae	<i>Vitis</i> spp.
<i>Ditrymacus athiasellus</i>	Eriophyidae	<i>Olea europaea</i>
<i>Dolichotetranychus floridanus</i>	Tenuipalpidae	<i>Ananas comosus</i>
<i>Eotetranychus carpini</i>	Tetranychidae	<i>Bertholletia excelsa</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Vitis</i> spp., <i>Corylus avellana</i>
<i>Eotetranychus pruni</i>	Tetranychidae	<i>Corylus avellana</i> , <i>Malus domestica</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus communis</i> , <i>Vitis vinifera</i>
<i>Eotetranychus willamettei</i>	Tetranychidae	<i>Vitis</i> spp.
<i>Epitrimerus pyri</i>	Eriophyidae	<i>Pyrus</i> spp., <i>Cydonia oblonga</i>
<i>Eriophyes erineus</i>	Eriophyidae	<i>Juglans regia</i>
<i>Eriophyes pseudoinsidiosus</i>	Eriophyidae	<i>Pyrus</i> spp., <i>Cydonia oblonga</i>
<i>Eutetranychus orientalis</i>	Tetranychidae	<i>Citrus</i> spp., <i>Carica papaya</i> , <i>Ficus carica</i> , <i>Gossypium</i> spp., <i>Morus alba</i> , <i>Solanum melongena</i>
<i>Oligonychus coffeae</i>	Tetranychidae	<i>Camellia sinensis</i> , <i>Coffea</i> spp.
<i>Oligonychus gossypii</i>	Tetranychidae	<i>Hevea brasiliensis</i>
<i>Oligonychus ilicis</i>	Tetranychidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Rhododendron</i> spp., <i>Camellia japonica</i> y <i>Vaccinium corymbosum</i>
<i>Oligonychus perditus</i>	Tetranychidae	Cupressaceae: <i>Juniperus chinensis</i> , <i>Platycladus orientalis</i>
<i>Oligonychus perseae</i>	Tetranychidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Acacia</i> spp., <i>Bambusa</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
<i>Panonychus elongatus</i>	Tetranychidae	<i>Passiflora edulis</i>
<i>Panonychus ulmi</i>	Tetranychidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Avena</i> spp., <i>Chenopodium</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Cucumis</i> spp., <i>Cucurbita</i> spp., <i>Fragaria</i> spp., <i>Hibiscus</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Rosa</i> spp.
<i>Petrobia latens</i>	Arachnida: Acarida	<i>Prunus</i> , <i>Fragaria</i>
<i>Phyllocoptes gracilis</i>	Eriophyidae	<i>Rubus idaeus</i>
<i>Phyllocoptura seringueirae</i>	Eriophyidae	<i>Hevea brasiliensis</i>
<i>Phytoptus avellanae</i>	Eriophyidae	<i>Corylus avellana</i>
<i>Rhizoglyphus robini</i>	Acaridae	<i>Tulipa</i> sp.

* Las especies detalladas en la columna "hospedante", no son las únicas que pueden ser afectadas por las plagas.

* Esta lista no excluye a otras plagas que pudieran ser consideradas como cuarentenarias, posterior a la fecha de publicación del presente listado.

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**SENASA**
PERU**LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU**

Nombre Científico	Taxonomía	Hospedante
<i>Steneotarsonemus furcatus</i>	Tarsonemidae	<i>Cocos nucifera</i> Poaceae: <i>Oryza</i> spp., <i>Brachiaria</i> spp., <i>Sorghum</i> spp., <i>Eleusine</i> spp., <i>Digitaria</i> spp., <i>Rottboelia</i> spp.
<i>Schizotetranychus hindustanicus</i>	Tetranychidae	<i>Citrus latifolia</i>
<i>Steneotarsonemus laticeps</i>	Tarsonemidae	<i>Gladiolus</i> spp., <i>Narcissus</i> spp., <i>Hippeastrum</i> spp.
<i>Tegolophus perseae</i>	Eriophyidae	<i>Persea</i> spp.
<i>Tenuipalpus heveae</i>	Tenuipalpidae	<i>Hevea brasiliensis</i>
<i>Tetranychopsis horridus</i>	Tetranychidae	<i>Corylus avellana</i> , <i>Corylus maxima</i> , <i>Alnus</i> sp., <i>Achillea</i> sp., <i>Thuja</i> sp., <i>Phaseolus vulgaris</i> y <i>Pinus</i> sp.
<i>Tenuipalpus pacificus</i>	Tenuipalpidae	Orquidaceae
<i>Tetranychus evansi</i>	Tetranychidae	<i>Capsicum annuum</i> , <i>Solanum lycopersicum</i> , <i>Solanum melongena</i> , <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Ipomoea batatas</i>
<i>Tetranychus kanzawai</i>	Tetranychidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Acalypha</i> spp., <i>Capsicum annuum</i> , <i>Carica papaya</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Chenopodium</i> spp., <i>Citrullus lanatus</i> , <i>Cucumis melo</i> , <i>Cucurbita</i> spp., <i>Fragaria</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Rosa</i> spp., <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Vitis</i> spp., <i>Zea mays</i> .
<i>Tetranychus mcdanieli</i>	Tetranychidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
<i>Tetranychus pacificus</i>	Tetranychidae	Amplio rango de hospedantes: Cucurbitaceae, <i>Glycine</i> spp., <i>Gossypium</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
<i>Tetranychus truncatus</i>	Tetranychidae	<i>Zea mays</i> , <i>Gossypium</i> spp.; <i>Manihot esculentum</i>
<i>Tetranychus turkestanii</i>	Tetranychidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Capsicum</i> spp., <i>Gladiolus</i> spp., <i>Glycine max</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Rosa</i> spp., <i>Zea mays</i>

INSECTOS**COLEOPTERA**

Nombre Científico	Taxonomía	Hospedante
<i>Aegorhinus nodipennis</i>	Curculionidae	<i>Corylus avellana</i> , <i>Nothofagus dombeyi</i> , <i>Nothofagus pumilio</i> , <i>Nothofagus obliqua</i> , <i>Drimys winteri</i> , <i>Vaccinium corymbosum</i> y <i>Rubus idaeus</i> .
<i>Aegorhinus phaleratus</i>	Curculionidae	<i>Fragaria ananassa</i>
<i>Aegorhinus superciliosus</i>	Curculionidae	<i>Vaccinium</i> spp., <i>Rubus</i> spp., <i>Morus</i> spp.
<i>Agrilus planipennis</i>	Buprestidae	<i>Fraxinus</i> spp.
<i>Agriotes lineatus</i>	Elateridae	<i>Allium sativum</i>
<i>Anoplophora</i> spp.	Cerambycidae	<i>Populus</i> spp. <i>Salix</i> spp. <i>Acer</i> spp.
<i>Anthonomus bisignifer</i>	Curculionidae	<i>Fragaria ananassa</i> , <i>Rubus</i> spp.
<i>Anthonomus eugenii</i>	Curculionidae	Solanaceae
<i>Anthonomus grandis</i>	Curculionidae	<i>Gossypium</i> spp., <i>Hibiscus</i> spp.
<i>Anthonomus pomorum</i>	Curculionidae	<i>Malus</i> spp., <i>Pyrus communis</i>
<i>Anthonomus quadrigibbus</i>	Curculionidae	Frutales de pepita, <i>Prunus</i> spp.
<i>Anthonomus signatus</i>	Curculionidae	<i>Rubus idaeus</i>
<i>Apate monachus</i>	Bostrichidae	Polífago
<i>Apogonia cribricollis</i>	Scarabaeidae	<i>Litchi chinensis</i> , <i>Coffea</i> spp., <i>Elaeis guineensis</i> , <i>Ipomoea batatas</i> , <i>Theobroma cacao</i>
<i>Aromia bungii</i>	Cerambycidae	<i>Prunus</i> spp., <i>Punica granatum</i> , <i>Olea europea</i> , <i>Diospyros virginiana</i> , <i>Populus alba</i>
<i>Attagenus unicolor</i>	Dermeestidae	<i>Actinidia arguta</i> , <i>Diospyros kaki</i> , <i>Malus domestica</i> , <i>Prunus armeniaca</i> , <i>P. domestica</i> , <i>P. persica</i> , <i>Vitis vinifera</i>

* Las especies detalladas en la columna "hospedante", no son las únicas que pueden ser afectadas por las plagas.

* Esta lista no excluye a otras plagas que pudieran ser consideradas como cuarentenarias, posterior a la fecha de publicación del presente listado.

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**SENASA**
PERU**LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU**

Nombre Científico	Taxonomía	Hospedante
<i>Batocera rubus</i>	Cerambycidae	<i>Artocarpus</i> spp., <i>Ficus</i> spp., <i>Hevea brasiliensis</i> , <i>Mangifera indica</i>
<i>Batocera rufomaculata</i>	Cerambycidae	<i>Anacardium occidentale</i> , <i>Artocarpus heterophyllus</i> , <i>Ficus carica</i> , <i>Hevea brasiliensis</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Morus</i> spp., <i>Ceiba pentandra</i> , <i>Dyera costulata</i> , <i>Ficus</i> spp.
<i>Brachycerus</i> spp.	Curculionidae	Liliaceae
<i>Byturus tomentosus</i>	Byturidae	Frutales de pepita, <i>Rubus</i> spp.
<i>Byturus unicolor</i>	Byturidae	<i>Rubus idaeus</i>
<i>Callosobruchus chinensis</i>	Chrysomelidae	Fabaceae, <i>Oryza sativa</i>
<i>Capnodis tenebrionis</i>	Buprestidae	<i>Prunus</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Malus domestica</i> Especies forestales
<i>Caryedon serratus</i>	Chrysomelidae	<i>Millettia pinnata</i>
<i>Caulophilus oryzae</i>	Curculionidae	Poaceae: <i>Oryza sativa</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Panicum miliaceum</i> Fabaceae: <i>Glycine</i> spp., <i>Cicer arietinum</i>
<i>Ceramida cobosi</i>	Scarabaeidae	<i>Olea europaea europaea</i>
<i>Chaetocnema confinis</i>	Chrysomelidae	<i>Vitis vinifera</i>
<i>Chenoderus testaceus</i>	Cerambycidae	<i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Chrysobothris mali</i>	Buprestidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Juglans regia</i> , <i>Quercus chrysolepis</i> , <i>Ulmus americana</i> , <i>Ficus carica</i> , <i>Pyrus communis</i> , <i>Prunus armeniaca</i> , <i>Prunus domestica</i> , <i>Hacer rubrum</i> , <i>Eucalyptus globulus</i>
<i>Cleonis pigra</i>	Curculionidae	<i>Cynara scolymus</i>
<i>Coccotrypes</i> spp. (Excepto <i>Coccotrypes rhizophorae</i>)	Curculionidae	Arecaceae: <i>Sabal</i> spp., <i>Coccothrinax</i> spp., <i>Livistona</i> spp.; Bromeliaceae; <i>Annona</i> spp.
<i>Colaspis hypochlora</i>	Chrysomelidae	<i>Phaseolus</i> spp., <i>Musa</i> spp.
<i>Conotrachelus aguacatae</i>	Curculionidae	<i>Persea americana</i>
<i>Conotrachelus nenuphar</i>	Curculionidae	Frutales de pepita y carozo, <i>Vitis</i> spp., <i>Dyospiros kaki</i> , <i>Fragaria</i> spp., <i>Vaccinium</i> spp.
<i>Conotrachelus perseae</i>	Curculionidae	<i>Persea americana</i>
<i>Crioceris asparagi</i>	Chrysomelidae	<i>Asparagus officinalis</i>
<i>Cryptorhynchus lapathi</i>	Curculionidae	Forestales: <i>Populus berolinensis</i> , <i>Populus deltoides</i> , <i>Populus interamericana</i> , <i>Populus nigra</i> , <i>Salix alba</i> , <i>Salix caprea</i> , <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix purpurea</i> , <i>Salix triandra</i> , <i>Salix viminalis</i> .
<i>Dactylotrypes</i> spp.	Curculionidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Elaeis guineensis</i>
<i>Dendroctonus</i> spp.	Curculionidae	Pinaceae: <i>Pinus</i> spp., <i>Picea</i> spp.
<i>Dexicrates robustus</i>	Bostrichidae	<i>Olea europaea europaea</i>
<i>Diaprepes abbreviatus</i>	Curculionidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Manihot esculenta</i> , <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Zea mays</i>
<i>Dryocoetes</i> spp.	Curculionidae	Pinaceae, Fagaceae
<i>Epicaerus cognatus</i>	Curculionidae	<i>Solanum tuberosum</i>
<i>Epicauta vittata</i>	Meloidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Amaranthus</i> spp. Hortalizas
<i>Epitrix tuberis</i>	Chrysomelidae	Solanaceas: <i>Solanum</i> spp.
<i>Eutinobothrus brasiliensis</i>	Curculionidae	Malvaceas: <i>Gossypium</i> spp.
<i>Euwallacea</i> spp.	Curculionidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Acer</i> spp., <i>Fagus</i> spp., <i>Quercus</i> spp., <i>Wisteria</i> spp., <i>Kolreuteria</i> spp.
<i>Exomala orientalis</i>	Scarabaeidae	Poaceae Plantas ornamentales: <i>Flemingia macrophylla</i> , <i>Iris</i> spp., <i>Rosa</i> spp.
<i>Gnathotrichus sulcatus</i>	Curculionidae	Forestales: <i>Abies</i> spp., <i>Chamaecyparis</i> spp., <i>Larix</i> spp., <i>Picea</i> spp., <i>Pinus</i> spp., <i>Pseudotsuga</i> spp., <i>Sequoia</i> spp.
<i>Gonipterus gibberus</i>	Curculionidae	<i>Eucalyptus</i> spp., <i>Celosia argentea</i> , <i>Pinus patula</i>
<i>Gonipterus scutellatus</i>	Curculionidae	<i>Eucalyptus</i> spp., <i>Pinus patula</i>

* Las especies detalladas en la columna "hospedante", no son las únicas que pueden ser afectadas por las plagas.

* Esta lista no excluye a otras plagas que pudieran ser consideradas como cuarentenarias, posterior a la fecha de publicación del presente listado.

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**SENASA**
PERU**LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU**

Nombre Científico	Taxonomía	Hospedante
<i>Heilipus lauri</i>	Curculionidae	<i>Persea americana</i>
<i>Henosepilachna elaterii</i>	Coccinellidae	Cucurbitaceae: <i>Cucumis melo</i> , <i>Citrullus lanatus</i> , <i>Cucumis sativus</i>
<i>Hylastes</i> spp.	Curculionidae	Pinaceae, Taxodiaceae, <i>Araucaria cunninghamii</i> , <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> , <i>Thuja</i> spp.
<i>Hylesinus</i> spp. (Excepto <i>H. oleiperda</i>)	Curculionidae	<i>Acer</i> spp., <i>Ailanthus</i> spp., <i>Carpinus betulus</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Fagus sylvatica</i> , <i>Fraxinus</i> spp., <i>Juglans</i> spp., <i>Olea europaea</i> , <i>Malus</i> spp., <i>Quercus</i> spp., <i>Robinia pseudoacacia</i> , <i>Syringa vulgaris</i> .
<i>Hylobius abietis</i>	Curculionidae	Especies Forestales: <i>Pinus</i> spp., <i>Picea</i> spp., <i>Larix</i> spp., <i>Pseudotsuga menziesii</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Fagus sylvatica</i> , <i>Quercus robur</i>
<i>Hylobius pales</i>	Curculionidae	<i>Pinus</i> spp. <i>Abies</i> spp. <i>Juniperus</i> spp. <i>Larix</i> spp.
<i>Hylotrupes bajulus</i>	Cerambycidae	Principales: <i>Abies</i> spp., <i>Picea</i> spp., <i>Pinus</i> spp. Secundarios: <i>Larix</i> spp., <i>Pseudotsuga menziesii</i>
<i>Hylurgops</i> spp.	Curculionidae	Pinaceae
<i>Hylurgus</i> spp.	Curculionidae	Pinaceae
<i>Hypothenemus obscurus</i>	Curculionidae	<i>Theobroma</i> spp., <i>Eucalyptus</i> spp., <i>Macadamia</i> spp., <i>Pinus</i> spp., <i>Tamarindus indica</i>
<i>Ips</i> spp.	Curculionidae	Forestales: <i>Pinus</i> spp., <i>Abies</i> spp., <i>Larix</i> spp., <i>Picea</i> spp., <i>Pseudotsuga</i> spp.
<i>Latheticus oryzae</i>	Tenebrionidae	Productos almacenados, Poaceae
<i>Leptinotarsa decemlineata</i>	Chrysomelidae	Solanaceae: <i>Solanum</i> spp., <i>Solanum lycopersicum</i> , <i>Nicotiana</i> spp.
<i>Lissorhoptrus oryzophilus</i>	Curculionidae	Poaceae: <i>Oryza sativa</i>
<i>Listroderes difficilis</i>	Curculionidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Allium</i> spp. Fabaceae: <i>Arachis hypogaea</i> Brassicaceae: <i>Brassica</i> spp. Solanaceae: <i>Capsicum</i> spp., <i>Solanum lycopersicum</i> , <i>Nicotiana</i> spp., <i>Solanum</i> spp.
<i>Listronotus bonariensis</i>	Curculionidae	Poaceae: <i>Zea mays</i> , <i>Triticum</i> spp., <i>Lolium</i> spp.
<i>Lyctus chilensis</i>	Bostrichidae	<i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Melolontha papposa</i>	Scarabaeidae	<i>Olea europaea europaea</i>
<i>Metamasius callizona</i>	Curculionidae	<i>Bromelia</i>
<i>Monochamus</i> spp.	Cerambycidae	Forestales: <i>Picea</i> spp. <i>Abies</i> spp., <i>Pinus</i> spp., <i>Pseudotsuga</i> spp., <i>Larix</i> spp., <i>Tsuga</i> spp.
<i>Naupactus xanthographus</i>	Curculionidae	Amplio Rango de hospedantes: <i>Vitis</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Olea europaea</i> Rosaceae: <i>Prunus</i> spp., <i>Rubus</i> spp.
<i>Nemolestes incomptus</i>	Curculionidae	<i>Rubus idaeus</i> , <i>Mangifera indica</i>
<i>Oberea bimaculata</i>	Cerambycidae	<i>Rubus</i> spp.
<i>Odoiporus longicollis</i>	Curculionidae	<i>Musa</i> spp.
<i>Oemona hirta</i>	Cerambycidae	<i>Citrus</i> spp. Forestales: <i>Hakea</i> sp., <i>Populus</i> spp., <i>Meltyctus</i> sp.
<i>Orthotomicus</i> spp.	Curculionidae	Pinaceae
<i>Oryctes rhinoceros</i>	Scarabaeidae	<i>Areca catechu</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Elaeis guineensis</i> , <i>Phoenix dactylifera</i>
<i>Oryzaephilus mercator</i>	Silvanidae	<i>Oryza sativa</i>
<i>Otiorhynchus cribricollis</i>	Curculionidae	<i>Vitis</i> spp., <i>Malus pumila</i> , <i>Olea europaea europaea</i>
<i>Otiorhynchus ovatus</i>	Curculionidae	Rosaceae <i>Gladiolus</i> spp., <i>Lilium</i> spp. Forestales: <i>Thuja occidentalis</i> , <i>Tsuga</i> spp., <i>Picea omorika</i> , <i>Pseudotsuga menziesii</i>
<i>Otiorhynchus rugosostriatus</i>	Curculionidae	<i>Fragaria</i> spp., <i>Quercus</i> spp., <i>Rhododendron</i> spp., <i>Rubus</i> spp., <i>Thuja</i> spp., <i>Vaccinium</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
<i>Otiorhynchus singularis</i>	Curculionidae	<i>Rubus idaeus</i>

* Las especies detalladas en la columna "hospedante", no son las únicas que pueden ser afectadas por las plagas.

* Esta lista no excluye a otras plagas que pudieran ser consideradas como cuarentenarias, posterior a la fecha de publicación del presente listado.

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**SENASA**
PERU**LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU**

Nombre Científico	Taxonomía	Hospedante
<i>Otiorhynchus sulcatus</i>	Curculionidae	<i>Vitis</i> spp., <i>Fragaria</i> spp., <i>Gerbera</i> spp. Forestales: <i>Juniperus horizontalis</i> , <i>Picea pungens</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Populus</i> spp., <i>Thuja</i> spp., <i>Tsuga</i> <i>canadensis</i>
<i>Oulema melanopus</i>	Chrysomelidae	Poaceas: <i>Triticum</i> spp., <i>Avena</i> spp., <i>Hordeum</i> spp., <i>Zea mays</i>
<i>Oxycetonia jucunda</i>	Scarabaeidae	<i>Litchi chinensis</i> , <i>Zingiber officinale</i>
<i>Paramallocera ilinizae</i>	Cerambycidae	<i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Paropsis dilatata</i>	Chrysomelidae	<i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Paropsisterna bimaculata</i>	Chrysomelidae	<i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Paropsisterna m-fuscum</i>	Chrysomelidae	<i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Phloeosinus</i> spp.	Curculionidae	Pinaceae, <i>Cryptomeria</i> spp., <i>Quercus</i> spp.
<i>Phloeotribus scarabaeoides</i>	Curculionidae	<i>Olea europaea europaea</i>
<i>Phoracantha recurva</i>	Cerambycidae	<i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Pissodes</i> spp.	Curculionidae	<i>Pinus</i> spp., <i>Abies</i> spp., <i>Cedrus</i> spp., <i>Larix</i> spp., <i>Picea</i> spp.
<i>Pityogenes</i> spp.	Curculionidae	Amplio rango de hospedantes: Pinaceae, <i>Juniperus</i> <i>communis</i> , <i>Quercus</i> spp.
<i>Placaederus ferrugineus</i>	Cerambycidae	<i>Anacardium occidentale</i>
<i>Polygraphus</i> spp.	Curculionidae	Pinaceae
<i>Popillia japonica</i>	Scarabaeidae	Amplio rango de hospedantes: especies forestales, frutales, ornamentales y silvestres
<i>Prostephanus truncatus</i>	Bostrichidae	<i>Manihot esculenta</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Arachis hypogaea</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Sorghum bicolor</i> , <i>Triticum aestivum</i>
<i>Pseudopityophthorus</i> spp.	Curculionidae	<i>Pinus</i> spp., <i>Quercus</i> spp.
<i>Ptinus fur</i>	Anobiidae	<i>Triticum</i> spp.
<i>Ptinus tectus</i>	Anobiidae	Productos almacenados
<i>Rhabdoscelus obscurus</i>	Dryophthoridae	<i>Saccharum officinarum</i> , <i>Phoenix dactylifera</i> , <i>Cocos</i> <i>nucifera</i> , <i>Musa</i> spp., <i>Carica papaya</i>
<i>Rhynchophorus ferrugineus</i>	Curculionidae	<i>Elaeis guineensis</i>
<i>Saperda carcharias</i>	Cerambycidae	<i>Populus</i> spp.
<i>Scolytus</i> spp. (Excepto <i>S. rugulosus</i>)	Curculionidae	<i>Quercus</i> spp., <i>Aesculus hippocastanum</i> , <i>Betula</i> spp., <i>Carpinus</i> spp., <i>Castanea sativa</i> , <i>Corylus</i> spp., <i>Fagus</i> spp., <i>Ostrya</i> spp., <i>Populus</i> spp., <i>Salix</i> spp., <i>Sorbus</i> spp., <i>Ulmus</i> spp., <i>Aesculus</i> spp., <i>Tilia cordata</i> .
<i>Scyphophorus acupunctatus</i>	Dryophthoridae	<i>Dracaena</i> spp.
<i>Sinoxylon</i> spp.	Bostrichidae	Especies frutales y forestales
<i>Sternochetus mangiferae</i>	Curculionidae	<i>Mangifera indica</i>
<i>Taphrorychus</i> spp.	Curculionidae	<i>Acer</i> spp., <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Betula</i> spp., <i>Carpinus</i> <i>orientalis</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Castanea sativa</i> , <i>Fagus</i> <i>sylvatica</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Pinus sylvestris</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus pyraister</i> , <i>Quercus</i> spp., <i>Salix cinerea</i>
<i>Tetropium fuscum</i>	Cerambycidae	<i>Pinus</i> spp., <i>Picea</i> spp., <i>Abies</i> spp., <i>Larix</i> spp.
<i>Tomicus</i> spp. (Excepto <i>T. perforans</i>)	Curculionidae	<i>Pinus</i> spp.
<i>Trachymela sloanei</i>	Chrysomelidae	<i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Trachymela tincticollis</i>	Chrysomelidae	<i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Trogoderma glabrum</i>	Dermestidae	Productos almacenados y comida procesada
<i>Trogoderma granarium</i>	Dermestidae	Productos almacenados y comida procesada
<i>Trogoderma inclusum</i>	Dermestidae	Productos almacenados y comida procesada
<i>Trogoderma variabile</i>	Dermestidae	Productos almacenados y comida procesada
<i>Trypodendron</i> spp.	Curculionidae	Pinaceae
<i>Xyleborinus reconditus</i>	Curculionidae	<i>Cratylia floribunda</i> , <i>Eugenia jambos</i> , <i>Liriosoma</i> <i>singularis</i> , <i>Pouteria</i> sp., <i>Pseudoolmedia laevigata</i> , <i>Qualea ingens</i> , <i>Theobroma cacao</i>

* Las especies detalladas en la columna "hospedante", no son las únicas que pueden ser afectadas por las plagas.

* Esta lista no excluye a otras plagas que pudieran ser consideradas como cuarentenarias, posterior a la fecha de publicación del presente listado.

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**SENASA**
PERU**LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU**

Nombre Científico	Taxonomía	Hospedante
<i>Xyleborinus saxesenii</i>	Curculionidae	<i>Bertholletia excelsa</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Juglans regia</i> , <i>Malus</i> spp., <i>Eucalyptus</i> spp., <i>Pinus</i> spp.
<i>Xyleborus dispar</i>	Curculionidae	<i>Prunus</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Vitis</i> spp., <i>Corylus</i> spp., <i>Juglans</i> spp., <i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Xyleborus glabratus</i>	Curculionidae	Lauraceae: <i>Persea americana</i>
<i>Xyleborus intrusus</i>	Curculionidae	<i>Pinus</i> spp., <i>Pseudotsuga</i> spp.
<i>Xylosandrus crassiusculus</i>	Curculionidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Hevea brasiliensis</i> , <i>Carya illinoensis</i> , <i>Coffea</i> spp., <i>Diospyros kaki</i> , <i>Litchi sinensis</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Persea americana</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Theobroma cacao</i>
<i>Xylosandrus curtulus</i>	Curculionidae	<i>Ficus</i> spp., <i>Inga</i> sp., <i>Nectandra</i> sp., <i>Phoradendron</i> sp., <i>Tabebuia</i> sp., <i>Serjania</i> sp., <i>Theobroma cacao</i>
<i>Xylosandrus germanus</i>	Curculionidae	<i>Juglans</i> spp., <i>Malus</i> spp.
<i>Xylotrupes gideon</i>	Scarabaeidae	<i>Litchi chinensis</i> , <i>Bambusa</i> spp., <i>Cinnamomum verum</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Musa</i> spp., <i>Solanum</i> spp., <i>Hevea brasiliensis</i>

DIPTERA

Nombre Científico	Taxonomía	Hospedante
<i>Amauromyza</i> spp. (Excepto <i>Amauromyza maculosa</i> = <i>Nemorimyza maculosa</i>)	Agromyzidae	<i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Dianthus</i> spp.
<i>Anastrepha ludens</i>	Tephritidae	<i>Citrus</i> spp., <i>Mangifera indica</i>
<i>Anastrepha pallidipennis</i>	Tephritidae	<i>Psidium guajava</i> , <i>Syzygium jambos</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Prunus persica</i> , <i>Mangifera indica</i>
<i>Anastrepha recurcauda</i> (= <i>Toxotrypana recurcauda</i>)	Tephritidae	<i>Carica papaya</i>
<i>Anastrepha suspensa</i>	Tephritidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Annona</i> spp., <i>Psidium guajava</i> , <i>Syzygium jambos</i> , <i>Averrhoa carambola</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Carica papaya</i> , Rosaceae
<i>Anastrepha velezi</i>	Tephritidae	<i>Passiflora</i> spp.
<i>Bactrocera</i> spp.	Tephritidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Carica papaya</i> , <i>Passiflora edulis</i> , <i>Annona</i> spp.
<i>Bradysia diiformis</i>	Sciaridae	<i>Phalaenopsis</i> spp.
<i>Carpomya pardalina</i>	Tephritidae	Cucurbitaceae
<i>Ceratitis</i> spp. (Excepto <i>Ceratitis capitata</i>)	Tephritidae	Amplio rango de hospedantes: Frutales y hortalizas
<i>Chromatomyia horticola</i>	Agromyzidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Carthamus tinctorius</i> , <i>Helianthus annuus</i> , <i>Lactuca sativa</i> , Brassicaceae
<i>Chromatomyia syngenesiae</i>	Agromyzidae	Asteraceae, <i>Pisum</i> spp., <i>Daucus</i> spp.
<i>Clinodiplosis oleisuga</i>	Cecidomyiidae	<i>Olea europaea</i>
<i>Contarinia tritici</i>	Cecidomyiidae	<i>Triticum</i> spp.
<i>Dacus</i> spp.	Tephritidae	Cucurbitaceae
<i>Dasineura mali</i>	Cecidomyiidae	<i>Malus domestica</i>
<i>Dasineura serotina</i>	Cecidomyiidae	<i>Hypericum</i> sp.
<i>Delia antiqua</i>	Anthomyiidae	<i>Allium</i> spp.
<i>Delia coarctata</i>	Anthomyiidae	Poaceae: <i>Hordeum</i> spp., <i>Triticum</i> spp.
<i>Drosophila suzukii</i>	Drosophilidae	<i>Fragaria ananasa</i> , <i>Rubus</i> spp.
<i>Erosomyia mangiferae</i>	Cecidomyiidae	<i>Mangifera indica</i>
<i>Eumerus strigatus</i>	Syrphidae	<i>Tulipa</i> sp.
<i>Mayetiola destructor</i>	Cecidomyiidae	Poaceae: <i>Triticum</i> spp., <i>Secale cereale</i> , <i>Hordeum</i> spp.
<i>Monacrostichus citricola</i>	Tephritidae	<i>Citrus</i> spp.
<i>Neoceratitis cyanescens</i>	Tephritidae	Solanaceae: <i>Capsicum</i> spp., <i>Solanum melongena</i> , <i>Cyphomandra betacea</i>
<i>Orseolia oryzae</i>	Cecidomyiidae	<i>Oryza sativa</i>

* Las especies detalladas en la columna "hospedante", no son las únicas que pueden ser afectadas por las plagas.

* Esta lista no excluye a otras plagas que pudieran ser consideradas como cuarentenarias, posterior a la fecha de publicación del presente listado.

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**SENASA**
PERU**LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU**

Nombre Científico	Taxonomía	Hospedante
<i>Oscinella frit</i>	Chloropidae	Poaceae: <i>Avena</i> spp., <i>Hordeum</i> spp., <i>Secale cereale</i> , <i>Triticum</i> spp., <i>Zea mays</i>
<i>Phytomyza gymnostoma</i>	Agromyzidae	<i>Allium sativum</i>
<i>Rabdophaga saliciperda</i>	Cecidomyiidae	<i>Salix</i> spp.
<i>Rhagoletis</i> spp. (Excepto <i>R. ochraspis</i> , <i>R. lycopersicella</i> , <i>R. tomatidis</i> , <i>R. metallica</i> y <i>R. spaldia</i>)	Tephritidae	Rosaceae, Solanaceae <i>Juglans</i> spp., <i>Vaccinium</i> spp.
<i>Rhopalomyia chrysanthemi</i>	Cecidomyiidae	<i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Dianthus</i> spp.
<i>Zonosemata electa</i>	Tephritidae	Solanaceae: <i>Capsicum annum</i> , <i>Solanum lycopersicum</i> , <i>Solanum melongena</i>

HEMIPTERA

Nombre Científico	Taxonomía	Hospedante
<i>Acutaspis perseae</i>	Diaspididae	<i>Persea americana</i>
<i>Aleurocanthus spiniferus</i>	Aleyrodidae	<i>Citrus</i> spp., <i>Rosa</i> spp., <i>Diospyros kaki</i> , <i>Eriobotrya japonica</i> , <i>Cinnamomum camphora</i> , <i>Vitis</i> spp.
<i>Amrasca biguttula biguttula</i>	Cicadellidae	Amplio rango de hospedantes: Fabaceae <i>Abelmoschus esculentus</i> , <i>Arachis hypogaea</i> , <i>Glycine</i> spp., <i>Gossypium</i> spp., <i>Helianthus</i> spp.
<i>Andaspis punicae</i>	Diaspididae	<i>Litchi chinensis</i>
<i>Amphorophora agathonica</i>	Aphididae	<i>Rubus</i> spp.
<i>Antestiopsis orbitalis</i>	Pentatomidae	<i>Coffea arabica</i>
<i>Aonidiella aurantii</i>	Diaspididae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Olea europaea</i> , <i>Rosa</i> spp., <i>Carica papaya</i> , <i>Ficus</i> spp., <i>Gossypium</i> spp., <i>Mangifera indica</i>
<i>Aonidiella citrina</i>	Diaspididae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Olea europaea</i> , <i>Rosa</i> spp., <i>Carica papaya</i> , <i>Ficus</i> spp., <i>Gossypium</i> spp., <i>Mangifera indica</i>
<i>Bagrada hilaris</i>	Pentatomidae	Brassicaceae
<i>Brachycaudus cardui</i>	Aphididae	<i>Cynara scolymus</i>
<i>Brachycaudus persicae</i>	Hemiptera: Aphididae	<i>Prunus</i>
<i>Cacopsylla bidens</i>	Psyllidae	<i>Pyrus</i> spp.
<i>Cacopsylla pyri</i>	Psyllidae	<i>Pyrus</i> spp.
<i>Cacopsylla pyrisuga</i>	Psyllidae	<i>Pyrus</i> spp.
<i>Ceroplastes ceriferus</i>	Coccidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Camellia sinensis</i> Forestales: <i>Populus deltoides</i> .
<i>Ceroplastes cistudiformis</i>	Coccidae	<i>Persea americana</i>
<i>Ceroplastes destructor</i>	Coccidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Coffea</i> spp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Cydonia oblonga</i> , <i>Actinidia</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Persea americana</i> , <i>Azadirachta indica</i> , <i>Camellia sinensis</i>
<i>Ceroplastes grandis</i>	Coccidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., Especies forestales, Fabaceae
<i>Ceroplastes japonicus</i>	Coccidae	<i>Citrus</i> spp., <i>Camellia sinensis</i> , <i>Diospyros kaki</i> , <i>Cydonia oblonga</i> , <i>Pyrus</i> spp., <i>Mangifera indica</i> Forestales: <i>Ilex aquifolium</i> , <i>Ilex integra</i> , <i>Ziziphus jujuba</i> , <i>Acer japonicum</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Cycas revoluta</i> , <i>Magnolia grandiflora</i> , <i>Myrtus communis</i> , <i>Nerium oleander</i> , <i>Podocarpus nagi</i> , <i>Salix</i> spp., <i>Ulmus minor</i>
<i>Ceroplastes pseudoceriferus</i>	Coccidae	<i>Litchi chinensis</i> , <i>Mangifera indica</i>
<i>Ceroplastes sinensis</i>	Coccidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Ficus carica</i> , <i>Pyrus</i> spp., <i>Vitis</i> spp.

* Las especies detalladas en la columna "hospedante", no son las únicas que pueden ser afectadas por las plagas.

* Esta lista no excluye a otras plagas que pudieran ser consideradas como cuarentenarias, posterior a la fecha de publicación del presente listado.

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**SENASA**
PERU**LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU**

Nombre Científico	Taxonomía	Hospedante
<i>Ceroplastes rubens</i>	Coccidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Coffea</i> spp., <i>Ficus</i> spp., <i>Persea americana</i> , <i>Pyrus</i> spp., <i>Pinus</i> spp. Forestales: <i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Chaetosiphon fragaefolii</i>	Aphididae	<i>Fragaria</i> spp.
<i>Chaetosiphon thomasi</i>	Aphididae	<i>Fragaria ananasa</i>
<i>Chionaspis pinifoliae</i>	Diaspididae	Forestales: Pinaceae, Taxaceae, Cupresaceae.
<i>Chionaspis salicis</i>	Diaspididae	Amplio rango de hospedantes: <i>Vaccinium</i> spp., <i>Vitis</i> , <i>Rosa</i> , <i>Pyrus</i> , <i>Paeonia</i> , <i>Corylus</i> .
<i>Chromaphis juglandicola</i>	Aphididae	<i>Juglans</i> spp.
<i>Cicadulina mbila</i>	Cicadellidae	<i>Zea mays</i>
<i>Coccus longulus</i>	Coccidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Spatiphyllum</i> spp., Orchidaceae
<i>Coccus moestus</i>	Coccidae	<i>Nephelium lappaceum</i>
<i>Diaphorina citri</i>	Psyllidae	Rutaceae: <i>Citrus</i> spp., <i>Murraya paniculata</i>
<i>Diaspidiotus ancylus</i>	Diaspididae	Frutales de pepita y carozo
<i>Diaspidiotus juglansregiae</i>	Diaspididae	<i>Persea americana</i>
<i>Diaspidiotus ostreaeformis</i>	Diaspididae	<i>Prunus</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
<i>Diaspidiotus pyri</i>	Diaspididae	<i>Aesculus</i> , <i>Betula</i> , <i>Carpinus</i> , <i>Crataegus</i> , <i>Ficus</i> , <i>Fraxinus</i> , <i>Juglans</i> , <i>Malus</i> , <i>Mespilus</i> , <i>Olea</i> , <i>Platanus</i> , <i>Populus</i> , <i>Prunus</i> , <i>Pyrus</i> , <i>Salix</i> , <i>Sorbux</i> , <i>Spirae</i> , <i>Tilia</i>
<i>Diaspis coccois</i>	Diaspididae	<i>Persea americana</i>
<i>Distantiella theobroma</i>	Miridae	<i>Theobroma cacao</i> , <i>Ceiba pentandra</i>
<i>Drosicha stebbingi</i>	Monophlebidae	<i>Mangifera indica</i>
<i>Dysaphis cynarae</i>	Aphididae	<i>Cynara scolymus</i>
<i>Edwardsiana rosae</i>	Cicadellidae	Rosaceae: <i>Malus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Rosa</i> spp., <i>Rubus</i> spp.
<i>Epidiaspis leperii</i>	Diaspididae	Frutales de pepita y carozo, <i>Juglans</i> spp.
<i>Eriococcus coriaceus</i>	Eriococcidae	<i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Eriococcus ironsidei</i>	Eriococcidae	<i>Macadamia integrifolia</i> , <i>Macadamia tetraphylla</i>
<i>Eriosoma pyricola</i>	Aphididae	Frutales de pepita, <i>Ulmus</i> spp.
<i>Erthesina fullo</i>	Pentatomidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Actinidia chinensis</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Punica granatum</i> , <i>Malus domestica</i>
<i>Eucalyptolyma maideni</i>	Aphalaridae	<i>Corymbia citriodora</i> , <i>C. gummifera</i> , <i>C. maculata</i>
<i>Eulecanium perinflatum</i>	Coccidae	<i>Ipomoea</i> spp., <i>Psidium guajava</i> , <i>Citrus</i> spp.
<i>Eulecanium tiliae</i>	Coccidae	Amplio rango de hospedantes: Rosaceae Forestales: <i>Acer campestre</i> , <i>Ficus</i> spp., <i>Fraxinus</i> spp
<i>Euphyllura olivina</i>	Psyllidae	<i>Olea europaea</i>
<i>Eurygaster integriceps</i>	Scutelleridae	Poaceae: <i>Avena</i> spp., <i>Secale cereale</i> , <i>Sorghum</i> spp., <i>Triticum</i> spp., <i>Hordeum</i> spp.
<i>Halyomorpha halys</i>	Pentatomidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Malus domestica</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Vitis vinifera</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i>
<i>Helopeltis bergrothi</i>	Miridae	<i>Theobroma cacao</i> , <i>Gossypium</i> spp., <i>Manihot esculenta</i> , <i>Ricinus</i> spp.
<i>Homalodisca vitripennis</i>	Cicadellidae	<i>Citrus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
<i>Icerya aegyptiaca</i>	Monophlebidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Annona muricata</i> , <i>Artocarpus</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Manilkara zapota</i> , <i>Morus alba</i> , <i>Psidium guajava</i>
<i>Icerya seychellarum</i>	Monophlebidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Persea americana</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Licopersicon esculentum</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Passiflora</i> spp., <i>Punica granatum</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Vitis</i> spp., <i>Casuarina</i> spp, <i>Quercus</i> spp., <i>Tectona</i> spp.
<i>Jacobiasca lybica</i>	Cicadellidae	<i>Cajanus cajan</i> , <i>Gossypium</i> spp., <i>Solanum lycopersicum</i> , <i>Solanum</i> spp.

* Las especies detalladas en la columna "hospedante", no son las únicas que pueden ser afectadas por las plagas.

* Esta lista no excluye a otras plagas que pudieran ser consideradas como cuarentenarias, posterior a la fecha de publicación del presente listado.

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**SENASA**
PERU**LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU**

Nombre Científico	Taxonomía	Hospedante
<i>Lawana imitata</i>	Flatidae	<i>Litchi chinensis</i> , <i>Trifolium</i> spp.
<i>Lecanodiaspis dendrobii</i>	Diaspididae	Orchidiaceae
<i>Lepidosaphes conchiformis</i>	Hemiptera: Diaspididae	<i>Prunus</i>
<i>Leptopharsa heveae</i>	Tingidae	<i>Hevea brasiliensis</i>
<i>Lopholeucaspis japonica</i>	Diaspididae	<i>Citrus</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Rosa</i> spp., <i>Prunus avium</i> , <i>Diospyros kaki</i> Forestales: <i>Acer</i> spp., <i>Alnus</i> spp., <i>Betula</i> spp.
<i>Maconellicoccus hirsutus</i>	Pseudococcidae	Amplio rango de hospedantes Forestales: <i>Artocarpus</i> spp. <i>Tectona grandis</i> , <i>Acacia</i> spp., <i>Ceiba pentandra</i> , <i>Hevea brasiliensis</i>
<i>Margarodes vitis</i>	Margarodidae	<i>Vitis</i> spp., <i>Opuntia</i> spp.
<i>Matsucoccus feytaudi</i>	Matsucoccidae	<i>Pinus</i> spp.
<i>Melanaspis glomerata</i>	Diaspididae	<i>Saccharum officinarum</i>
<i>Melanaspis paulista</i>	Diaspididae	<i>Olea europaea</i>
<i>Melanaspis tenax</i>	Diaspididae	Orquideas
<i>Mercetaspis halli</i>	Diaspididae	<i>Prunus</i> , <i>Cydonia</i> , <i>Malus</i> , <i>Pyrus</i> , <i>Spiraea</i>
<i>Mesolecanium nigrofasciatum</i>	Coccidae	Frutales caducifolios
<i>Metcalfa pruinosa</i>	Flatidae	<i>Vitis vinifera</i>
<i>Myndus crudus</i>	Cixiidae	<i>Cocos nucifera</i> , <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Phoenix dactylifera</i>
<i>Myzocallis coryli</i>	Aphididae	<i>Corylus</i> spp.
<i>Neopulvinaria innumerabilis</i>	Coccidae	<i>Vitis vinifera</i> , <i>Malus</i> , <i>Prunus</i> , <i>Pyrus communis</i> , <i>Poncirus trifoliata</i> , <i>Quercus</i> , <i>Acacia</i> , <i>Diospiros kaki</i>
<i>Nipaecoccus viridis</i>	Pseudococcidae	<i>Asparagus officinalis</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Coffea</i> spp., <i>Ficus</i> spp., <i>Glycine max</i> , <i>Gossypium</i> spp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Punica granatum</i> , <i>Solanum</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
<i>Paratachardina lobata</i>	Kerriidae	<i>Litchi chinensis</i>
<i>Paratachardina pseudolobata</i>	Kerriidae	<i>Mangifera indica</i>
<i>Parlatoria oleae</i>	Diaspididae	<i>Malus</i> spp., <i>Rosa</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Olea europaea</i> , <i>Ziziphus jujuba</i>
<i>Parlatoria pittospori</i>	Diaspididae	<i>Leucospermum</i> spp
<i>Parlatoria ziziphi</i>	Diaspididae	<i>Citrus</i> spp., <i>Croton</i> spp.
<i>Parthenolecanium perlatum</i>	Coccidae	<i>Citrus</i> spp.
<i>Parthenolecanium persicae</i>	Coccidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Coffea</i> spp., <i>Cydonia oblonga</i> , <i>Diospyros kaki</i> , <i>Eriobotrya japonica</i> , <i>Ficus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
<i>Parthenolecanium pruinosum</i>	Coccidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Prunus</i> spp.
<i>Phenacoccus aceris</i>	Pseudococcidae	<i>Actinidia arguta</i> , <i>Diospyros kaki</i> , <i>Malus domestica</i> , <i>Prunus armeniaca</i> , <i>P. domestica</i> , <i>P. persica</i> , <i>Vitis vinifera</i>
<i>Phenacoccus manihoti</i>	Pseudococcidae	<i>Cyperus</i> spp., <i>Manihot esculenta</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Solanum</i> spp.
<i>Phenacoccus solenopsis</i>	Pseudococcidae	<i>Mangifera indica</i>
<i>Philaenus spumarius</i>	Cercopidae	<i>Prunus</i> spp., <i>Rubus</i> spp., <i>Fragaria</i> spp., <i>Vitis</i> spp., <i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Planococcus kenya</i>	Pseudococcidae	<i>Croton</i> spp., <i>Inga</i> spp., <i>Hibiscus</i> spp., <i>Coffea</i> spp., <i>Theobroma cacao</i>
<i>Planococcus lilacinus</i>	Pseudococcidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Annona</i> spp., <i>Arachis hypogaea</i> , <i>Cajanus cajan</i> , <i>Coffea</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Ficus</i> spp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Phoenix dactylifera</i> , <i>Psidium guajava</i> , <i>Punica granatum</i> , <i>Solanum</i> spp., <i>Vitis</i> spp., <i>Theobroma cacao</i>
<i>Pollinia pollini</i>	Asterolecaniidae	<i>Olea europaea</i>

* Las especies detalladas en la columna "hospedante", no son las únicas que pueden ser afectadas por las plagas.

* Esta lista no excluye a otras plagas que pudieran ser consideradas como cuarentenarias, posterior a la fecha de publicación del presente listado.

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**SENASA**
PERU**LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU**

Nombre Científico	Taxonomía	Hospedante
<i>Pseudaulacaspis cockerelli</i>	Diaspididae	Amplio rango de hospedantes: <i>Actinidia</i> spp., <i>Anacardium occidentale</i> , <i>Asparagus</i> spp., <i>Capsicum annuum</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Diospyros</i> spp., <i>Elaeis</i> spp., <i>Ficus</i> spp., <i>Hibiscus</i> spp., <i>Magnolia</i> spp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Musa</i> spp., <i>Olea</i> spp., <i>Persea americana</i> , <i>Philodendron</i> spp., <i>Phoenix</i> spp.
<i>Pseudococcus comstocki</i>	Pseudococcidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Castanea</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Cydonia</i> spp., <i>Ficus carica</i> , <i>Hydrangea</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Morus</i> spp., <i>Musa</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Pinus</i> spp.
<i>Pseudococcus cribata</i>	Pseudococcidae	<i>Vitis vinifera</i> , <i>Vaccinium corymbosum</i> , <i>Punica granatum</i>
<i>Pseudococcus cryptus</i>	Pseudococcidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Cocos nucifera</i> , <i>Coffea</i> spp., <i>Elaeis guineensis</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Hevea brasiliensis</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Persea americana</i> , <i>Phoenix dactylifera</i> , <i>Psidium guajava</i> , <i>Punica granatum</i> , <i>Vitis</i> spp.
<i>Pseudococcus jackbeardsleyi</i>	Pseudococcidae	<i>Acacia</i> spp., <i>Alpinia</i> spp., <i>Annona</i> spp., <i>Manihot esculenta</i> , <i>Musa</i> spp., <i>Punica granatum</i> , <i>Solanum lycopersicum</i>
<i>Pseudococcus landoi</i>	Pseudococcidae	<i>Nephelium lappaceum</i> , <i>Dracaena fragans</i>
<i>Pterochloroides persicae</i>	Aphididae	<i>Prunus salicina</i> , <i>Citrus</i> , <i>Cydonia oblonga</i> , <i>Malus domestica</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus communis</i>
<i>Pulvinaria floccifera</i>	Coccidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Psidium guajava</i> , <i>Hydrangea hortensis</i> , <i>Anthurium</i> , <i>Dracaena</i> .
<i>Pulvinaria vitis</i>	Coccidae	<i>Vitis vinifera</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Prunus armeniaca</i>
<i>Rastrococcus iceryoides</i>	Pseudococcidae	<i>Mangifera indica</i>
<i>Rastrococcus invadens</i>	Pseudococcidae	<i>Mangifera indica</i>
<i>Rhizoecus coffeae</i>	Pseudococcidae	<i>Coffea</i> spp.
<i>Saissetia neglecta</i>	Coccidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Coffea</i> spp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Ipomoea</i> spp., <i>Hevea</i> spp., <i>Manihot esculenta</i> , <i>Crotalaria</i> spp., <i>Ficus</i> spp., <i>Musa</i> spp., <i>Psidium guajava</i>
<i>Scaphoideus titanus</i>	Cicadellidae	<i>Vitis vinifera</i>
<i>Sphaerolecanium prunastri</i>	Coccidae	<i>Prunus</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
<i>Tessaratomia papillosa</i>	Pentatomidae	<i>Litchi sinensis</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Olea europaea</i> , <i>Musa</i> spp.
<i>Thaumastocoris peregrinus</i>	Thaumastocoridae	<i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Thysanoflorinia nephelii</i>	Diaspididae	<i>Litchi chinensis</i>
<i>Trialeurodes ricini</i>	Aleyrodidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Ricinus communis</i> , <i>Dolichos lablab</i> , <i>Gossypium hirsutum</i> , <i>Ipomoea batatas</i>
<i>Trioza erytrae</i>	Psyllidae	<i>Citrus</i> spp.
<i>Trioza tripunctata</i>	Psyllidae	<i>Rubus</i> spp.
<i>Unaspis yanonensis</i>	Diaspididae	<i>Citrus</i> spp.

HYMENOPTERA

Nombre Científico	Taxonomía	Hospedante
<i>Ametastegia</i> spp.	Tenthredinidae	Amplio rango de hospedante: <i>Rubus idaeus</i> , <i>Malus domestica</i> , <i>Vitis vinifera</i> , <i>Vaccinium corymbosum</i> .
<i>Eurytoma amygdali</i>	Eurytomidae	<i>Prunus armeniaca</i> , <i>Prunus domestica</i> , <i>Prunus dulcis</i>
<i>Gilpinia</i> spp.	Diprionidae	Pinaceae: <i>Abies</i> spp., <i>Pinus</i> spp., <i>Picea</i> spp.
<i>Leptocybe invasa</i>	Eulophidae	<i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Megastigmus</i> spp. (Excepto <i>M. transvaleensis</i>)	Torymidae	<i>Pinus</i> spp., <i>Pistacia</i> spp., <i>Cupressus</i> spp., <i>Eucalyptus camaldulensis</i> .
<i>Monophadnoides geniculatus</i>	Tenthredinidae	<i>Rubus</i> spp.

* Las especies detalladas en la columna "hospedante", no son las únicas que pueden ser afectadas por las plagas.

* Esta lista no excluye a otras plagas que pudieran ser consideradas como cuarentenarias, posterior a la fecha de publicación del presente listado.

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**SENASA**
PERU**LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU**

Nombre Científico	Taxonomía	Hospedante
<i>Neodiprion</i> spp.	Diprionidae	Pinaceae: <i>Picea</i> spp., <i>Abies</i> spp., <i>Pinus</i> spp.
<i>Ophelimus eucalypti</i>	Eulophidae	<i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Ophelimus maskelli</i>	Eulophidae	<i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Priophorus morio</i>	Tenthredinidae	<i>Rubus</i> spp.
<i>Selitrichodes globulus</i>	Eulophidae	<i>Eucalyptus globulus</i>
<i>Sirex</i> spp.	Siricidae	Pinaceae: <i>Pinus</i> spp., <i>Abies</i> spp., <i>Picea</i> spp., <i>Larix</i> spp., <i>Pseudotsuga</i> spp.
<i>Systole albipennis</i>	Eurytomidae	<i>Daucus carota</i> , <i>Foeniculum vulgare</i> , <i>Anethum graveolens</i> , <i>Cuminum cyminum</i>
<i>Tremex</i> spp.	Siricidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Fagus</i> spp., <i>Populus</i> spp., <i>Ulmus</i> spp., <i>Alnus</i> spp., <i>Quercus</i> spp., <i>Acer</i> spp., <i>Prunus</i> spp.

ISOPTERA

Nombre Científico	Taxonomía	Hospedante
<i>Bifiditermes</i> spp.	Kalotermitidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Ceratokaloterme</i> spp.	Kalotermitidae	Amplio rango de hospedantes. <i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Cryptotermes</i> spp. (Excepto <i>C. brevis</i> y <i>C. rospigliosi</i>)	Kalotermitidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Glyptotermes</i> spp.	Kalotermitidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Heterotermes</i> spp. (Excepto <i>H. tenuis</i>)	Rhinotermitidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Mastotermes</i> spp.	Mastotermitidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Pinus</i> spp., <i>Saccharum officinarum</i>
<i>Microcerotermes</i> spp.	Termitidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Neotermes chilensis</i>	Kalotermitidae	Madera
<i>Neotermes insularis</i>	Kalotermitidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Porotermes</i> spp.	Termopsidae	<i>Eucalyptus</i> spp., <i>Pinus radiata</i> , <i>Araucaria cunninghamii</i> , <i>Ceratopetalum apetalum</i> , <i>Nothofagus cunninghamii</i>
<i>Reticulitermes</i> spp.	Rhinotermitidae	Pinaceae, <i>Quercus</i> spp.
<i>Schedorhinotermes</i> spp.	Rhinotermitidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Eucalyptus</i> spp.

LEPIDOPTERA

Nombre Científico	Taxonomía	Hospedante
<i>Acrolepiopsis assectella</i>	Plutellidae	<i>Allium</i> spp.
<i>Adoxophyes orana</i>	Tortricidae	Rosaceae; <i>Medicago</i> sp., <i>Rhododendron</i> spp., <i>Gossypium</i> spp., <i>Rumex</i> sp., <i>Vitis vinifera</i> , <i>Vicia faba</i> , <i>Chenopodium album</i> , <i>Solanum</i> sp., <i>Physalis peruviana</i> Forestales: <i>Acer campestre</i> , <i>Alnus</i> spp., <i>Betula</i> spp., <i>Carpinus betulus</i> , <i>Crataegus</i> spp., <i>Fagus sylvatica</i> , <i>Laburnum anagyroides</i> , <i>Ligustrum</i> sp., <i>Lonicera xylosteum</i> , <i>Populus</i> spp., <i>Rosa canina</i> , <i>Salix caprea</i> , <i>Salix viminalis</i> , <i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Syringa vulgaris</i> , <i>Tilia</i> sp., <i>Ulmus minor</i>
<i>Agrius convolvuli</i>	Sphingidae	<i>Arachis hypogaea</i> , <i>Helianthus annuus</i> , <i>Ipomoea batatas</i>
<i>Agrotis segetum</i>	Noctuidae	<i>Cynara scolymus</i>
<i>Algedonia coclesalis</i>	Pyalidae	<i>Bambusa</i> spp., <i>Saccharum officinarum</i>
<i>Amyelois transitella</i>	Pyalidae	<i>Juglans regia</i> , <i>Prunus dulcis</i> , <i>Vitis</i> spp., <i>Citrus</i> spp.

* Las especies detalladas en la columna "hospedante", no son las únicas que pueden ser afectadas por las plagas.

* Esta lista no excluye a otras plagas que pudieran ser consideradas como cuarentenarias, posterior a la fecha de publicación del presente listado.

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**SENASA**
PERU**LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU**

Nombre Científico	Taxonomía	Hospedante
<i>Anarsia lineatella</i>	Gelechiidae	<i>Prunus armeniaca</i> , <i>Prunus domestica</i> , <i>Prunus dulcis</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Pyrus communis</i>
<i>Antigastra catalaunalis</i>	Crambidae	<i>Sesamum indicum</i>
<i>Apomyelois ceratoniae</i>	Pyrilidae	<i>Cajanus cajan</i> , <i>Tamarindus indica</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Juglans regia</i> , <i>Macadamia ternifolia</i> , <i>Phoenix dactylifera</i> , <i>Pistacia vera</i> , <i>Punica granatum</i> .
<i>Archips argyrospilus</i>	Tortricidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Malus</i> , <i>Prunus</i> , <i>Pyrus</i> , <i>Ribes</i> , <i>Fraxinus</i> , <i>Quercus</i> , <i>Salix</i> , <i>Rosa</i> , <i>Actinidia</i>
<i>Archips fuscocupreanus</i>	Tortricidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus communis</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Rubus</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Solanum</i> .
<i>Archips podanus</i>	Tortricidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Cydonia oblonga</i> , <i>Humulus lupulus</i> , <i>Malus domestica</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>P. domestica</i> , <i>P. salicina</i> , <i>Pyrus communis</i> , <i>Ribes nigrum</i> , <i>Rubus fruticosus</i> , <i>R. idaeus</i> .
<i>Archips rosana</i>	Tortricidae	Rosaceae
<i>Archips xylosteanus</i>	Tortricidae	<i>Prunus</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
<i>Argyrotaenia citrana</i>	Tortricidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Rubus</i> spp., <i>Citrus</i> , <i>Persea americana</i> , <i>Vitis vinifera</i> , <i>Vaccinium</i> .
<i>Ascotis reciprocaria</i>	Geometridae	<i>Persea americana</i>
<i>Ascotis selenaria</i>	Geometridae	<i>Persea americana</i>
<i>Autographa gamma</i>	Noctuidae	<i>Gerbera</i> spp.
<i>Busseola fusca</i>	Noctuidae	Poaceae: <i>Sorghum</i> spp., <i>Zea mays</i>
<i>Cacoecimorpha pronubana</i>	Tortricidae	Amplio rango de hospedantes: Rosaceae: <i>Prunus</i> spp., <i>Rubus</i> spp. Solanaceae: <i>Solanum lycopersicum</i> , <i>Solanum</i> spp. <i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Daucus carota</i> , <i>Jasminum</i> spp., <i>Dianthus</i> spp. Forestales: <i>Acacia</i> spp., <i>Acer</i> spp., <i>Populus</i> spp., <i>Syringa vulgaris</i>
<i>Cactoblastis cactorum</i>	Pyrilidae	<i>Opuntia ficus-indica</i>
<i>Cacyreus marshalli</i>	Lycaenidae	<i>Geranium</i> spp.
<i>Cadra calidella</i>	Pyrilidae	<i>Phoenix dactylifera</i>
<i>Cadra figulilella</i>	Pyrilidae	<i>Vitis</i> spp., <i>Phoenix dactylifera</i>
<i>Carposina sasakii</i>	Carposinidae	Rosaceae: Frutales de pepita, <i>Prunus</i> spp.
<i>Catarata lepisma</i>	Elachistidae	<i>Gossypium</i> spp.
<i>Chilecomadia valdiviana</i>	Cossidae	<i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Chileulia stalactitis</i>	Tortricidae	<i>Prunus</i> spp.
<i>Chilo auricilius</i>	Pyrilidae	Poaceae: <i>Oryza sativa</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Sorghum</i> spp., <i>Saccharum officinarum</i>
<i>Chilo infuscatellus</i>	Pyrilidae	Poaceae: <i>Avena</i> spp., <i>Hordeum</i> spp., <i>Sorghum</i> spp., <i>Zea mays</i> , <i>Oryza sativa</i>
<i>Chilo partellus</i>	Pyrilidae	Poaceae: <i>Sorghum</i> spp., <i>Oryza sativa</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Saccharum officinarum</i>
<i>Chilo sacchariphagus</i>	Pyrilidae	<i>Saccharum officinarum</i> , <i>Zea mays</i>
<i>Chilo suppressalis</i>	Pyrilidae	Poaceae: <i>Oryza sativa</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Sorghum</i> spp.
<i>Choristoneura</i> spp.	Tortricidae	Especies forestales
<i>Chrysodeixis chalcites</i>	Noctuidae	<i>Gerbera</i> spp.
<i>Cnephasia jactatana</i>	Tortricidae	<i>Actinidia deliciosa</i>
<i>Cnephasia longana</i>	Tortricidae	Amplio rango de hospedantes: especies de Asteraceae, Convolvulaceae, Fabaceae, Geraniaceae, Hydrophyllaceae, Linaceae, Papaveraceae, Polygonaceae, Rosaceae, Scrophulariaceae, Violaceae
<i>Conogethes punctiferalis</i>	Pyrilidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Prunus</i> spp., <i>Sorghum</i> spp., <i>Zea</i> spp., <i>Helianthus annuus</i> , <i>Vitis</i> spp. Pinaceae.

* Las especies detalladas en la columna "hospedante", no son las únicas que pueden ser afectadas por las plagas.

* Esta lista no excluye a otras plagas que pudieran ser consideradas como cuarentenarias, posterior a la fecha de publicación del presente listado.

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**SENASA**
PERU**LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU**

Nombre Científico	Taxonomía	Hospedante
<i>Conopomorpha cramerella</i>	Gracillariidae	<i>Theobroma cacao</i>
<i>Conopomorpha litchiella</i>	Gracillariidae	Sapindaceae: <i>Longan</i> spp., <i>Litchi</i> spp.
<i>Conopomorpha sinensis</i>	Gracillariidae	Sapindaceae: <i>Longan</i> spp., <i>Litchi</i> spp.
<i>Corcyra cephalonica</i>	Pyalidae	Productos almacenados
<i>Cossus cossus</i>	Cossidae	Frutales: <i>Malus pumila</i> , <i>Prunus avium</i> <i>Cynara scolymus</i>
<i>Cryptoblabes gnidiella</i>	Pyalidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Persea americana</i> , <i>Punica granatum</i> , <i>Vitis</i> spp.
<i>Cryptophlebia illepidia</i>	Tortricidae	<i>Macadamia</i> spp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Litchi sinensis</i> , <i>Acacia</i> spp.
<i>Cryptophlebia ombrodelta</i>	Tortricidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Litchi chinensis</i> , <i>Macadamia integrifolia</i> , <i>Phaseolus</i> spp., <i>Tamarindus indica</i> , <i>Vigna unguiculata</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Cassia</i> spp., <i>Bauhinia hirsuta</i> , <i>Poinciana pulcherrima</i> .
<i>Ctenopseustis herana</i>	Tortricidae	<i>Actinidia deliciosa</i>
<i>Ctenopseustis obliquana</i>	Tortricidae	<i>Actinidia deliciosa</i>
<i>Cydia</i> spp. (Excepto <i>C. pomonella</i>)	Tortricidae	<i>Castanea</i> spp., <i>Corylus</i> spp., <i>Fagus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Punica granatum</i> , <i>Quercus</i> spp., <i>Juglans regia</i> .
<i>Deanolis albizonalis</i>	Pyalidae	<i>Mangifera indica</i>
<i>Dendrolimus spectabilis</i>	Lasiocampidae	<i>Pinus</i> spp.
<i>Dendrolimus superans</i>	Lasiocampidae	<i>Pinus</i> spp.
<i>Depressaria erinacella</i>	Oecophoridae	<i>Cynara scolymus</i>
<i>Dioryctria zimmermani</i>	Pyalidae	<i>Pinus</i> spp.
<i>Duponchelia fovealis</i>	Pyalidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Begonia</i> spp., <i>Cyclamen</i> spp., <i>Euphorbia pulcherrima</i> , <i>Apium graveolens</i> , <i>Capsicum annuum</i> , <i>Lactuca sativa</i> , <i>Rhododendron</i> spp.
<i>Dyspessa ulula</i>	Cossidae	<i>Allium</i> spp.
<i>Earias biplaga</i>	Noctuidae	<i>Gossypium</i> spp., <i>Theobroma cacao</i> , <i>Hibiscus</i> spp.
<i>Earias insulana</i>	Noctuidae	Malvaceae: <i>Gossypium</i> spp., <i>Hibiscus</i> spp., <i>Oryza sativa</i> , <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Zea mays</i> .
<i>Earias vittella</i>	Noctuidae	<i>Gossypium</i> spp., <i>Hibiscus</i> spp., <i>Solanum lycopersicum</i>
<i>Epichoristodes acerbella</i>	Tortricidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Chrysanthemum morifolium</i> , <i>Dianthus caryophyllus</i> , <i>Fragaria</i> spp., <i>Medicago sativa</i> , <i>Pelargonium</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Rosa</i> spp.
<i>Epiphyas postvittana</i>	Tortricidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Chrysanthemum morifolium</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Diospyros</i> spp., <i>Eucalyptus</i> spp., <i>Jasminum</i> spp., <i>Litchi chinensis</i> , <i>Persea</i> spp., <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Vitis</i> spp. Rosaceae: Frutales de pepita y carozo, <i>Rosa</i> spp. Forestales: <i>Eucalyptus</i> spp., <i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Pinus</i> spp., <i>Populus</i> spp.
<i>Erannis defoliaria</i>	Geometridae	<i>Prunus</i> spp.
<i>Erionota thrax</i>	Hesperiidae	<i>Musa</i> spp., <i>Elaeis guineensis</i> , <i>Cocos nucifera</i>
<i>Eucalybites auroguttella</i>	Gracillariidae	<i>Hypericum</i> sp.
<i>Eudocima fullonia</i>	Noctuidae	Amplio rango de hospederos
<i>Eumeta variegata</i>	Psychidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Manihot esculenta</i> , <i>Ricinus communis</i> , <i>Syzygium aromaticum</i> , <i>Gossypium</i> spp., <i>Paulownia</i> spp., <i>Salix</i> spp.
<i>Eupoecilia ambiguella</i>	Tortricidae	<i>Vitis</i> spp.
<i>Euproctis chrysorrhoea</i>	Lymantriidae	Amplio rango de hospedantes. Frutales de pepita y carozo. <i>Populus</i> spp., <i>Quercus</i> spp.
<i>Euzophera pingüis</i>	Pyalidae	<i>Olea europaea</i> , <i>Prunus dulcis</i> , <i>Cydonia oblonga</i> , <i>Malus</i> spp.
<i>Gortyna flavago</i>	Noctuidae	<i>Cynara scolymus</i>

* Las especies detalladas en la columna "hospedante", no son las únicas que pueden ser afectadas por las plagas.

* Esta lista no excluye a otras plagas que pudieran ser consideradas como cuarentenarias, posterior a la fecha de publicación del presente listado.

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**SENASA**
PERU**LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU**

Nombre Científico	Taxonomía	Hospedante
<i>Gortyna xanthenes</i>	Noctuidae	<i>Cynara scolymus</i> , <i>Helianthus tuberosus</i>
<i>Grapholita delineana</i>	Tortricidae	<i>Cannabis sativa</i>
<i>Grapholita funebrana</i>	Tortricidae	<i>Prunus</i> spp., <i>Malus</i> spp.
<i>Grapholita inopinata</i>	Tortricidae	Frutales de pepa, <i>Malus</i> spp., <i>Cydonia</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
<i>Grapholita molesta</i>	Tortricidae	Frutales de pepita y carozo
<i>Grapholita packardii</i>	Tortricidae	Frutales de pepita y carozo
<i>Grapholita prunivora</i>	Tortricidae	Rosaceae
<i>Helicoverpa assulta</i>	Noctuidae	<i>Capsicum annuum</i>
<i>Hyphantria cunea</i>	Arctiidae	<i>Malus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Vitis</i> spp., <i>Carya illinoensis</i> , <i>Juglans nigra</i>
<i>Lampides boeticus</i>	Lycaenidae	Fabaceae
<i>Leucinodes orbonalis</i>	Pyalidae	Solanaceae: <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Solanum melongena</i> , <i>Solanum lycopersicum</i> , <i>Ipomoea batatas</i>
<i>Leucoptera malifoliella</i>	Lyonetiidae	<i>Malus pumila</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Pyrus</i> spp.
<i>Lobesia botrana</i>	Tortricidae	<i>Vitis</i> spp., <i>Diospyros kaki</i> , <i>Olea europaea</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Punica granatum</i>
<i>Lymantria dispar</i>	Erebidae	<i>Quercus</i> spp., <i>Bertholletia excelsa</i> , <i>Eucalyptus</i> spp., <i>Glycine max</i> , <i>Litchi sinensis</i> , <i>Malus</i> spp., <i>Prunus</i> spp.
<i>Lymantria mathura</i>	Erebidae	<i>Bertholletia excelsa</i> , <i>Litchi sinensis</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Quercus</i> spp., <i>Castanea</i> spp.
<i>Lymantria monacha</i>	Erebidae	Especies forestales: <i>Abies</i> spp., <i>Larix</i> spp., <i>Betula</i> spp., <i>Pinus</i> spp., <i>Quercus</i> spp., <i>Picea</i> spp.
<i>Malacosoma</i> spp.	Lasiocampidae	Especies forestales
<i>Mamestra brassicae</i>	Noctuidae	<i>Allium</i> spp., <i>Beta vulgaris</i> var. <i>saccharifera</i> Brassicaceae
<i>Mussidia nigrivenella</i>	Pyalidae	<i>Gossypium</i> spp., <i>Theobroma cacao</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Phaseolus lunatus</i>
<i>Nacoleia octasema</i>	Pyalidae	<i>Heliconia</i> spp., <i>Musa</i> spp.
<i>Nemapogon granellus</i>	Tineidae	<i>Triticum</i> spp.
<i>Omphisa anastomosalis</i>	Pyalidae	<i>Ipomoea batatas</i>
<i>Operophtera brumata</i>	Geometridae	<i>Acer</i> spp., <i>Carpinus betulus</i> , <i>Malus</i> spp., <i>Populus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Ulmus</i> spp.
<i>Orgyia antiqua</i>	Erebidae	Amplio rango de hospedantes: Coníferas <i>Malus</i> spp., <i>Humulus lupulus</i>
<i>Orgyia pseudotsugata</i>	Erebidae	Especies forestales: <i>Pseudotsuga menziesii</i> , <i>Abies</i> spp., <i>Picea</i> spp., <i>Pinus</i> spp.
<i>Ostrinia furnacalis</i>	Pyalidae	<i>Sorghum bicolor</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Zingiber officinale</i>
<i>Ostrinia nubilalis</i>	Pyalidae	<i>Malus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Gossypium</i> spp. Poaceae: <i>Zea mays</i> , <i>Avena</i> spp., <i>Hordeum</i> spp., <i>Sorghum</i> spp., <i>Triticum</i> spp. Solanaceae: <i>Capsicum</i> spp., <i>Solanum lycopersicum</i> , <i>Solanum</i> spp. Fabaceae: <i>Phaseolus</i> spp., <i>Glycine max</i> Asteraceae: <i>Cynara scolymus</i> , <i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Helianthus annuus</i> .
<i>Palpita vitrealis</i>	Crambidae	<i>Jasminum</i> spp., <i>Olea europaea</i> , <i>Ligustrum</i> spp.
<i>Pandemis heparana</i>	Tortricidae	<i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
<i>Paranthrene tabaniformis</i>	Sesiidae	<i>Populus</i> spp., <i>Betula pubescens</i> , <i>Hippophae rhamnoides</i> , <i>Loranthus europaeus</i> , <i>Salix alba</i> , <i>Salix babylonica</i> , <i>Salix caprea</i>
<i>Parapoynx stagnalis</i>	Pyalidae	<i>Oryza sativa</i>
<i>Paropta paradoxa</i>	Cossidae	<i>Ficus carica</i>
<i>Pelopidas mathias</i>	Hesperiidae	Poaceae: <i>Oryza sativa</i> , <i>Avena</i> spp., <i>Hordeum</i> spp., <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Sorghum</i> spp., <i>Triticum</i> spp., <i>Zea mays</i> . Fabaceae: <i>Crotalaria</i> spp.

* Las especies detalladas en la columna "hospedante", no son las únicas que pueden ser afectadas por las plagas.

* Esta lista no excluye a otras plagas que pudieran ser consideradas como cuarentenarias, posterior a la fecha de publicación del presente listado.

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**SENASA**
PERU**LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU**

Nombre Científico	Taxonomía	Hospedante
<i>Pennisetia marginata</i>	Sesiidae	<i>Rubus idaeus</i>
<i>Phassus giganteus</i>	Hepialidae	<i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Planotortrix excessana</i>	Tortricidae	<i>Actinidia deliciosa</i>
<i>Planotortrix octo</i>	Tortricidae	<i>Actinidia deliciosa</i>
<i>Platynota stultana</i>	Tortricidae	<i>Capsicum</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Gossypium</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Vitis</i> spp., <i>Punica granatum</i> , <i>Zea mays</i> Forestales: <i>Eucalyptus</i> spp., <i>Pinus</i> sp., <i>Theaceae</i>
<i>Prays citri</i>	Yponomeutidae	<i>Citrus</i> spp.
<i>Prays oleae</i>	Yponomeutidae	<i>Olea europaea</i>
<i>Proeulia auraria</i>	Tortricidae	Varias especies de <i>Malus</i> , <i>Prunus</i> , <i>Pyrus</i> , <i>Vitis</i> , <i>Citrus</i>
<i>Proeulia chrysopteris</i>	Tortricidae	Varias especies de <i>Actinidia</i> , <i>Malus</i> , <i>Prunus</i> , <i>Pyrus</i> , <i>Vitis</i> , <i>Citrus</i>
<i>Proeulia triquetra</i>	Tortricidae	<i>Vitis vinifera</i> , <i>Vaccinium corymbosum</i> , <i>Citrus</i> spp.
<i>Rhyacionia</i> spp.	Tortricidae	<i>Picea abies</i> , <i>Pinus</i> spp., <i>Pseudotsuga menziesii</i>
<i>Sacadodes pyralis</i>	Noctuidae	<i>Gossypium</i> spp., <i>Abelmoschus</i> spp.
<i>Scirpophaga excerptalis</i>	Crambidae	<i>Oryza sativa</i>
<i>Spilonota ocellana</i>	Tortricidae	<i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Rubus</i> spp.
<i>Spodoptera littoralis</i>	Noctuidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Gossypium</i> spp., <i>Manihot esculentum</i> , <i>Corchorus</i> spp., <i>Poaceae</i> , <i>Cruciferae</i> , <i>Cucurbitaceae</i>
<i>Spodoptera litura</i>	Noctuidae	<i>Hevea brasiliensis</i>
<i>Statherotis discana</i>	Tortricidae	<i>Litchi sinensis</i>
<i>Stathmopoda skelloni</i>	Oecophoridae	<i>Actinidia deliciosa</i>
<i>Stenoma decora</i>	Oecophoridae	<i>Theobroma cacao</i> , <i>Ceiba pentandra</i>
<i>Synanthedon bibionipennis</i>	Sessidae	<i>Rubus</i> spp., <i>Fragaria ananassa</i>
<i>Tetramoera schistaceana</i>	Tortricidae	<i>Saccharum officinarum</i>
<i>Thanatopsycha chilensis</i>	Psychidae	<i>Prunus avium</i>
<i>Thaumatotibia leucotreta</i>	Tortricidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Ananas comosus</i> , <i>Annona muricata</i> , <i>Averrhoa carambola</i> , <i>Capsicum</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Gossypium</i> , <i>Litchi chinensis</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Olea europaea</i> , <i>Persea americana</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Psidium guajava</i> , <i>Punica granatum</i>
<i>Thaumatopoea pityocampa</i>	Notodontidae	<i>Pinus</i> spp., <i>Cedrela</i> spp.
<i>Thyrinteina arnobia</i>	Geometridae	<i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Thysanoplusia orichalcea</i>	Noctuidae	<i>Cucurbitaceae</i> , <i>Leguminosae</i> <i>Vanilla planifolia</i> , <i>Allium cepa</i>
<i>Tiracola plagiata</i>	Noctuidae	<i>Passiflora edulis</i>
<i>Xyleutes magnifica</i>	Cossidae	<i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Yponomeuta malinellus</i>	Yponomeutidae	<i>Malus</i> spp.
<i>Zeuzera pyrina</i>	Cossidae	<i>Juglans</i> spp., <i>Bertholletia excelsa</i> , <i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Cydonia</i> spp., <i>Eriobotrya japonica</i> , <i>Ficus</i> spp., <i>Olea europaea</i> , <i>Punica granatum</i> , <i>Acer japonicum</i> .

THYSANOPTERA

Nombre Científico	Taxonomía	Hospedante
<i>Drepanothrips reuteri</i>	Thripidae	<i>Vitis</i> spp.
<i>Frankliniella fusca</i>	Thripidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Arachis hypogaea</i> , <i>Capsicum annuum</i> , <i>Citrullus lanatus</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Gossypium</i> spp., <i>Hippeastrum</i> spp., <i>Solanum lycopersicum</i> , <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Vigna unguiculata</i> , <i>Zea mays</i>
<i>Frankliniella intonsa</i>	Thripidae	<i>Asparagus officinalis</i> , <i>Solanum lycopersicum</i> , <i>Pisum sativum</i>
<i>Frankliniella tritici</i>	Thripidae	<i>Fabaceae</i> , <i>Poaceae</i> , <i>Cruciferae</i>
<i>Fulmekiola serrata</i>	Thripidae	<i>Saccharum officinarum</i>

* Las especies detalladas en la columna "hospedante", no son las únicas que pueden ser afectadas por las plagas.

* Esta lista no excluye a otras plagas que pudieran ser consideradas como cuarentenarias, posterior a la fecha de publicación del presente listado.

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**SENASA**
PERU**LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU**

Nombre Científico	Taxonomía	Hospedante
<i>Hercinothrips femoralis</i>	Thripidae	<i>Ananas comosus</i> , <i>Asparagus densiflorus</i> , <i>Chrysanthemum spp</i> , <i>Cucumis melo</i> , <i>Dianthus caryophyllus</i> , <i>Euphorbia pulcherrima</i> , <i>Gerbera spp</i> .
<i>Liothrips oleae</i>	Thripidae	<i>Olea europaea europaea</i>
<i>Megalurothrips distalis</i>	Thripidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Cajanus cajan</i> , <i>Coffea arabica</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Lathyrus sativus</i> , <i>Litchi chinensis</i> , <i>Morus spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i> , <i>Vigna spp</i> .
<i>Palleucothrips musae</i>	Thripidae	<i>Musa spp.</i>
<i>Pezothrips kellyanus</i>	Thripidae	<i>Citrus reticulata</i> , <i>Citrus sinensis</i>
<i>Pseudodendrothrips mori</i>	Thripidae	<i>Morus spp.</i> , <i>Camellia sinensis</i> , <i>Citrus spp.</i>
<i>Rhipiphorotheus cruentatus</i>	Thripidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Anacardium occidentale</i> , <i>Annona squamosa</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Psidium guajava</i> , <i>Punica granatum</i> , <i>Syzygium spp.</i> , <i>Vitis spp.</i>
<i>Scirtothrips aurantii</i>	Thripidae	<i>Citrus spp.</i> , <i>Manihot esculenta</i> , <i>Asparagus officinarum</i> , <i>Gossypium spp.</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Musa spp.</i> , <i>Vitis spp</i>
<i>Scirtothrips citri</i>	Thripidae	<i>Citrus spp.</i>
<i>Scirtothrips perseae</i>	Thripidae	<i>Persea americana</i>
<i>Stenchaetothrips biformis</i>	Thripidae	<i>Oryza sativa</i> , <i>Zea mays</i>
<i>Taeniothrips inconsequens</i>	Thripidae	<i>Prunus spp.</i> , <i>Malus spp.</i> , <i>Pyrus spp.</i>
<i>Thrips angusticeps</i>	Thripidae	Amplio rango de hospedantes: Poaceae, Fabaceae, Cruciferae
<i>Thrips flavus</i>	Thripidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Avena spp.</i> , <i>Beta vulgaris</i> , <i>Brassica spp.</i> , <i>Prunus spp.</i> , <i>Malus spp.</i> , Solanaceae, Cucurbitaceae
<i>Thrips hawaiiensis</i>	Thripidae	<i>Citrus spp.</i> , <i>Chrysanthemum spp.</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Musa spp.</i> , <i>Vitis spp.</i> , Cruciferae, Fabaceae
<i>Thrips nigropilosus</i>	Thripidae	<i>Avena spp.</i> , <i>Chrysanthemum spp.</i> , <i>Triticum spp.</i> , <i>Linum spp.</i>
<i>Thrips obscuratus</i>	Thripidae	<i>Actinidia deliciosa</i>

PATÓGENOS**BACTERIAS / FITOPLASMAS**

Nombre Científico	Taxonomía	Hospedante
<i>Acidovorax cattleyae</i>	Burkholderiales: Comamonadaceae	<i>Orchideaceae</i>
<i>Acidovorax citrulli</i>	Burkholderiales: Comamonadaceae	Cucurbitaceae: <i>Citrullus lanatus</i> , <i>Cucumis melo</i> , <i>Cucumis sativus</i> , <i>Cucurbita pepo</i>
<i>Apple rubbery wood phytoplasma</i>	Acholeplasmataceae	Frutales de carozo y pepita: <i>Malus spp.</i> , <i>Cydonia oblonga</i> , <i>Prunus spp.</i> , <i>Pyrus spp.</i>
<i>Blueberry stunt phytoplasma</i>	Acholeplasmatales: Acholeplasmataceae	<i>Vaccinium spp.</i>
<i>Burkholderia andropogonis</i>	Burkholderiales: Burkholderiaceae	Amplio rango de hospedantes: <i>Sorghum spp.</i>
<i>Burkholderia gladioli</i> pv. <i>alliiicola</i>	Burkholderiales: Burkholderiaceae	<i>Allium cepa</i>
<i>Burkholderia gladioli</i> pv. <i>gladioli</i>	Burkholderiales: Burkholderiaceae	<i>Oncidium sp</i>
<i>Candidatus Liberibacter spp.</i> (Excepto <i>C. L. solanacearum</i>)	Rhizobiales: Phyllobacteriaceae	<i>Citrus spp.</i>
<i>Candidatus Phytoplasma pyri</i>	Acholeplasmatales: Acholeplasmataceae	<i>Pyrus</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>P. domestica</i> , <i>Cydonia oblonga</i>
<i>Candidatus Phytoplasma rubi</i>	Acholeplasmatales: Acholeplasmataceae	<i>Rubus idaeus</i> , <i>Rubus fruticosus</i>

* Las especies detalladas en la columna "hospedante", no son las únicas que pueden ser afectadas por las plagas.

* Esta lista no excluye a otras plagas que pudieran ser consideradas como cuarentenarias, posterior a la fecha de publicación del presente listado.

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**SENASA**
PERU**LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU**

Nombre Científico	Taxonomía	Hospedante
<i>Candidatus Phytoplasma solani</i> (=Bois noir phytoplasma)	Acholeplasmatales: Acholeplasmataceae	<i>Vitis vinífera</i> , <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Solanum lycopersicum</i>
<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>insidiosus</i>	Actinomycetales: Microbacteriaceae	<i>Medicago sativa</i>
<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i>	Actinomycetales: Microbacteriaceae	Solanaceae: <i>Solanum lycopersicum</i> , <i>Capsicum annum</i>
<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>nebraskensis</i>	Actinomycetales: Microbacteriaceae	Poaceae: <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Sorghum</i> spp., <i>Zea mays</i> , <i>Triticum aestivum</i>
<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i>	Actinomycetales: Microbacteriaceae	<i>Solanum lycopersicum</i> , <i>Solanum melongena</i> , <i>Solanum tuberosum</i>
<i>Clover phyllody phytoplasma</i>	Acholeplasmataceae	<i>Lilium</i> sp.
<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i>	Actinomycetales: Microbacteriaceae	Fabaceae: <i>Glycine max</i> , <i>Phaseolus</i> spp., <i>Vigna</i> spp.
<i>Dickeya zea</i>	Enterobacteriales: Enterobacteriaceae	Amplio rango de hospedantes: <i>Sorghum</i> spp., <i>Zea mays</i>
<i>Erwinia amylovora</i>	Enterobacteriales: Enterobacteriaceae	Frutales de pepita: <i>Cydonia oblonga</i> , <i>Malus domestica</i> , <i>Pyrus comunis</i>
<i>Grapevine flavescence doree phytoplasma</i>	Acholeplasmataceae	<i>Vitis vinifera</i>
<i>Musicola paradisiaca</i>	Enterobacteriales: Enterobacteriaceae	Amplio rango de hospedantes: <i>Musa</i> spp.
<i>Palm lethal yellowing phytoplasma</i>	Acholeplasmataceae	<i>Cocos nucifera</i> , <i>Phoenix dactylifera</i>
<i>Pantoea cypripedii</i> (=Pectobacterium cypripedii)	Enterobacteriales: Enterobacteriaceae	<i>Paphiopedilum</i> spp.
<i>Peach rosette phytoplasma</i>	Acholeplasmataceae	<i>Prunus avium</i>
<i>Peach X disease phytoplasma</i>	Acholeplasmataceae	<i>Prunus</i> spp.
<i>Peach yellows phytoplasma</i>	Acholeplasmataceae	<i>Prunus</i> spp.
<i>Phytoplasma aurantifolia</i>	Acholeplasmataceae	<i>Citrus</i> spp.
<i>Phytoplasma australiense</i>	Acholeplasmataceae	<i>Paulownia</i> spp., <i>Carica papaya</i> , <i>Fragaria ananassa</i> , <i>Vitis</i> spp., <i>Phormium</i> spp.
<i>Phytoplasma mali</i>	Acholeplasmataceae	<i>Malus pumila</i>
<i>Phytoplasma prunorum</i>	Acholeplasmataceae	Frutales de carozo
<i>Pseudomonas cichorii</i>	Pseudomonadales: Pseudomonadaceae	Amplio rango de hospedantes
<i>Pseudomonas fuscovaginae</i>	Pseudomonadales: Pseudomonadaceae	<i>Oryza sativa</i> , <i>Triticum</i> spp., <i>Avena</i> spp., <i>Hordeum vulgare</i>
<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>glycinea</i>	Pseudomonadales: Pseudomonadaceae	<i>Glycine max</i>
<i>Pseudomonas syringae</i> y todos sus patovares	Pseudomonadales: Pseudomonadaceae	Amplio rango de hospedantes Forestales: <i>Populus</i> sp.
<i>Rhizobium rhizogenes</i>	Rhizobiales: Rhizobiaceae	Amplio rango de hospedantes Forestales: <i>Ficus elastica</i> , <i>Fraxinus americana</i> , <i>Pinus</i> spp., <i>Populus</i> spp., <i>Salix</i> spp., <i>Sequoia sempervirens</i> .
<i>Rhizobium rubi</i>	Rhizobiales: Rhizobiaceae	<i>Vitis</i> spp.
<i>Rhizobium vitis</i>	Rhizobiales: Rhizobiaceae	<i>Vitis</i> spp.
<i>Rhodococcus fascians</i>	Actinomycetales: Nocardiaceae	Amplio rango de hospedantes
<i>Spiroplasma citri</i>	Entomoplasmatales: Spiroplasmataceae	<i>Citrus</i> spp.

* Las especies detalladas en la columna "hospedante", no son las únicas que pueden ser afectadas por las plagas.

* Esta lista no excluye a otras plagas que pudieran ser consideradas como cuarentenarias, posterior a la fecha de publicación del presente listado.

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**SENASA**
PERU**LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU**

Nombre Científico	Taxonomía	Hospedante
<i>Streptomyces ipomoeae</i>	Actinomycetales: Streptomycetaceae	<i>Ipomoea batatas</i>
<i>Sugarcane grassy shoot and white leaf phytoplasmas</i>	Acholeplasmataceae	<i>Saccharum officinarum</i>
<i>Sugarcane white leaf phytoplasma</i>	Acholeplasmataceae	<i>Saccharum officinarum</i>
<i>Sweet potato little leaf phytoplasma</i>	Acholeplasmataceae	<i>Ipomoea batata</i>
<i>Xanthomonas albilineans</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Bambusa vulgaris</i> , <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Sorghum halepense</i>
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>corylina</i>	Pseudomonadales: Pseudomonadaceae	<i>Corylus</i> spp.
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>juglandis</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Juglans</i> spp.
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>populi</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Populus</i> spp., <i>Populus balsamifera</i> , <i>Populus nigra</i> .
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Prunus</i> spp.
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>begoniae</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Begonia</i> spp.
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>glycines</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	Fabaceae: <i>Glycine max</i> , <i>Phaseolus</i> spp.
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>manihotis</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Manihot esculenta</i>
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	Fabaceae
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>ricini</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Ricinus communis</i>
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>vasculorum</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Saccharum officinarum</i>
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>citrumelo</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Citrus</i> spp.
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>mangiferaeindicae</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Anacardium occidentale</i> , <i>Mangifera indica</i>
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>musacearum</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Musa</i> sp.
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>passiflorae</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Passiflora</i> spp.
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>sesami</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Sesamum indicum</i>
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>viticola</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Vitis</i> spp.
<i>Xanthomonas citri</i> (Excepto <i>X. citri</i> pv. <i>citri</i>)	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Citrus</i> spp.
<i>Xanthomonas cucurbitae</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	Cucurbitaceae: <i>Citrullus lanatus</i> , <i>Cucumis melo</i> , <i>Cucurbita maxima</i> , <i>Cucurbita moschata</i>
<i>Xanthomonas cynarae</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Cynara scolymus</i>
<i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>carotae</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Daucus carota</i> , <i>Coriandrum sativum</i>
<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	Poaceae: <i>Oryza sativa</i>
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	Solanaceae: <i>Capsicum annuum</i> , <i>Solanum lycopersicum</i>
<i>Xanthomonas gardneri</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	Solanaceae: <i>Capsicum annuum</i> , <i>Solanum lycopersicum</i>

* Las especies detalladas en la columna "hospedante", no son las únicas que pueden ser afectadas por las plagas.

* Esta lista no excluye a otras plagas que pudieran ser consideradas como cuarentenarias, posterior a la fecha de publicación del presente listado.

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**SENASA**
PERU**LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU**

Nombre Científico	Taxonomía	Hospedante
<i>Xanthomonas perforans</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	Solanaceae: <i>Capsicum annuum</i> , <i>Solanum lycopersicum</i>
<i>Xanthomonas vesicatoria</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	Solanaceae: <i>Capsicum annuum</i> , <i>Solanum lycopersicum</i>
<i>Xylella fastidiosa</i> (Excepto subsp. <i>pauca</i>)	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	Amplio rango de hospedantes Forestales: <i>Acer</i> spp., <i>Ulmus</i> spp.
<i>Xylophilus ampelinus</i>	Pseudomonadales: Pseudomonadaceae	<i>Vitis</i> spp.

CROMISTAS

Nombre Científico	Taxonomía	Hospedante
<i>Peronosclerospora maydis</i>	Oomycetes: Sclerosporales	Poaceae: <i>Zea mays</i> , <i>Sorghum</i> spp.
<i>Peronosclerospora philippinensis</i>	Oomycetes: Sclerosporales	Poaceae: <i>Zea mayz</i> , <i>Avena sativa</i> , <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Sorghum</i> spp.
<i>Peronosclerospora sacchari</i>	Oomycetes: Sclerosporales	<i>Zea mays</i> , <i>Saccharum officinarum</i>
<i>Peronosclerospora sorghi</i>	Oomycetes: Sclerosporales	Poaceae: <i>Sorghum</i> spp., <i>Zea mays</i>
<i>Peronospora hyoscyami</i> f.sp. <i>tabacina</i>	Oomycetes: Peronosporales	<i>Capsicum annuum</i>
<i>Peronospora manshurica</i>	Oomycetes: Peronosporales	<i>Glycine max</i>
<i>Phytophthora boehmeriae</i>	Oomycetes: Pythiales	Amplio rango de hospedantes Forestales: <i>Pinus</i> spp.
<i>Phytophthora cambivora</i>	Oomycetes: Pythiales	Amplio rango: Frutales de pepita y carozo; forestales: <i>Fagus sylvatica</i> , <i>Juglans</i> spp. <i>Abies</i> spp, <i>Quercus</i> spp.
<i>Phytophthora cryptogea</i>	Oomycetes: Pythiales	Amplio rango de hospedantes Forestales: <i>Abies concolor</i> , <i>Abies procera</i> , <i>Castanea</i> spp., <i>Cedrus deodara</i> , <i>Chamaecyparis</i> spp., <i>Cupressus</i> spp., <i>Eucalyptus</i> spp., <i>Juglans regia</i> , <i>Juniperus chinensis</i> , <i>Pinus</i> spp., <i>P. lambertiana</i> , <i>P. mugo</i> , <i>P. nigra</i> , <i>P. radiata</i> , <i>Populus simonii</i> , <i>Pseudotsuga menziesii</i>
<i>Phytophthora fragariae</i>	Oomycetes: Pythiales	<i>Fragaria ananassa</i> , <i>Rubus idaeus</i>
<i>Phytophthora megasperma</i>	Oomycetes: Pythiales	Amplio rango de hospedantes Forestales: <i>Juglans regia</i> , <i>Pseudotsuga menziesii</i>
<i>Phytophthora pinifolia</i>	Oomycetes: Pythiales	<i>Pinus</i> spp.
<i>Phytophthora porri</i>	Oomycetes: Pythiales	Liliaceae <i>Brassica</i> spp., <i>Daucus carota</i> , <i>Dianthus caryophyllus</i> , <i>Gladiolus</i> spp., <i>Hyacinthus orientalis</i> , <i>Lactuca sativa</i>
<i>Phytophthora richardiae</i>	Oomycetes: Pythiales	<i>Zantedeschia</i> sp.
<i>Phytophthora rubi</i>	Oomycetes: Pythiales	<i>Rubus</i> spp.
<i>Plasmopara halstedii</i>	Oomycetes: Peronosporales	<i>Helianthus annuus</i>
<i>Pythium myriotylum</i>	Oomycetes: Pythiales	<i>Zantedeschia</i> spp., <i>Pawnlonia</i> spp.
<i>Sclerophthora rayssiae</i> var. <i>zeae</i>	Oomycetes: Sclerosporales	<i>Zea mays</i>
<i>Sclerospora graminicola</i>	Oomycetes: Sclerosporales	Gramíneas y Pastos: <i>Zea mays</i> , <i>Saccharum officinarum</i>

* Las especies detalladas en la columna "hospedante", no son las únicas que pueden ser afectadas por las plagas.

* Esta lista no excluye a otras plagas que pudieran ser consideradas como cuarentenarias, posterior a la fecha de publicación del presente listado.

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**SENASA**
PERU**LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU****HONGOS**

Nombre Científico	Taxonomía	Hospedante
<i>Alternaria radicina</i>	Hongo anamórfico	Apiaceas: <i>Apium graveolens</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Petroselinum crispum</i>
<i>Alternaria ricini</i>	Hongo anamórfico	<i>Ricinus communis</i>
<i>Alternaria saponariae</i>	Hongo anamórfico	<i>Dianthus caryophyllus</i>
<i>Alternaria tritici</i>	Hongo anamórfico	<i>Triticum</i> spp., <i>Avena</i> spp., <i>Hordeum</i> spp., <i>Secale</i> spp., <i>Musa</i> spp.
<i>Alternariaster helianthi</i>	Ascomycetes: Pleosporales	<i>Helianthus annuus</i>
<i>Amphobotrys ricini</i>	Ascomycetes: Helotiales	<i>Ricinus comunis</i>
<i>Apiosporina morbosa</i>	Ascomycetes: Pleosporales	Frutales de carozo: <i>Prunus</i> spp.
<i>Armillaria tabescens</i>	Basidiomycetes: Agaricales	<i>Phoenix</i> sp.
<i>Arthuriomyces peckianus</i>	Pucciniomycetes: Pucciniales	<i>Rubus</i> spp.
<i>Ascochyta gossypii</i>	Hongo anamórfico	<i>Gossypium</i> spp.
<i>Balansia oryzae-sativae</i>	Ascomycetes: Hypocreales	Poaceae: <i>Oryza sativa</i> , <i>Sorghum bicolor</i>
<i>Bipolaris sorghicola</i>	Hongo anamórfico	<i>Sorghum</i> spp.
<i>Blumeriella jaapii</i>	Ascomycetes: Helotiales	<i>Prunus</i>
<i>Boeremia lycopersici</i> (= <i>Didymella lycopersici</i>)	Ascomycetes: Pleosporales	<i>Capsicum</i> spp., <i>Solanum lycopersicum</i> , <i>Solanum melongena</i> , <i>Solanum tuberosum</i>
<i>Botryosphaeria australis</i>	Ascomycetes: Dothideales	<i>Citrus</i> , <i>Eucalyptus grandis</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Persea americana</i> , <i>Prunus dulcis</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Vaccinium</i> , <i>Vaccinium corymbosum</i> , <i>Vitis vinifera</i> .
<i>Botryosphaeria corticis</i>	Ascomycetes: Dothideales	<i>Vaccinium</i> spp.
<i>Botryosphaeria dothidea</i>	Ascomycetes: Dothideales	<i>Eucalyptus</i> spp., <i>Castanea sativa</i> , <i>Malus domestica</i> , <i>Grevillea</i> spp., <i>Paulownia</i> spp., <i>Pistacia vera</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Psidium guajaba</i> , <i>Pyrus</i> spp., <i>Rubus fruticosus</i> , <i>Vitis</i> spp.
<i>Botryosphaeria laricina</i>	Ascomycetes: Dothideales	<i>Larix</i> spp.
<i>Botryotinia porri</i>	Ascomycetes: Helotiales	<i>Allium</i> spp.
<i>Botryotinia squamosa</i>	Ascomycetes: Helotiales	<i>Allium</i> spp.
<i>Botrytis aclada</i>	Hongo anamórfico	<i>Allium cepa</i>
<i>Botrytis byssoidea</i>	Hongo anamórfico	<i>Allium cepa</i>
<i>Botrytis elliptica</i>	Hongo anamórfico	<i>Lilium</i> spp.
<i>Botrytis tulipae</i>	Hongo anamórfico	<i>Tulipa</i> spp., <i>Allium cepa</i> , <i>Lilium</i> spp.
<i>Calonectria candelabrum</i>	Sordariomycetes: Hypocreales	<i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Calonectria ilicicola</i>	Sordariomycetes: Hypocreales	<i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Ceratocystis fagacearum</i>	Sordariomycetes: Microascales	<i>Quercus</i> spp., <i>Castanea</i> spp.
<i>Cercospora canescens</i>	Hongo anamórfico	<i>Phaseolus</i> spp., <i>Vigna</i> spp.
<i>Chaetoseptoria wellmanii</i>	Hongo anamórfico	<i>Phaseolus</i> spp.
<i>Cladosporium cucumerinum</i>	Hongo anamórfico	Cucurbitaceae
<i>Cochliobolus carbonum</i>	Dothideomycetes: Pleosporales	<i>Zea mays</i> , <i>Oryza sativa</i>
<i>Coleroa senniana</i>	Ascomycetes: Pleosporales	<i>Protea</i> spp., <i>Banksia</i> spp., <i>Leucospermum cordifolium</i>
<i>Colletotrichum fragariae</i>	Hongo anamórfico	<i>Fragaria ananassa</i> , <i>Annona cherimola</i>
<i>Colletotrichum kahawae</i>	Hongo anamórfico	<i>Coffea</i> spp.

* Las especies detalladas en la columna "hospedante", no son las únicas que pueden ser afectadas por las plagas.

* Esta lista no excluye a otras plagas que pudieran ser consideradas como cuarentenarias, posterior a la fecha de publicación del presente listado.

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**SENASA**
PERU**LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU**

Nombre Científico	Taxonomía	Hospedante
<i>Colletotrichum simmondsii</i>	Hongo anamórfico	<i>Actinidia chinensis</i> , <i>Capsicum frutescens</i> , <i>Carica papaya</i> , <i>Cyphomandra betaceae</i> , <i>Fragaria x ananassa</i> , <i>Litchi chinensis</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Nephelium lappaceum</i> , <i>Persea americana</i> , <i>Solanum lycopersicum</i> , <i>Vaccinium corymbosum</i>
<i>Colletotrichum sublineola</i>	Hongo anamórfico	<i>Sorghum bicolor</i>
<i>Coniella diplodiella</i>	Hongo anamórfico	<i>Vitis</i> spp.
<i>Coniothyrium glycines</i>	Hongo anamórfico	<i>Glycine max</i>
<i>Coniothyrium wernsdorffiae</i>	Hongo anamórfico	<i>Rosa</i> spp.
<i>Cronartium</i> spp.	Urediniomycetes: Uredinales	<i>Pinus</i> spp., <i>Castanea</i> spp., <i>Fagus</i> spp., <i>Quercus</i> spp., <i>Ribes</i> spp.
<i>Cryphonectria parasitica</i>	Ascomycetes: Diaporthales	<i>Berholletia excelsa</i> , <i>Malus doméstica</i> , <i>Eucalyptus</i> spp., <i>Quercus</i> spp.
<i>Cryptodiaporthe populea</i>	Sordariomycetes: Diaporthales	<i>Populus</i> spp.
<i>Chrysosporthe cubensis</i>	Ascomycetes: Diaporthales	<i>Eucalyptus</i> spp., <i>Syzygium aromaticum</i>
<i>Cylindrocladium clavatum</i>	Sordariomycetes: Hypocreales	<i>Eucalyptus</i> sp.
<i>Cylindrosporium phalaenopsidis</i>	Hongo anamórfico	<i>Phalaenopsis</i> sp.
<i>Cylindrosporium rubi</i>	Hongo anamórfico	<i>Rubus</i> spp.
<i>Diaporthe amygdali</i>	Ascomycetes: Diaporthales	<i>Prunus</i> spp.
<i>Diaporthe australafricana</i>	Ascomycetes: Diaporthales	<i>Vitis vinifera</i> , <i>Corylus avellana</i> y <i>Vaccinium corymbosum</i>
<i>Diaporthe eres</i>	Ascomycetes: Diaporthales	Frutales de pepita y carozo
<i>Diaporthe novem</i>	Ascomycetes: Diaporthales	<i>Helianthus annuus</i>
<i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>caulivora</i>	Ascomycetes: Diaporthales	Fabaceae
<i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>meridionalis</i>	Ascomycetes: Diaporthales	Fabaceae
<i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>sojae</i>	Ascomycetes: Diaporthales	Fabaceae
<i>Diaporthe vaccinii</i>	Ascomycetes: Diaporthales	<i>Vaccinium</i> spp.
<i>Didymella fabae</i>	Ascomycetes: Pleosporales	<i>Vicia faba</i>
<i>Didymella lentis</i>	Ascomycetes: Pleosporales	<i>Lens culinaris</i> ssp. <i>culinaris</i>
<i>Didymella ligulicola</i>	Ascomycetes: Pleosporales	<i>Chrysanthemum indicum</i> , <i>Flemingia macrophylla</i> , <i>Helianthus annuus</i> , <i>Lactuca sativa</i> , <i>Cynara cardunculus</i> var. <i>scolymos</i>
<i>Diplocarpon earlianum</i>	Ascomycetes: Helotiales	<i>Fragaria ananassa</i>
<i>Diplocarpon mespili</i>	Ascomycetes: Helotiales	Frutales de pepita y de carozo
<i>Diplodia palmicola</i>	Hongo anamórfico	<i>Cocos nucifera</i>
<i>Discosphaerina fulvida</i>	Ascomycetes: Dothideales	<i>Gossypium hirsutum</i> , <i>Linum usitatissimum</i>
<i>Dothichiza caroliniana</i>	Ascomycetes: Dothideales	<i>Vaccinium</i> spp.
<i>Dothiorella dominicana</i>	Ascomycetes: Dothideales	<i>Mangifera indica</i>
<i>Drepanopeziza populorum</i>	Leotiomycetes: Helotiales	<i>Populus</i> spp.

* Las especies detalladas en la columna "hospedante", no son las únicas que pueden ser afectadas por las plagas.

* Esta lista no excluye a otras plagas que pudieran ser consideradas como cuarentenarias, posterior a la fecha de publicación del presente listado.

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**SENASA**
PERU**LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU**

Nombre Científico	Taxonomía	Hospedante
<i>Elsinoë australis</i> (anamorfo <i>Sphaceloma australis</i>)	Ascomycetes: Myriangiales	<i>Citrus</i> spp.
<i>Elsinoë batatas</i>	Ascomycetes: Myriangiales	<i>Ipomoea batatas</i>
<i>Elsinoë leucospermi</i>	Ascomycetes: Myriangiales	<i>Leucadendron laureolum</i>
<i>Elsinoë mangiferae</i>	Ascomycetes: Myriangiales	<i>Mangifera indica</i>
<i>Elsinoë veneta</i>	Ascomycetes: Myriangiales	<i>Rubus</i> spp.
<i>Endocronartium harknessii</i>	Basidiomycetes: Uredinales	<i>Pinus</i> spp
<i>Entyloma dahliae</i>	Basidiomycetes: Entylomatales	<i>Flemingia macrophylla</i>
<i>Eutypa lata</i>	Sordariomycetes: Xylariales	Amplio rango de hospedantes: <i>Vitis vinifera</i> , <i>Malus domestica</i> ; Forestales: <i>Quercus suber</i> , <i>Acacia dealbata</i>
<i>Fomitiporia mediterranea</i>	Basidiomycetes: Hymenochaetales	<i>Vitis vinifera</i>
<i>Fusarium mangiferae</i>	Hongo anamórfico	<i>Mangifera indica</i>
<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i>	Hongo anamórfico	<i>Phoenix dactylifera</i> , <i>Medicago sativa</i> , <i>Trifolium repens</i>
<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>chrysanthemi</i>	Hongo anamórfico	<i>Chrysanthemum indicum</i>
<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	Hongo anamórfico	<i>Brassicaceae</i>
<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>fragariae</i>	Hongo anamórfico	<i>Fragaria</i> spp.
<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>gladioli</i>	Hongo anamórfico	Iridiaceas
<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>herbemontis</i>	Hongo anamórfico	<i>Vitis</i> spp.
<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lilii</i>	Hongo anamórfico	<i>Lilium</i> spp.
<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>melonis</i>	Hongo anamórfico	Cucurbitaceae
<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>niveum</i>	Hongo anamórfico	<i>Citrullus lanatus</i>
<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>pisi</i>	Hongo anamórfico	<i>Pisum sativum</i>
<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>quitoense</i>	Hongo anamórfico	<i>Solanum quitoense</i>
<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>radicis-lycopersici</i>	Hongo anamórfico	<i>Lycopersicon esculentum</i>
<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>ricini</i>	Hongo anamórfico	<i>Ricinus communis</i>
<i>Fusarium poae</i>	Hongo anamórfico	<i>Avena sativa</i> , <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Pisum sativum</i> , <i>Triticum aestivum</i> , <i>Prunus avium</i>
<i>Ganoderma philippii</i>	Basidiomycetes: Polyporales	Amplio rango de hospedantes. <i>Camellia sinensis</i> , <i>Hevea brasiliensis</i>
<i>Gibberella circinata</i> (= <i>Fusarium circinatum</i>)	Ascomycetes: Hypocreales	<i>Pinus</i> spp.
<i>Gibberella xylarioides</i>	Ascomycetes: Hypocreales	<i>Coffea</i> spp., <i>Gosypium hirsutum</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Musa acuminata</i>
<i>Globisporangium intermedium</i>	Peronosporae: Peronosporales	<i>Prunus</i>

* Las especies detalladas en la columna "hospedante", no son las únicas que pueden ser afectadas por las plagas.

* Esta lista no excluye a otras plagas que pudieran ser consideradas como cuarentenarias, posterior a la fecha de publicación del presente listado.

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**SENASA**
PERU**LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU**

Nombre Científico	Taxonomía	Hospedante
<i>Gloeocercospora sorghi</i>	Hongo anamórfico	Poaceae: <i>Sorghum</i> spp.
<i>Gloeosporium minus</i>	Ascomycetes: Helotiales	<i>Vaccinium</i> spp.
<i>Gloeotinia granigena</i>	Ascomycetes: Helotiales	Poaceae
<i>Gnomonia leptostyla</i>	Ascomycetes: Diaporthales	<i>Juglans</i> spp.
<i>Godronia cassandrae</i>	Ascomycetes: Helotiales	<i>Vaccinium</i> spp., <i>Rhododendron</i> .
<i>Gremmeniella abietina</i>	Ascomycetes: Helotiales	<i>Pinus</i> spp., <i>Abies</i> spp.
<i>Grosmannia wagneri</i>	Ascomycetes: Ophiostomatales	<i>Pinus</i> spp.
<i>Guignardia bidwellii</i>	Ascomycetes: Dothideales	<i>Vitis</i> spp., <i>Citrus</i> spp.
<i>Guignardia musae</i>	Ascomycetes: Dothideales	<i>Musa</i> spp.
<i>Gymnoconia nitens</i>	Pucciniomycetes: Pucciniales	<i>Rubus</i> spp.
<i>Gymnosporangium asiaticum</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	<i>Pyrus communis</i> , <i>Cydonia oblonga</i> , <i>Juniperus</i> spp.
<i>Gymnosporangium clavipes</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	Frutales de pepita: <i>Cydonia oblonga</i> , <i>Malus domestica</i> , <i>Pyrus communis</i>
<i>Gymnosporangium globosum</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	<i>Crataegus</i> spp., <i>Malus domestica</i> , <i>Juniperus virginiana</i>
<i>Gymnosporangium juniperi-virginianae</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	<i>Malus domestica</i> , <i>Juniperus</i> spp.
<i>Gymnosporangium sabinae</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	<i>Pyrus</i> spp.
<i>Gymnosporangium yamadae</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	<i>Malus domestica</i>
<i>Haplobasidium musae</i>	Hongo anamórfico	<i>Musa</i> spp.
<i>Hemileia coffeicola</i>	Urediniomycetes: Uredinales	<i>Coffea</i> spp.
<i>Kabatiella zeae</i>	Hongo anamórfico	<i>Zea mays</i>
<i>Kuehneola uredinis</i>	Urediniomycetes: Uredinales	<i>Rubus</i> spp.
<i>Leucostoma persoonii</i>	Ascomycetes: Diaporthales	<i>Malus domestica</i> , <i>Prunus</i> spp.
<i>Lophodermium pinastri</i>	Ascomycetes: Rhytismatales	<i>Pinus</i> spp.
<i>Magnaporthiopsis maydis</i>	Sordariomycetes: Magnaporthaceae	<i>Zea mays</i>
<i>Marasmius palmivorus</i>	Basidiomycetes: Agaricales	<i>Ananas comosus</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Elaeis guineensis</i> , <i>Hevea brasiliensis</i> , <i>Musa acuminata</i>
<i>Melampsora farlowii</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	<i>Tsuga</i> spp.
<i>Melampsora medusae</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	<i>Populus</i> spp., <i>Pinus</i> spp., <i>Larix</i> spp., <i>Pseudotsuga menziesii</i>
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i>	Basidiomycetes: Uredinales	<i>Abies</i> spp.
<i>Melanomma glumarum</i>	Ascomycetes: Pleosporales	<i>Oryza sativa</i>
<i>Microbotryum violaceum</i>	Basidiomycetes: Microbotryales	Caryophyllaceae
<i>Microdochium panattonianum</i>	Hongo anamórfico	<i>Lactuca sativa</i> , <i>Cichorium endivia</i>
<i>Microstroma juglandis</i>	Ustilaginomycetes: Microstromatales	<i>Juglans</i> spp.
<i>Monilinia fructigena</i>	Ascomycetes: Helotiales	Amplio rango de hospedante: Frutales de pepita y carozo

* Las especies detalladas en la columna "hospedante", no son las únicas que pueden ser afectadas por las plagas.

* Esta lista no excluye a otras plagas que pudieran ser consideradas como cuarentenarias, posterior a la fecha de publicación del presente listado.

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**SENASA**
PERU**LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU**

Nombre Científico	Taxonomía	Hospedante
<i>Monilinia laxa</i>	Ascomycetes: Helotiales	<i>Prunus</i> spp.
<i>Monilinia vaccinii-corymbosi</i>	Ascomycetes: Helotiales	<i>Vaccinium</i> spp.
<i>Monographella nivalis</i>	Ascomycetes: Xylariales	Poaceae
<i>Mycosphaerella brassicicola</i>	Ascomycetes: Capnodiales	Brassicaceae
<i>Mycosphaerella chrysanthemi</i>	Ascomycetes: Mycosphaerellales	<i>Chrysanthemum indicum</i>
<i>Mycosphaerella confusa</i>	Ascomycetes: Mycosphaerellales	<i>Rubus</i> spp.
<i>Mycosphaerella cryptica</i>	Ascomycetes: Mycosphaerellales	<i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Mycosphaerella dearnessii</i>	Ascomycetes: Mycosphaerellales	<i>Pinus</i> spp., <i>Picea glauca</i>
<i>Mycosphaerella dendroides</i>	Dothideomycetes: Capnodiales	<i>Carya illinoensis</i> , <i>Carya tomentosa</i>
<i>Mycosphaerella gibsonii</i>	Ascomycetes: Mycosphaerellales	<i>Pinus</i> spp.
<i>Mycosphaerella graminicola</i>	Ascomycetes: Mycosphaerellales	<i>Oryza sativa</i>
<i>Mycosphaerella nubilosa</i>	Ascomycetes: Mycosphaerellales	<i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Mycosphaerella pistacina</i>	Dothideomycetes: Capnodiales	<i>Pistacia vera</i>
<i>Mycosphaerella rabiei</i>	Ascomycetes: Pleosporales	<i>Cicer arietinum</i> , <i>Medicago sativa</i> , <i>Pisum sativum</i> , <i>Trifolium repens</i> , <i>Vigna unguiculatum</i>
<i>Natrassia mangiferae</i>	Dothideomycetes: Botryosphaeriales	<i>Vitis vinifera</i> , <i>Mangifera indica</i>
<i>Nectria cinnabarina</i>	Ascomycetes: Hypocreales	<i>Rosa</i> spp.
<i>Neofabraea alba</i>	Ascomycetes: Helotiales	<i>Malus</i> spp., <i>Olea europaea</i>
<i>Neofusicoccum arbuti</i>	Dothideomycetes: Botryosphaeriales	<i>Vaccinium corymbosum</i>
<i>Neofusicoccum corticosae</i>	Dothideomycetes: Botryosphaeriales	<i>Vaccinium corymbosum</i> , <i>Eucalyptus cartiosa</i>
<i>Neofusicoccum luteum</i>	Dothideomycetes: Botryosphaeriales	<i>Vitis vinifera</i> , <i>Persea americana</i> , <i>Vaccinium corymbosum</i> , <i>Eucalyptus cartiosa</i> , <i>Diospyros kaki</i>
<i>Neofusicoccum mediterraneum</i>	Dothideomycetes: Botryosphaeriales	<i>Vaccinium corymbosum</i> , <i>Juglans regia</i> , <i>Olea europaea</i>
<i>Neofusicoccum nonquasitum</i>	Dothideomycetes: Botryosphaeriales	<i>Vaccinium corymbosum</i> , <i>Prunus dulcis</i>
<i>Neonectria ditissima</i> (= <i>Nectria galligena</i>)	Ascomycetes: Hypocreales	<i>Malus doméstica</i> , <i>Pirus communis</i> , <i>Rosa</i> spp., <i>Juglans regia</i> , <i>Carya illinoensis</i> , <i>Corylus avellana</i>
<i>Neonectria liriodendri</i>	Ascomycetes: Hypocreales	<i>Vitis vinifera</i>
<i>Neotyphodium coenophialum</i>	Ascomycetes: Hypocreales	<i>Festuca arundinacea</i>
<i>Oidium heveae</i>	Leotiomycetes: Erysiphales	<i>Hevea brasiliensis</i>
<i>Oidium hortensiae</i>	Hongo anamórfico	<i>Hydrangea macrophylla</i>
<i>Oidium tingitaninum</i>	Hongo anamórfico	<i>Citrus</i> spp.
<i>Olpidium brassicae</i>	Chytridiomycetes: Spizellomycetales	Amplio rango de hospedantes: <i>Capsicum annum</i> , <i>Solanum lycopersicum</i>
<i>Passalora rubrotincta</i>	Ascomycetes: Mycosphaerellales	<i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i>
<i>Pestalotia diospyri</i>	Ascomycetes: Xylariales	<i>Diospyros kaki</i>
<i>Pezicula malicorticis</i>	Ascomycetes: Helotiales	Frutales de pepita: <i>Cydonia oblonga</i> , <i>Malus doméstica</i> , <i>Pyrus communis</i>

* Las especies detalladas en la columna "hospedante", no son las únicas que pueden ser afectadas por las plagas.

* Esta lista no excluye a otras plagas que pudieran ser consideradas como cuarentenarias, posterior a la fecha de publicación del presente listado.

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**SENASA**
PERU**LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU**

Nombre Científico	Taxonomía	Hospedante
<i>Phacidiopycnis washingtonensis</i>	Leotiomycetes: Rhystimataceae	Frutales de pepita: <i>Cydonia oblonga</i> , <i>Malus doméstica</i> , <i>Pyrus communis</i>
<i>Phaeolus schweinitzii</i>	Basidiomycetes: Polyporales	<i>Abies alba</i> , <i>Larix kaempferi</i> , <i>Picea sitchensis</i> , <i>Pinus</i> spp.
<i>Phaeoseptoria musae</i>	Hongo anamórfico	<i>Heliconia</i> spp., <i>Musa</i> spp.
<i>Phakopsora meibomiaae</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	Amplio rango de hospedantes
<i>Phakopsora pachyrhizi</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	Amplio rango de hospedantes
<i>Phellinus noxius</i>	Basidiomycetes: Hymenochaetales	<i>Vitis vinifera</i>
<i>Phellinus weirii</i>	Basidiomycetes: Hymenochaetales	<i>Abies concolor</i> , <i>Abies grandis</i> , <i>Abies nephrolepis</i> , <i>Pseudotsuga menziesii</i> , <i>Thuja plicata</i>
<i>Phialophora cinerescens</i>	Hongo anamórfico	<i>Dianthus caryophyllus</i>
<i>Phoma costarricensis</i>	Ascomycetes: Pleosporales	<i>Coffea</i> spp.
<i>Phoma macdonaldii</i>	Dothideomycetes: Pleosporales	<i>Helianthus annuus</i>
<i>Phoma tracheiphila</i>	Hongo anamórfico	<i>Citrus</i> spp.
<i>Phomopsis longicolla</i>	Sordariomycetes: Diaporthales	<i>Pisum sativum</i>
<i>Phomopsis mangiferae</i>	Sordariomycetes: Diaporthales	<i>Mangifera indica</i>
<i>Phomopsis obscurans</i>	Sordariomycetes: Diaporthales	<i>Fragaria ananassa</i>
<i>Phomopsis vexans</i>	Sordariomycetes: Diaporthales	Rosaceae: <i>Prunus armeniaca</i> , <i>P. salicina</i> , <i>P. avium</i> Solanaceae: <i>Capsicum annuum</i>
<i>Phomopsis viticola</i>	Sordariomycetes: Diaporthales	<i>Vitis</i> spp.
<i>Phragmidium rubi-idaei</i>	Urediniomycetes: Uredinales	<i>Rubus idaeus</i>
<i>Phragmidium violaceum</i>	Urediniomycetes: Uredinales	<i>Rubus</i> spp.
<i>Phyllosticta citricarpa</i> (=Guignardia citricarpa)	Hongo anamórfico	<i>Citrus</i> spp.
<i>Phyllosticta solitaria</i>	Hongo anamórfico	<i>Malus doméstica</i>
<i>Phymatotrichopsis omnivora</i>	Hongo anamórfico	Amplio rango de hospedantes Forestales: <i>Populus</i> spp., <i>Salix</i> spp., <i>Ulmus</i> spp.
<i>Podosphaera fusca</i>	Ascomycetes: Erysiphales	<i>Gerbera</i> sp.
<i>Podosphaera tridactyla</i>	Ascomycetes: Erysiphales	<i>Prunus</i> spp.
<i>Polymyxa graminis</i>	Plasmodiophoromycetes: Plasmodiophorales	Poaceae
<i>Polyscytalum pustulans</i>	Hongo anamórfico	<i>Solanum tuberosum</i>
<i>Pseudocercospora angolensis</i>	Hongo anamórfico	<i>Citrus</i> spp.
<i>Pseudocercospora eumusae</i>	Hongo anamórfico	<i>Musa acuminata</i>
<i>Pseudocercospora fuligena</i>	Hongo anamórfico	Solanaceae: <i>Solanum lycopersicum</i>
<i>Pseudocercospora capsellae</i>	Hongo anamórfico	Brassicaceae
<i>Pseudopeziza tracheiphila</i>	Ascomycetes: Helotiales	<i>Vitis</i> spp.
<i>Puccinia cacabata</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	<i>Gossypium hirsutum</i>
<i>Pucciniastrum americanum</i>	Pucciniomycetes: Pucciniales	<i>Rubus idaeus</i>

* Las especies detalladas en la columna "hospedante", no son las únicas que pueden ser afectadas por las plagas.

* Esta lista no excluye a otras plagas que pudieran ser consideradas como cuarentenarias, posterior a la fecha de publicación del presente listado.

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**SENASA**
PERU**LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU**

Nombre Científico	Taxonomía	Hospedante
<i>Pyrenophora dictyoides</i>	Ascomycetes: Pleosporales	<i>Lolium</i> spp., <i>Festuca</i> spp.
<i>Pyrenophora seminiperda</i>	Ascomycetes: Pleosporales	Poaceae
<i>Raffaelea lauricola</i>	Ascomycetes: Ophiostomatales	Lauraceae: <i>Persea americana</i>
<i>Ramulispora sorghi</i>	Hongo anamórfico	<i>Sorghum</i> spp.
<i>Remotididymella destructiva</i>	Ascomycetes: Pleosporales	<i>Capsicum annuum</i>
<i>Rosellinia arcuata</i>	Ascomycetes: Xylariales	<i>Camellia sinensis</i> , <i>Coffea</i> , <i>Hevea brasiliensis</i> , <i>Theobroma cacao</i>
<i>Rosellinia necatrix</i>	Ascomycetes: Xylariales	Amplio rango de hospedante: <i>Olea europaea</i> , <i>Malus</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Fragaria</i> spp., <i>Ficus</i> spp., <i>Prunus</i> spp.
<i>Sclerotinia borealis</i>	Ascomycetes: Helotiales	Poaceae
<i>Sclerotinia minor</i>	Ascomycetes: Helotiales	Amplio rango de hospedantes: <i>Apium graveolens</i> , <i>Arachis hypogaea</i> , <i>Lactuca sativa</i> , <i>Pisum sativum</i> y <i>Corylus avellana</i>
<i>Sclerotium coffeicola</i>	Ascomycetes: Helotiales	<i>Coffea</i> spp., <i>Passiflora ligularis</i> , <i>Annona muricata</i> , <i>Mangifera indica</i>
<i>Septocytia ruborum</i>	Ascomycetes: Incertae sedis	<i>Rubus</i> spp.
<i>Septoria albopunctata</i>	Dothideomycetes: Capnodiales	<i>Vaccinium</i> spp., <i>Rhododendron minus</i> .
<i>Septoria dianthi</i>	Hongo anamórfico	<i>Dianthus</i> spp.
<i>Septoria dianthicola</i>	Hongo anamórfico	<i>Dianthus</i> spp.
<i>Septoria gladioli</i>	Hongo anamórfico	<i>Gladiolus</i> spp., <i>Freesia hybrida</i> , <i>Crocus</i> spp.
<i>Septoria pistaciae</i>	Hongo anamórfico	<i>Pistacia vera</i>
<i>Septoria rubi</i>	Ascomycetes: Mycosphaerellales	<i>Rubus</i> spp.
<i>Sirosporium diffusum</i>	Dothideomycetes: Capnodiales	<i>Carya illinoensis</i>
<i>Sphaceloma arachidis</i>	Hongo anamórfico	<i>Arachis hypogaea</i>
<i>Sphaeropsis sapinea</i>	Ascomycetes: Lecanorales	<i>Pinus</i> sp.
<i>Sphaerulina phalaenopsidis</i>	Ascomycetes: Mycosphaerellales	<i>Pinus</i> sp.
<i>Stemphylium solani</i>	Ascomycetes: Pleosporales	<i>Solanum lycopersicum</i>
<i>Stereum hirsutum</i>	Basidiomycetes: Russulales	<i>Vitis</i> spp.
<i>Stromatinia gladioli</i>	Ascomycetes: Helotiales	<i>Gladiolus</i> spp.
<i>Taphrina armeniaca</i>	Taphrinomycetes: Taphrinales	<i>Prunus armenica</i>
<i>Thanatephorus theobromae</i>	Basidiomycetes: Cantharellales	<i>Theobroma cacao</i>
<i>Tilletia controversa</i>	Basidiomycetes: Tilletiales	<i>Agropyron</i> spp., <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Secale cereale</i> , <i>Triticum</i> spp.
<i>Tilletia horrida</i>	Ustilaginomycetes: Tilletiales	<i>Oryza sativa</i>
<i>Tilletia indica</i>	Basidiomycetes: Tilletiales	<i>Triticum</i> spp.
<i>Uredo oncidii</i>	Hongo anamórfico	<i>Cattleya dowiana</i> , <i>Oncidium cavendishianum</i> .
<i>Urocystis agropyri</i>	Basidiomycetes: Urocystidiales	<i>Triticum</i> spp.
<i>Urocystis gladiolicola</i>	Basidiomycetes: Urocystidiales	<i>Gladiolus</i> spp.

* Las especies detalladas en la columna "hospedante", no son las únicas que pueden ser afectadas por las plagas.

* Esta lista no excluye a otras plagas que pudieran ser consideradas como cuarentenarias, posterior a la fecha de publicación del presente listado.

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**SENASA**
PERU**LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU**

Nombre Científico	Taxonomía	Hospedante
<i>Uromyces transversalis</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	<i>Gladiolus</i> spp., <i>Crocasmia</i> spp.
<i>Verticillium tricorpus</i>	Ascomycetes: Incertae sedis	<i>Solanum tuberosum</i>
<i>Xenodidymella applanata</i> (= <i>Didymella applanata</i>)	Ascomycetes: Pleosporales	<i>Rubus</i> spp.

VIRUS/VIROIDES Y ORGANISMOS PARECIDOS

Nombre Científico	Taxonomía	Hospedante
<i>Alstroemeria mosaic virus</i> (= <i>Potyvirus alstroemeriae</i>)	Patatavirales: Potyviridae	<i>Alstroemeria</i> spp.
<i>Apple stem grooving virus</i> (= <i>Capillovirus mali</i>)	Tymovirales: Betaflexiviridae	<i>Citrus</i> spp, <i>Lilium</i> spp. Rosaceae: <i>Malus</i> spp. <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
<i>Apple stem pitting virus</i> (= <i>Foveavirus mali</i>)	Tymovirales: Betaflexiviridae	<i>Malus</i> spp., <i>Pyrus communis</i> , <i>Crataegus</i> spp., <i>Sorbus</i>
<i>Arabis mosaic virus</i> (= <i>Nepovirus arabis</i>)	Picornavirales: Secoviridae	Amplio rango de hospedantes
<i>Artichoke italian latent virus</i> (= <i>Nepovirus italiaense</i>)	Picornavirales: Secoviridae	<i>Cynara scolymus</i>
<i>Artichoke mottled crinkle virus</i> (= <i>Tombusvirus cynarae</i>)	Tolivirales: Tombusviridae	<i>Cynara scolymus</i>
<i>Artichoke yellow ringspot virus</i> (= <i>Nepovirus cynarae</i>)	Picornavirales: Secoviridae	<i>Cynara scolymus</i>
<i>Asparagus virus 2</i> (= <i>Ilarvirus AV2</i>)	Martellivirales: Bromoviridae	<i>Asparagus officinalis</i>
<i>Banana bract mosaic virus</i> (= <i>Potyvirus musae</i>)	Patatavirales: Potyviridae	<i>Musa</i> spp.
<i>Banana bunchy top virus</i> (= <i>Babuvirus musae</i>)	Mulpavirales: Nanoviridae	<i>Musa</i> spp.
<i>Bean golden mosaic virus</i> (= <i>Begomovirus costai</i>)	Geplafuvirales: Geminiviridae	<i>Glycine max</i> , <i>Phaseolus</i> spp.
<i>Beet curly top virus</i> (= <i>Curtovirus betae</i>)	Geplafuvirales: Geminiviridae	<i>Beta vulgaris</i> , <i>Beta vulgaris</i> var. <i>saccharifera</i> , <i>Capsicum annuum</i> , <i>C. frutescens</i> , <i>Cucumis sativus</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Solanum lycopersicum</i> , <i>Vigna unguiculata</i>
<i>Beet pseudo-yellows virus</i> (= <i>Crinivirus pseudobetae</i>)	Martellivirales: Closteroviridae	<i>Beta vulgaris</i> , <i>Cucumis sativus</i> , <i>Cucurbita maxima</i> , <i>Cucurbita pepo</i> , <i>Fragaria ananassa</i> , <i>Rubus</i> spp.
<i>Blackberry calico virus</i>	Flexiviridae: Carlavirus	<i>Rubus</i> spp.
<i>Blackberry chlorotic ringspot virus</i> (= <i>Ilarvirus BCRV</i>)	Martellivirales: Bromoviridae	<i>Rubus</i> sp.; <i>Rosa</i> sp.; <i>Malus domestica</i>
<i>Blackberry virus Y</i> (= <i>Brambyvirus rubi</i>)	Patatavirales: Potyviridae	<i>Rubus idaeus</i>
<i>Blackberry yellow vein - associated virus</i> (= <i>Crinivirus rubi</i>)	Martellivirales: Closteroviridae	<i>Rubus</i> spp.
<i>Black raspberry necrosis virus</i> (= <i>Sadwavirus rubi</i>)	Picornavirales: Secoviridae	<i>Rubus</i> sp.
<i>Blueberry latent virus</i> (= <i>Amalgavirus vaccinii</i>)	Durnavirales: Amalgaviridae	<i>Vaccinium</i> spp.
<i>Blueberry leaf mottle virus</i> (= <i>Nepovirus myrtilli</i>)	Picornavirales: Secoviridae	<i>Vaccinium corymbosum</i>
<i>Blueberry mosaic virus</i>	No asignado	<i>Vaccinium corymbosum</i>

* Las especies detalladas en la columna "hospedante", no son las únicas que pueden ser afectadas por las plagas.

* Esta lista no excluye a otras plagas que pudieran ser consideradas como cuarentenarias, posterior a la fecha de publicación del presente listado.

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**SENASA**
PERU**LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU**

Nombre Científico	Taxonomía	Hospedante
<i>Blueberry necrotic ring blotch virus</i> (=Blunervirus vaccinii)	Martellivirales: Kitaviridae	<i>Vaccinium</i> spp.
<i>Blueberry red ringspot virus</i> (=Soymovirus maculavaccinii)	Ortervirales: Caulimoviridae	<i>Vaccinium corymbosum</i>
<i>Blueberry scorch virus</i> (=Carlavirus vaccinii)	Tymovirales: Betaflexiviridae	<i>Vaccinium corymbosum</i>
<i>Blueberry shock virus</i> (=Ilarvirus BSV)	Martellivirales: Bromoviridae	<i>Vaccinium corymbosum</i>
<i>Blueberry shoestring virus</i> (=Sobemovirus BSSV)	Sobelivirales: Solemoviridae	<i>Vaccinium</i> spp.
<i>Blueberry virus A</i> (=Bluvavirus vaccinii)	Martellivirales: Closteroviridae	<i>Vaccinium</i> spp.
<i>Broad bean stain virus</i> (=Comovirus viciae)	Picornavirales: Secoviridae	<i>Vicia faba</i>
<i>Broad bean wilt virus</i> (=Fabavirus alphaviciae)	Picornavirales: Secoviridae	Amplio rango de hospedantes
<i>Cacao swollen shoot virus</i> (=Badnavirus etainflatheobromae)	Ortervirales: Caulimoviridae	<i>Theobroma cacao</i> , <i>Ceiba pentandra</i>
<i>Cactus virus X</i> (=Potexvirus eyscaeti)	Tymovirales: Alphaflexiviridae	<i>Hylocereus</i> spp.
<i>Carnation latent virus</i> (=Carlavirus latensdianthi)	Tymovirales: Betaflexiviridae	<i>Dianthus</i> spp.
<i>Carnation ringspot virus</i> (=Dianthovirus dianthi)	Tolivirales: Tombusviridae	<i>Dianthus</i> spp., <i>Malus sylvestris</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus communis</i>
<i>Carnation vein mottle virus</i> (=Potyvirus dianthi)	Patatavirales: Potyviridae	<i>Dianthus</i> spp.
<i>Cassava mosaic disease</i>	Geminiviridae: Begomovirus	<i>Manihot esculenta</i> , <i>Ricinus communis</i>
<i>Cherry green ring mottle virus</i> (=Robigovirus viridiavii)	Tymovirales: Betaflexiviridae	<i>Prunus</i> spp.
<i>Cherry leaf roll virus</i> (=Nepovirus avii)	Picornavirales: Secoviridae	<i>Betula pendula</i> , <i>Cornus florida</i> , <i>Fagus sylvatica</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Juglans regia</i> , <i>Ligustrum</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Ptelea trifoliata</i> , <i>Rubus procerus</i> , <i>Sambucus canadensis</i> , <i>Sambucus racemosa</i> , <i>Syringa vulgaris</i> , <i>Ulmus americana</i>
<i>Cherry necrotic rusty mottle virus</i> (=Robigovirus necroavii)	Tymovirales: Betaflexiviridae	<i>Prunus</i> spp.
<i>Cherry rasp leaf virus</i> (=Cheravirus avii)	Picornavirales: Secoviridae	<i>Prunus</i> spp., <i>Malus domestica</i>
<i>Cherry rusty mottle disease</i> (=Robigovirus robigomaculae)	Tymovirales: Betaflexiviridae	<i>Prunus avium</i>
<i>Cherry virus A</i>	Flexiviridae: Capillovirus	<i>Prunus</i> spp.
<i>Chrysanthemum stunt viroid</i> (=Pospiviroid impedichrysanthemi)	Viroid: Pospiviroidae	<i>Chrysanthemum</i> spp.
<i>Citrus blight disease</i> (=Citrus blight agent)	No asignado	<i>Citrus</i> spp.
<i>Citrus cristicortis disease</i> (=Citrus cristicortis agent)	No asignado	<i>Citrus</i> spp.
<i>Citrus impietratura disease</i> (=Citrus impietratura agent)	No asignado	<i>Citrus</i> spp.

* Las especies detalladas en la columna "hospedante", no son las únicas que pueden ser afectadas por las plagas.

* Esta lista no excluye a otras plagas que pudieran ser consideradas como cuarentenarias, posterior a la fecha de publicación del presente listado.

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**SENASA**
PERU**LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU**

Nombre Científico	Taxonomía	Hospedante
<i>Citrus leaf blotch virus</i> (=Citricivirus citri)	Tymovirales: Betaflexiviridae	Amplio rango de hospedantes: Cítricos, <i>Actinidia deliciosa</i> , <i>Averrhoa carambola</i> , <i>Fortunella margarita</i> , <i>Malus x micromalus</i> , <i>Morus alba</i> , <i>Nandina domestica</i> , <i>Paeonia lactiflora</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Viburnum lentago</i>
<i>Citrus leprosis virus</i> (=Cilevirus leprosis)	Martellivirales: Kitaviridae	<i>Citrus deliciosa</i> , <i>Citrus reshni</i> , <i>Citrus reticulata</i> , <i>Citrus sinensis</i> .
<i>Citrus yellow mosaic virus</i> (=Badnavirus tesselllocitri)	Ortevirales: Caulimoviridae	<i>Citrus</i> spp., <i>Aegle marmelos</i> , <i>Fortunella</i> , <i>Saccharum officinarum</i>
<i>Coconut cadang-cadang viroid</i> (=Cocadviroid cadangi)	Viroid: Pospiviroidae	<i>Cocos nucifera</i> , <i>Elaeis guineensis</i> , <i>Phoenix dactylifera</i> .
<i>Coffee ringspot virus</i> (=Dichorhavirus coffeae)	Mononegavirales: Rhabdoviridae	<i>Coffea arabica</i> , <i>Coffea canephora</i> , <i>Coffea liberica</i>
<i>Cotton anthocyanosis virus</i>	Luteoviridae: Luteovirus	<i>Gossypium</i> spp., <i>Abelmoschus esculentus</i> , <i>Hibiscus cannabinus</i>
<i>Cotton leaf crumple virus</i> (=Begomovirus gossypii)	Geplafuvirales: Geminiviridae	<i>Gossypium</i> spp.
<i>Cowpea aphid-borne mosaic virus</i> (=Potyvirus vignae)	Patatavirales: Potyviridae	Cucurbitaceae, <i>Prunus armeniaca</i>
<i>Cucumber green mottle mosaic virus</i> (=Tobamovirus viridimaculae)	Martellivirales: Virgaviridae	<i>Canavalia rosea</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Pachyrhizus erosus</i> , <i>Passiflora edulis</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Pisum sativum</i> , <i>Vigna radiata</i> , <i>V. unguiculata</i> , <i>V. unguiculata</i> subsp. <i>unguiculata</i> , <i>Voandzeia subterranea</i>
<i>Cymbidium ringspot virus</i> (=Tombusvirus cymbidii)	Tolivirales: Tombusviridae	<i>Cymbidium</i> spp., <i>Trifolium repens</i>
<i>Dasheen mosaic virus</i> (=Potyvirus dasheenii)	Patatavirales: Potyviridae	Araceae
<i>East Asian passiflora virus</i> (=Potyvirus orionspassiflorae)	Patatavirales: Potyviridae	<i>Passiflora edulis</i>
<i>Fiji disease virus</i> (=Fijivirus fijiense)	Reovirales: Reoviridae	<i>Saccharum officinarum</i> .
<i>Freesia mosaic virus</i> (=Potyvirus freesiae)	Patatavirales: Potyviridae	<i>Fressia</i> spp., <i>Alstroemeria</i> spp.
<i>Grapevine chrome mosaic virus</i> (=Nepovirus chromosivum)	Picornavirales: Secoviridae	<i>Vitis</i> spp., <i>Apium graveolens</i>
<i>Grapevine Pinot gris virus</i> (Trichovirus pinovitis)	Tymovirales: Betaflexiviridae	<i>Vitis vinifera</i>
<i>Grapevine red globe virus</i>	Tymoviridae: Maculavirus	<i>Vitis vinifera</i>
<i>Grapevine rupestris stem pitting-associated virus</i> (=Foveavirus rupestris)	Tymovirales: Betaflexiviridae	<i>Vitis vinifera</i>
<i>Grapevine rupestris vein feathering virus</i>	Flexiviridae: Foveavirus	<i>Vitis</i> spp.
<i>Grapevine Syrah virus-I</i> (=Marafivirus syrahense)	Tymovirales: Tymoviridae	<i>Vitis vinifera</i>
<i>Grapevine virus B</i> (=Vitivirus betavitis)	Tymovirales: Betaflexiviridae	<i>Vitis vinifera</i>
<i>Grapevine virus D</i> (=Vitivirus deltavitis)	Tymovirales: Betaflexiviridae	<i>Vitis vinifera</i>
<i>High plains virus</i> (=Emaravirus tritici)	Elliovirales: Fimoviridae	Poaceae: <i>Avena sativa</i> , <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Secale cereale</i> , <i>Triticum aestivum</i> , <i>Zea mays</i>

* Las especies detalladas en la columna "hospedante", no son las únicas que pueden ser afectadas por las plagas.

* Esta lista no excluye a otras plagas que pudieran ser consideradas como cuarentenarias, posterior a la fecha de publicación del presente listado.

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**SENASA**
PERU**LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU**

Nombre Científico	Taxonomía	Hospedante
<i>Hydrangea ringspot virus</i> (=Potexvirus hydrangeae)	Tymovirales: Alphaflexiviridae	<i>Hydrangea macrophylla</i>
<i>Impatiens necrotic spot virus</i> (=Orthotospovirus impatiensnecromaculae)	Elliovirales: Tospoviridae	<i>Arachis hypogaea</i> , <i>Capsicum</i> spp., <i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Cucumis sativus</i> , <i>Impatiens</i> spp., <i>Lactuca sativa</i> , <i>Solanum lycopersicum</i>
<i>Konjac mosaic virus</i> (=Potyvirus konjac)	Patatavirales: Potyviridae	<i>Colocasia esculenta</i> , <i>Caladium</i> spp., <i>Dieffenbachia</i> spp.
<i>Leek yellow stripe virus</i> (=Potyvirus ampeloprasii)	Patatavirales: Potyviridae	<i>Allium sativum</i>
<i>Little cherry virus</i> (=Velarivirus nanoavii)		<i>Prunus</i> spp.
<i>Maize streak virus</i> (=Mastrevirus storeyi)	Geplafuvirales: Geminiviridae	<i>Avena sativa</i> , <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Saccharum</i> <i>officinatum</i> , <i>Secale cereale</i> , <i>Sorghum bicolor</i> , <i>Triticum</i> <i>aestivum</i> , <i>Zea mays</i>
<i>Orchid fleck dichorhavirus</i> (=Dichorhavirus orchidaceae)	Mononegavirales: Rhabdoviridae	<i>Dendrobium</i> spp., <i>Phalaenopsis</i> spp.
<i>Ornithogalum mosaic virus</i> (= Potyvirus ornithogalitesellati)	Potyviridae: Potyvirus	Bulbos de ornitólogo (<i>Ornithogalum dubium</i>)
<i>Pea early-browning virus</i> (=Tobravirus pisi)	Martellivirales: Virgaviridae	Fabaceae
<i>Peach latent mosaic viroid</i> (=Pelamoviroid latenspruni)	Viroid: Avsunviroidae	<i>Prunus</i> spp.
<i>Peach mosaic virus</i> (=Trichovirus persicae)	Tymovirales: Betaflexiviridae	<i>Prunus</i> spp.
<i>Peach rosette mosaic virus</i> (=Nepovirus persicae)	Picornavirales: Secoviridae	<i>Prunus persica</i> , <i>Vitis</i> spp., <i>Vaccinium corymbosum</i>
<i>Peach wart disease</i> (=Trichovirus maculavii)	Tymovirales: Betaflexiviridae	<i>Prunus</i> spp.
<i>Peanut mottle virus</i> (=Potyvirus arachidis)	Patatavirales: Potyviridae	<i>Arachis hypogaea</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Phaseolus</i> spp., <i>Pisum</i> spp.
<i>Peanut stripe virus</i> (=Potyvirus phaseovulgaris)	Patatavirales: Potyviridae	Fabaceae: <i>Arachis hypogaea</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Lupinus</i> <i>albus</i> , <i>Medicago sativa</i> , <i>Vigna</i> spp., <i>Sesamum indicum</i>
<i>Peanut stunt virus</i> (=Cucumovirus PSV)	Martellivirales: Bromoviridae	Fabaceae: <i>Arachis hypogaea</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Lupinus</i> spp., <i>Trifolium</i> spp., <i>Vicia faba</i> , <i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp., <i>Pisum sativum</i> , <i>Medicago sativa</i> , <i>Tephrosia</i> spp., <i>Securigera varia</i> Solanaceae: <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Solanum</i> <i>lycopersicum</i> , <i>Datura stramonium</i>
<i>Pelargonium zonate spot virus</i> (=Anulavirus PZSV)	Martellivirales: Bromoviridae	<i>Cynara scolymus</i>
<i>Pepper ringspot virus</i> (=Tobravirus capsici)	Martellivirales: Virgaviridae	Solanaceae: <i>Capsicum annuum</i> , <i>Solanum lycopersicum</i>
<i>Petunia asteroid mosaic virus</i> (=Tombusvirus petuniae)	Tolivirales: Tombusviridae	<i>Vitis vinifera</i>
<i>Plum pox virus</i> (=Potyvirus plumpoxi)	Patatavirales: Potyviridae	<i>Prunus</i> spp., <i>Juglans regia</i> .
<i>Potato virus M</i> (=Carlavirus misolani)	Tymovirales: Betaflexiviridae	<i>Solanum tuberosum</i>
<i>Prune dwarf virus</i> (=Ilarvirus PDV)	Martellivirales: Bromoviridae	<i>Prunus</i> spp.
<i>Raspberry bushy dwarf virus</i> (=Idaeovirus rubi)	Martellivirales: Mayoviridae	<i>Rubus</i> spp.

* Las especies detalladas en la columna "hospedante", no son las únicas que pueden ser afectadas por las plagas.

* Esta lista no excluye a otras plagas que pudieran ser consideradas como cuarentenarias, posterior a la fecha de publicación del presente listado.

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**SENASA**
PERU**LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU**

Nombre Científico	Taxonomía	Hospedante
<i>Raspberry latent virus</i>	Reovirales: Reoviridae	<i>Rubus idaeus</i>
<i>Raspberry leaf curl virus</i>	No clasificado	<i>Rubus</i> spp.
<i>Raspberry leaf mottle virus</i> (= <i>Closterovirus macularubi</i>)	Martellivirales: Closteroviridae	<i>Rubus idaeus</i>
<i>Raspberry ringspot virus</i> (= <i>Nepovirus rubi</i>)	Picornavirales: Secoviridae	Amplio rango de hospedantes: <i>Fragaria ananassa</i> , <i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Narcissus</i> spp., <i>Prunus avium</i> , <i>Ribes</i> spp., <i>Rubus idaeus</i> , <i>Vitis</i> spp.
<i>Raspberry vein chlorosis cytorhabdovirus</i> (= <i>Alphacytorhabdovirus alfarubi</i>)	Lefavirales: Baculoviridae	<i>Rubus idaeus</i> , <i>Rubus fruticosus</i>
<i>Rice stripe necrosis virus</i> (= <i>Benyvirus oryzae</i>)	Hepelivirales: Benyviridae	<i>Oryza sativa</i>
<i>Rubus yellow net virus</i> (= <i>Badnavirus reterubi</i>)	Ortevirales: Caulimoviridae	<i>Rubus idaeus</i>
<i>Satsuma dwarf virus</i> (= <i>Sadwavirus citri</i>)	Picornavirales: Secoviridae	<i>Citrus</i> spp., <i>Fortunella</i> spp., <i>Poncirus trifoliata</i>
<i>Soybean mosaic virus</i> (= <i>Potyvirus glycitessellati</i>)	Patatavirales: Potyviridae	<i>Glycine max</i>
<i>Squash mosaic virus</i> (= <i>Comovirus cucurbitae</i>)	Picornavirales: Secoviridae	Cucurbitaceae
<i>Strawberry crinkle virus</i> (= <i>Alphacytorhabdovirus fragariarugosus</i>)	Lefavirales: Baculoviridae	<i>Fragaria</i> spp.
<i>Strawberry latent ringspot virus</i> (= <i>Stralarivirus fragariae</i>)	Picornavirales: Secoviridae	<i>Apium graveolens</i> , <i>Asparagus officinalis</i> , <i>Fragaria ananassa</i> , <i>Lilium</i> spp., <i>Narcissus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Rheum hybridum</i> , <i>Ribes</i> spp., <i>Rubus fruticosus</i> , <i>Trifolium repens</i> , <i>Vitis</i> spp.
<i>Strawberry necrotic shock virus</i> (= <i>Ilarvirus SNSV</i>)	Martellivirales: Bromoviridae	<i>Rubus idaeus</i>
<i>Strawberry vein banding virus</i> (= <i>Caulimovirus venafragariae</i>)	Ortervirales: Caulimoviridae	<i>Fragaria</i> spp.
<i>Sugarcane bacilliform virus</i> (= <i>Badnavirus gammasacchari</i>)	Ortevirales: Caulimoviridae	<i>Saccharum officinarum</i>
<i>Sugarcane mild mosaic virus</i>	No clasificado	<i>Saccharum officinarum</i>
<i>Tobacco mild green mosaic virus</i> (= <i>Tobamovirus mititessellati</i>)	Martellivirales: Virgaviridae	<i>Capsicum annuum</i>
<i>Tobacco necrosis virus</i>	Tolivirales: Tombusviridae	Amplio rango de hospedantes: <i>Cucumis sativus</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Tulipa</i> spp.
<i>Tobacco rattle virus</i> (= <i>Tobravirus tabaci</i>)	Martellivirales: Virgaviridae	Amplio rango de hospedantes: <i>Beta vulgaris</i> var. <i>saccharifera</i> , <i>Capsicum annuum</i> , <i>Gladiolus</i> spp., <i>Iris</i> spp., <i>Lilium candidum</i> , <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Secale cereale</i> , <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Tulipa</i> spp.
<i>Tomato black ring virus</i> (= <i>Nepovirus nigranuli</i>)	Picornavirales: Secoviridae	Amplio rango de hospedantes: <i>Beta vulgaris</i> var. <i>Saccharifera</i> , <i>Capsicum annuum</i> , <i>Gladiolus</i> spp., <i>Iris</i> spp., <i>Lilium candidum</i> , <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Secale cereale</i> , <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Tulipa</i> spp.
<i>Tomato leaf curl New Delhi virus</i> (= <i>Begomovirus solanumdelhiense</i>)	Geplafuvirales: Geminiviridae	Solanaceae: <i>Solanum lycopersicum</i> , <i>S. melongena</i> , <i>S. tuberosum</i> , <i>Capsicum annuum</i> , <i>C. frutescens</i> Cucurbitaceae: <i>Citrullus lanatus</i> , <i>Cucumis melo</i> , <i>C. sativus</i> , <i>Cucurbita moschata</i> , <i>C. pepo</i> , <i>Luffa cylindrica</i>

* Las especies detalladas en la columna "hospedante", no son las únicas que pueden ser afectadas por las plagas.

* Esta lista no excluye a otras plagas que pudieran ser consideradas como cuarentenarias, posterior a la fecha de publicación del presente listado.

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**SENASA**
PERU**LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU**

Nombre Científico	Taxonomía	Hospedante
<i>Tomato mottle mosaic virus</i> (=Tobamovirus maculatussellati)	Martellivirales: Virgaviridae	<i>Capsicum annum</i> , <i>Solanum lycopersicum</i>
<i>Tomato mottle virus</i> (=Begomovirus solanumvariati)	Geplafuvirales: Geminiviridae	<i>Lycopersicon</i> spp., <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i>
<i>Tomato yellow vein streak virus</i> (=Begomovirus solanumflavusvenae)	Geplafuvirales: Geminiviridae	<i>Solanum lycopersicum</i>
<i>Tulip breaking virus</i> (=Potyvirus tulipadefractum)	Patatavirales: Potyviridae	<i>Tulipa</i> spp, <i>Lilium</i> spp
<i>Tulip virus X</i> (=Potexvirus ecstulipae)	Tymovirales: Alphaflexiviridae	<i>Tulipa</i> sp.
<i>Turnip mosaic virus</i> (=Potyvirus rapae)	Patatavirales: Potyviridae	Cruciferae, Brassicaceae <i>Lactuca sativa</i> , <i>Cynara</i> spp., <i>Daucus carota</i> , <i>Vicia faba</i> , <i>Pisum sativum</i> .
<i>Wheat streak mosaic virus</i> (=Tritimovirus tritici)	Patatavirales: Potyviridae	Poaceae: <i>Triticum aestivum</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Avena sativa</i> , <i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Panicum capillare</i> , <i>Pennisetum glaucum</i> , <i>Sorghum bicolor</i> .
<i>White clover mosaic virus</i> (=Potexvirus trifolii)	Tymovirales: Alphaflexiviridae	<i>Trifolium pratense</i>
<i>Wineberry latent virus</i> (=Allexivirus epsilon-rubi)	Tymovirales: Alphaflexiviridae	<i>Rubus</i> spp.

GASTROPODOS

Nombre Científico	Taxonomía	Hospedante
<i>Bradybaena similis</i>	Eulotidae	Orquideas
<i>Cathaica fasciola</i>	Bradybaenidae	Amplio rango de hospedantes
<i>Laevicaulis alte</i>	Veronicellidae	Orquideas
<i>Succinea costaricana</i>	Succineidae	<i>Dracaena</i> spp.
<i>Theba pisana</i>	Helicidae	<i>Olea europaea</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Prunus avium</i> , <i>Triticum</i> spp., <i>Hordeum</i> spp., <i>Rosa</i> spp.

NEMATODOS

Nombre Científico	Taxonomía	Hospedante
<i>Anguina agrostis</i>	Tylenchida: Anguinidae	<i>Agrostis</i> spp., <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Festuca nigrescens</i> , <i>Lolium rigidum</i> , <i>Phleum pratense</i> , <i>Poa pratense</i>
<i>Anguina tritici</i>	Tylenchida: Anguinidae	<i>Triticum</i> spp., <i>Avena sativa</i> , <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Secale cereale</i>
<i>Aphelenchoides besseyi</i>	Aphelenchida: Aphelenchoididae	Amplio rango de hospedantes: <i>Fragaria ananassa</i> , <i>Oryza sativa</i>
<i>Aphelenchoides fragariae</i>	Aphelenchida: Aphelenchoididae	Amplio rango de hospedantes
<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i>	Aphelenchida: Aphelenchoididae	Amplio rango de hospedantes: <i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Dahlia</i> spp., <i>Fragaria ananassa</i>
<i>Aphelenchoides subtenuis</i>	Aphelenchida: Aphelenchoididae	<i>Narcissus</i> spp.
<i>Belonolaimus longicaudatus</i>	Tylenchida: Belonolaimidae	<i>Vaccinium corymbosum</i>
<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>	Aphelenchida: Parasitaphelenchidae	<i>Pinus</i> spp., <i>Pseudotsuga menziesii</i> , <i>Abies</i> spp.
<i>Cacopaurus pestis</i>	Tylenchida: Pratylenchidae	<i>Syringa vulgaris</i> , <i>Populus nigra</i> , <i>Citrus aurantium</i> , <i>Juglans regia</i> , <i>Juglans</i> sp., <i>Malus sylvestris</i> .

* Las especies detalladas en la columna "hospedante", no son las únicas que pueden ser afectadas por las plagas.

* Esta lista no excluye a otras plagas que pudieran ser consideradas como cuarentenarias, posterior a la fecha de publicación del presente listado.

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**SENASA**
PERU**LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU**

Nombre Científico	Taxonomía	Hospedante
<i>Ditylenchus angustus</i>	Tylenchida: Anguinidae	<i>Oryza sativa</i>
<i>Ditylenchus destructor</i>	Tylenchida: Anguinidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Solanum tuberosum</i>
<i>Heterodera zeae</i>	Tylenchida: Heteroderidae	<i>Zea mays</i>
<i>Heterodera glycines</i>	Tylenchida: Heteroderidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Glycine max</i>
<i>Heterodera mani</i>	Tylenchida: Heteroderidae	Poaceae: <i>Triticum</i> spp., <i>Hordeum</i> spp.
<i>Hoplolaimus pararobustus</i>	Tylenchida: Hoplolaimidae	<i>Vitis vinifera</i>
<i>Longidorus</i> spp.	Dorylaimida: Longidoridae	Amplio rango de hospedantes
<i>Meloidogyne arabicida</i>	Tylenchida: Meloidogynidae	<i>Coffea arabica</i> , <i>Coffea canephora</i> , <i>Coffea liberica</i>
<i>Meloidogyne chitwoodi</i>	Tylenchida: Meloidogynidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Daucus carota</i> , <i>Solanum lycopersicum</i> , <i>Medicago sativa</i> , <i>Solanum tuberosum</i>
<i>Meloidogyne fallax</i>	Tylenchida: Meloidogynidae	<i>Daucus carota</i> , <i>Solanum tuberosum</i>
<i>Meloidogyne mali</i>	Tylenchida: Meloidogynidae	<i>Rubus idaeus</i> , <i>Rubus fruticosus</i>
<i>Meloidogyne minor</i>	Tylenchida: Meloidogynidae	<i>Solanum lycopersicum</i> , <i>Solanum tuberosum</i>
<i>Meloidogyne partityla</i>	Tylenchida: Meloidogynidae	<i>Carya illinoensis</i> , <i>Juglans regia</i>
<i>Mesocriconema xenoplax</i>	Tylenchida: Criconematidae	<i>Prunus</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
<i>Paratrichodorus minor</i>	Triplonchida: Trichodoridae	<i>Allium cepa</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Solanum lycopersicum</i> , <i>Sorghum bicolor</i> , <i>Triticum</i> , <i>Vigna unguiculata</i> , <i>Zea mays</i>
<i>Paratrichodorus porosus</i>	Triplonchida: Trichodoridae	Amplio rango de hospedantes
<i>Pratylenchus crenatus</i>	Tylenchida: Pratylenchidae	Amplio rango de hospedantes
<i>Pratylenchus fallax</i>	Tylenchida: Pratylenchidae	<i>Medicago sativa</i> , <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Trifolium</i> sp., <i>Zea mays</i> , <i>Avena sativa</i>
<i>Pratylenchus loosi</i>	Tylenchida: Pratylenchidae	<i>Vitis vinifera</i>
<i>Pratylenchus neglectus</i>	Tylenchida: Pratylenchidae	<i>Brassica</i> spp, <i>Fragaria ananasa</i> , <i>Malus</i> spp, <i>Medicago sativa</i> , <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Triticum</i> spp., <i>Zea mays</i> .
<i>Pratylenchus penetrans</i>	Tylenchida: Pratylenchidae	Amplio rango de hospedantes
<i>Pratylenchus scribneri</i>	Tylenchida: Pratylenchidae	<i>Fragaria ananasa</i>
<i>Pratylenchus thornei</i>	Tylenchida: Pratylenchidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Triticum</i> spp.
<i>Pratylenchus vulnus</i>	Tylenchida: Pratylenchidae	Amplio rango de hospedantes
<i>Xiphinema bakeri</i>	Dorylaimida: Xiphinematidae	Amplio rango de hospedantes
<i>Xiphinema diversicaudatum</i>	Dorylaimida: Xiphinematidae	Amplio rango de hospedantes
<i>Xiphinema italiae</i>	Dorylaimida: Xiphinematidae	<i>Vitis</i> spp., <i>Citrus aurantium</i>
<i>Xiphinema pachtaicum</i>	Dorylaimida: Xiphinematidae	<i>Vitis vinifera</i>
<i>Xiphinema vuittenezi</i>	Dorylaimida: Longidoridae	<i>Prunus</i>

* Las especies detalladas en la columna “hospedante”, no son las únicas que pueden ser afectadas por las plagas.

* Esta lista no excluye a otras plagas que pudieran ser consideradas como cuarentenarias, posterior a la fecha de publicación del presente listado.

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**SENASA**
PERU**LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU**

Nombre Científico	Taxonomía	Hospedante
<i>Zygotylenchus guevarai</i>	Tylenchida: Pratylenchidae	<i>Vitis vinifera</i>

MALEZAS

Nombre Científico	Taxonomía
<i>Abutilon theophrasti</i>	Malvaceae
<i>Aegilops cylindrica</i>	Poaceae
<i>Alhagi maurorum</i>	Fabaceae
<i>Allium vineale</i>	Liliaceae
<i>Alopecurus myosuroides</i>	Poaceae
<i>Amaranthus blitoides</i>	Amaranthaceae
<i>Amaranthus blitum</i>	Amaranthaceae
<i>Amaranthus graecizans</i>	Amaranthaceae
<i>Amaranthus retroflexus</i>	Amaranthaceae
<i>Ambrosia grayi</i>	Asteraceae
<i>Ambrosia psilostachya</i>	Asteraceae
<i>Ambrosia tomentosa</i>	Asteraceae
<i>Ambrosia trifida</i>	Asteraceae
<i>Anchusa arvensis</i>	Boraginaceae
<i>Anthemis cotula</i>	Asteraceae
<i>Apera spica-venti</i>	Poaceae
<i>Apocynum cannabinum</i>	Apocynaceae
<i>Arceuthobium spp.</i>	Viscaceae
<i>Arctotheca calendula</i>	Asteraceae
<i>Atriplex patula</i>	Amaranthaceae
<i>Bassia scoparia</i>	Amaranthaceae
<i>Bidens aurea</i>	Asteraceae
<i>Bidens frondosa</i>	Asteraceae
<i>Bifora radians</i>	Apiaceae
<i>Brassica tournefortii</i>	Brassicaceae
<i>Bromus madritensis</i>	Poaceae
<i>Bromus rubens</i>	Poaceae
<i>Bromus sterilis</i>	Poaceae
<i>Bromus tectorum</i>	Poaceae
<i>Cardaria chalapensis</i>	Brassicaceae
<i>Carduus acanthoides</i>	Asteraceae
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Asteraceae
<i>Carduus tenuiflorus</i>	Asteraceae
<i>Centaurea iberica</i>	Asteraceae
<i>Centaurea virgata</i>	Asteraceae
<i>Chenopodium polyspermum</i>	Amaranthaceae
<i>Cnicus benedictus</i>	Asteraceae
<i>Cuscuta</i> spp. (Excepto <i>C. acutiloba</i> , <i>C. americana</i> , <i>C. bella</i> , <i>C. cockerellii</i> , <i>C. corymbosa</i> , <i>C. foetida</i> , <i>C. globiflora</i> , <i>C. grandiflora</i> , <i>C. haughtii</i> , <i>C. hitchcockii</i> , <i>C. lucidicarpa</i> , <i>C. obtusifolia</i> , <i>C. odorata</i> var. <i>holwayana</i> , <i>C. odorata</i> var. <i>odorata</i> , <i>C. paitana</i> , <i>C. partita</i> , <i>C. peruviana</i> , <i>C. rubella</i> , <i>C. stenolepis</i> y <i>C. suaveolens</i>)	Cuscutaceae
<i>Echium plantagineum</i>	Boraginaceae

* Las especies detalladas en la columna "hospedante", no son las únicas que pueden ser afectadas por las plagas.

* Esta lista no excluye a otras plagas que pudieran ser consideradas como cuarentenarias, posterior a la fecha de publicación del presente listado.

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**SENASA**
PERU**LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU**

Nombre Científico	Taxonomía
<i>Echium vulgare</i>	Boraginaceae
<i>Elymus repens</i>	Poaceae
<i>Emex australis</i>	Polygonaceae
<i>Eragrostis plana</i>	Poaceae
<i>Euphorbia davidii</i>	Euphorbiaceae
<i>Euphorbia esula</i>	Euphorbiaceae
<i>Euphorbia helioscopia</i>	Euphorbiaceae
<i>Fumaria officinalis</i>	Fumariaceae
<i>Galium spurium</i>	Rubiaceae
<i>Helianthus ciliaris</i>	Asteraceae
<i>Heliotropium europaeum</i>	Boraginaceae
<i>Hibiscus trionum</i>	Malvaceae
<i>Hirschfeldia incana</i>	Brassicaceae
<i>Hordeum murinum</i> ssp. <i>leporinum</i>	Poaceae
<i>Imperata cylindrica</i>	Poaceae
<i>Iva xanthiifolia</i>	Asteraceae
<i>Lactuca tatarica</i>	Asteraceae
<i>Lepidium bonariense</i>	Brassicaceae
<i>Lepidium perfoliatum</i>	Brassicaceae
<i>Linaria dalmatica</i>	Scrophulariaceae
<i>Linaria vulgaris</i>	Scrophulariaceae
<i>Lolium rigidum</i>	Poaceae
<i>Moorochloa eruciformis</i>	Poaceae
<i>Murdannia nudiflora</i>	Commelinaceae
<i>Myagrurn perfoliatum</i>	Brassicaceae
<i>Najas graminea</i>	Najadaceae
<i>Najas marina</i>	Najadaceae
<i>Onopordum acanthium</i>	Asteraceae
<i>Orobancha</i> spp. (Excepto <i>O. tacnaensis</i> y <i>O. weberbaueri</i>)	Orobanchaceae
<i>Panicum capillare</i>	Poaceae
<i>Panicum coloratum</i>	Poaceae
<i>Panicum repens</i>	Poaceae
<i>Paspalum denticulatum</i>	Poaceae
<i>Paspalum hydrophilum</i>	Poaceae
<i>Pennisetum macrourum</i>	Poaceae
<i>Pennisetum pedicellatum</i>	Poaceae
<i>Phalaris paradoxa</i>	Poaceae
<i>Physalis longifolia</i> var. <i>subglabrata</i>	Solanaceae
<i>Polygonum argyrocoleon</i>	Polygonaceae
<i>Polygonum hydropiper</i>	Polygonaceae
<i>Reseda luteola</i>	Resedaceae
<i>Rhaponticum repens</i>	Asteraceae
<i>Saccharum spontaneum</i>	Poacea
<i>Salsola kali</i>	Amaranthaceae
<i>Salvia aethiopis</i>	Lamiaceae
<i>Schoenoplectus juncoideus</i>	Cyperaceae
<i>Schoenoplectiella mucronata</i>	Cyperaceae
<i>Scleranthus annuus</i>	Caryophyllaceae
<i>Senecio grisebachii</i>	Asteraceae
<i>Sicyos angulatus</i>	Cucurbitaceae
<i>Silene dichotoma</i>	Caryophyllaceae
<i>Silene latifolia</i> ssp. <i>alba</i>	Caryophyllaceae
<i>Sinapis arvensis</i>	Brassicaceae

* Las especies detalladas en la columna "hospedante", no son las únicas que pueden ser afectadas por las plagas.

* Esta lista no excluye a otras plagas que pudieran ser consideradas como cuarentenarias, posterior a la fecha de publicación del presente listado.

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**SENASA**
PERU**LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU**

Nombre Científico	Taxonomía
<i>Solanum carolinense</i>	Solanaceae
<i>Solanum rostratum</i>	Solanaceae
<i>Solanum torvum</i>	Solanaceae
<i>Sonchus arvensis</i>	Asteraceae
<i>Stachys palustris</i>	Lamiaceae
<i>Striga</i> spp.	Scrophulariaceae
<i>Tithonia diversifolia</i>	Asteraceae
<i>Tripleurospermum inodorum</i>	Asteraceae
<i>Urochloa panicoides</i>	Poaceae
<i>Urochloa plantaginea</i>	Poaceae
<i>Viola arvensis</i>	Violaceae
<i>Xanthium strumarium</i>	Asteraceae

Nota:

- * Aparece la clasificación taxonómica de "Familia" en el rubro de hospedante, cuando la plaga afecta a toda o la mayoría de las especies que pertenecen a dicha familia.
- * Frutales de pepita: *Malus* spp., *Cydonia* spp., *Pyrus* spp.
- * Frutales de carozo: También son conocidas como frutales de hueso. *Prunus* spp.
- * Poaceae: Se considera a los pastos y gramíneas
- * Taxonomía: Acaros, Insectos, Gastropodos y Malezas: Familia
 Bacterias y Fitoplasmas: Orden y Familia
 Cromistas y Hongos: Clase y Orden
 Virus y Viroides: Familia y Género

* Las especies detalladas en la columna "hospedante", no son las únicas que pueden ser afectadas por las plagas.

* Esta lista no excluye a otras plagas que pudieran ser consideradas como cuarentenarias, posterior a la fecha de publicación del presente listado.